

## عنوان فارسی مقاله :

اهمیت تیم واحد پرستاری : تاثیر سطح واحد محیط کاری پرستار، نقش عمل پرستار و خستگی در گزارش کار خروجی پرستار و کیفیت مراقبت و عوارض جانبی بیمار  
- یک برآورد عبور بخشی (مقطعی)

## عنوان انگلیسی مقاله :

Nursing unit teams matter: Impact of unit-level nurse practice environment, nurse work characteristics, and burnout on nurse reported job outcomes, and quality of care, and patient adverse events—A cross-sectional survey



## توجه !

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

## 2. Methods

This cross-sectional study was conducted in one 700-bed general hospital and one 600-bed university hospital in the Dutch speaking part of Belgium (Flanders), as well as in one hospital group comprised of six hospitals (number of beds ranged from 125 to 320) in the French speaking part of Belgium (Wallonia). The studied participants were registered nurses working in a direct-care nursing unit: medical and surgical units, intensive care and medium care units, emergency room (ER), operation theatre (OR) and post anaesthetic care units (PACU). Nurses working in both adult and paediatric care settings were included. The total study sample was 1201 nurses (response rate 56.5%) of 116 units. We selected 96 units for further analyses with  $\geq 30\%$  unit response rate (range from 30% to 100%; 4-37 respondents per unit). This resulted in a study sample of 1108 nurses.



2

روشها

این مطالعه عبور مقطعی در یک بیمارستان 700 تختخوابه عمومی و یک بیمارستان 600 تخته خوابه دانشگاهی در قسمت هلندی زبان بلژیک، (فلاندر)، و همچنین در یک گروه بیمارستان ها متشکل از شش بیمارستان (محدوده تعداد تخت از 125 تا 320) در بخش فرانسوی زبان بلژیک (والونی) اجرا شده است. شرکت کنندگان مورد بررسی، پرستاران شاغل به کار در یک واحد پرستاری مراقبت و (OR) اتاق عمل، (ER) مستقیم، عبارت بودند از: واحد پزشکی و جراحی، مراقبت های ویژه و بخش های مراقبت متوسط، اورژانس پرستاران شاغل در آن شامل هر دو مورد بزرگسالان و کودکان بودند. کل نمونه مورد مطالعه (PACU) واحد مراقبت پس از بیهوشی 1201 نفر از پرستاران (نرخ پاسخ 56.5%) از 116 واحد بود. ما 96 واحد را برای تجزیه و تحلیل بیشتر با 30% نرخ واحد پاسخ، انتخاب کردیم (محدوده بین 30% تا 100%. 4-37 پاسخ دهنده در هر واحد). این منجر به یک نمونه مطالعه 1108 نفر از پرستاران شد.

## توجه!

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت

ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

همچنین برای مشاهده سایر مقالات این رشته [اینجا](#) کلیک نمایید.