



## بخشی از ترجمه مقاله

عنوان فارسی مقاله :

بروز HIV / AIDS با ویژگی هایی شبیه به سکته مغزی ناشی از  
آبسه مغزی نوکاردیا: گزارش موردی

عنوان انگلیسی مقاله :

HIV/AIDS presenting with stroke-like features caused  
by cerebral Nocardia abscesses: a case report



توجه !

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل  
با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.



## بخشی از ترجمه مقاله

### Discussion

Go to:

HIV infection can produce a variety of neurological presentations at all stages of the illness, with the added possibility of multiple pathological processes being present simultaneously. As well as predisposing to atypical CNS infections, HIV itself can cause HIV-associated dementia, vacuolar myelopathy, distal sensory peripheral neuropathy, mononeuritis multiplex and polymyositis. Combining this with potential side effects of antiretroviral drugs leads to a diagnostic challenge that is only further complicated in instances, such as the present case, when HIV infection has not yet been diagnosed. It is therefore imperative that appropriate imaging is done at an early stage to ensure timely initiation of appropriate therapy. Non-contrast CT heads often have poor specificity in diagnosing intracranial abscesses; even ring-enhancing lesions on contrast-enhanced CT head images have a wide differential diagnosis, including toxoplasmosis, tuberculosis, bacterial and fungal abscess, primary CNS lymphoma and solid tumour metastases with surrounding oedema [5].

بحث

عفونت HIV می تواند باعث بروز انواع علائم عصبی در تمام مراحل بیماری شود ، با امکان اضافه شدن فرآیندهای پاتولوژیک متعدد که به طور همزمان رخ می دهند ، و همچنین زمینه را برای ابتلا به عفونت های CNS غیر معمولی فراهم می کند ، HIV به خودی خود می تواند باعث زوال عقل مرتبط با HIV ، میلوپاتی واکوتلی، نوروپاتی محیطی حسی دیستال ، مونوریت مالتی پلکس و پلی میوزیت شود. ترکیب این با عوارض جانبی بالقوه داروهای ضد رترو ویروسی منجر به یک چالش تشخیصی است که در بعضی از موارد پیچیده تر است، مانند مورد حاضر، زمانی که عفونت HIV هنوز تشخیص داده نشده است. از این رو ضروری است که تصویربرداری مناسب در مراحل اولیه، برای اطمینان از شروع به موقع درمان مناسب انجام شود. CT غیر کنتراست سر، اغلب اختصاصیت ضعیفی در تشخیص آبسه داخل جمجمه دارد: اگرچه ضایعات حلقوی افزایشی در تصاویر سی تی اسکن کنتراست سر، تشخیص های افتراقی گسترده ای دارد، از جمله توکسوپلاسموز، سل، آبسه های باکتریایی و قارچی، لنفوم اولیه CNS و متاستاز تومور سفت با ادم اطراف [5].



توجه!

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت

ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

برای جستجوی جدیدترین مقالات ترجمه شده، [اینجا](#) کلیک نمایید.