



بخشی از ترجمه مقاله

عنوان فارسی مقاله :

بی اختیاری ادرار فشاری در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

عنوان انگلیسی مقاله :

Stress Urinary Incontinence in Women With
Multiple Sclerosis



توجه !

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.



بخشی از ترجمه مقاله

DISCUSSION

بحث

LUTS are very common in MS and over 90% of patients present with these symptoms, 10 years from disease onset [2]. The prevalence of SUI in our study was 31.4%. The mean age and mean disease duration are the same in other series of urological disorders with MS [4,14]. Our department is a large and specialized center for follow-up of MS patients in the North of France. In the MS population, urodynamic investigations are necessary to better understand LUTS and choose the best treatment. Rehabilitation physicians at our center, had urodynamic experience with MS patients. To our knowledge, this is the first study reporting on the prevalence rate of SUI in a large dedicated MS rehabilitation center.

Three studies determined the prevalence of SUI in female patients with MS, which ranged from 16% to 55.9% [7-9]. These 3 studies reported the prevalence of SUI in MS in a urologic care center, but only 43% of MS patients were under the care of a urologist. Moreover, MS populations in those studies were older than in our analysis. Furthermore, SUI was diagnosed with a questionnaire, but sometimes, patients with MS cannot write due to motor or sensory deficiencies. Only one study recorded the EDSS score and another MS subtype [7,8]. These limitations may have contributed to a selection bias.

LUTS در بیماران مبتلا به ام اس بسیار شایع است و بالای 90 درصد از بیماران چنین نشانه هایی را ده سال بعد از شروع بیماری بروز می دهند. شیوع SUI در مطالعه ما 31.4% بود. میانگین سن و میانگین طول دوره بیماری مشابه با سایر انواع اختلالات ادراری در ام اس می باشد. موسسه ما یک مرکز بزرگ و تخصصی شده برای پیگیری ام اس در شمال فرانسه می باشد. در جمعیت ام اس، تحقیقات اورودینامیک برای درک بهتر LUTS و انتخاب بهترین درمان، ضروری می باشد. پزشکان بازتوانی در مرکز ما، تجربه اورودینامیک برای بیماران ام اس دارند. بر اساس دانش ما، این اولین مطالعه است که در مورد گزارش میزان شیوع SUI در یک مرکز بازتوانی اختصاصی اختصاص داده شده به بیماران ام اس می باشد. سه مطالعه شیوع SUI را در بیماران زن مبتلا به ام اس از 16% تا 55.9% گزارش کردند. این سه مطالعه شیوع SUI را در بیماران مبتلا به ام اس در مرکز مراقبت اورولوژیک گزارش کردند اما تنها 43% از بیماران ام اس تحت مراقبت یک اورولوژیست بودند. علاوه بر این، جمعیت ام اس در این مطالعات مسن تر از جمعیت تحلیل ما بودند. علاوه بر آن SUI بر اساس یک پرسشنامه تشخیص داده شده بود اما گاهی بیماران مبتلا به ام اس به واسطه مشکلات حرکتی یا حسی قادر به نوشتن نمی باشند. تنها یک مطالعه نمره EDSS و سایر زیرگونه های ام اس را ثبت کرده بود. این محدودیت ها ممکن است مرتبط با تورش انتخاب باشد.



توجه!

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

برای جستجوی جدیدترین مقالات ترجمه شده، [اینجا](#) کلیک نمایید.