



بخشی از ترجمه مقاله

عنوان فارسی مقاله :

نقش تصویر برداری در کودکان مبتلا به عفونت دستگاه ادرای

عنوان انگلیسی مقاله :

Role of imaging in children with urinary tract infections



توجه !

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.



بخشی از ترجمه مقاله

CONCLUSION

All children with urinary tract infection less than 5 years should undergo DMSA scan and voiding cystourethrogram. Children more than 5 years of age with UTI should undergo DMSA scan. In children, more than 5 years of age voiding cystourethrogram can be done in only those with parenchymal abnormalities. Ultrasonogram is less sensitive in detecting acute pyelonephritis and vesicoureteric reflux.

Funding: No funding sources

Conflict of interest: None declared

Ethical approval: The study was approved by the Institutional Ethics Committee

نتیجه گیری

کلیه کودکان مبتلا به عفونت دستگاه ادرای کمتر از 5 سال باید تحت اسکن DMSA و سیستواورتروگرام تخلیه ای قرار بگیرند. کودکان بیشتر از 5 سال مبتلا به UTI باید تحت اسکن DMSA قرار بگیرند. در کودکان ، بالاتر از 5 سال سیستواورتروگرام تخلیه ای می تواند تنها در آنها که ناهنجاری های پارانشیمی دارند صورت گیرد. اولتراسونوگرافی در کشف پیلونفریت حاد و ریفلکس مثانه ای حالبی ، حساسیت کمی دارد.



توجه !

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

برای جستجوی جدیدترین مقالات ترجمه شده، [اینجا](#) کلیک نمایید.