



## بخشی از ترجمه مقاله

عنوان فارسی مقاله :

شیوع سقوط در میان سالمندان تحت همودیالیز

عنوان انگلیسی مقاله :

Prevalence of falls among seniors maintained on hemodialysis



توجه !

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.



## بخشی از ترجمه مقاله

### Discussion

In this survey, more than one quarter of community dwelling ambulatory seniors aged 65–93 years of age on hemodialysis reported a fall in the past 12 months; a finding similar to the reported prevalence in community dwelling seniors without chronic kidney disease [1–3]. The true prevalence of falls in this group of elderly hemodialysis patients is likely to have been higher. Fall ascertainment relies on self-reporting and can be subject to inaccuracies in recall. Previous work, using a similar definition of falls, demonstrated that seniors underestimate events by 13% over a 12 month period, and by more than 30% over shorter periods of recall [21]. Recall of injurious falls appears to be worse. From Cummings and colleagues' experience, those who sustained injurious falls over prospective follow up were less likely to recall their falls: Up to half did not recall a fall within the past three months and 40% did not recall injurious falls [21].

### بحث

در این پژوهش، بیش از یک چهارم جامعه خانه سالمدان سریاپی با 65 الی 93 سال سن تحت همودیالیز در 12 ماه گذشته سقوط داشتند که یافته‌ای مشابه شیوع گزارش شده در جامعه خانه سالمدان بدون بیماری مزمن کلیوی می‌باشد [1-3]. شیوع واقعی سقوط در این گروه از بیماران همودیالیزی سالمند احتمالاً بالاتر باشد. اثبات سقوط ممکن بر گزارش شخص بوده و می‌تواند به واسطه عدم دقیق در یادآوری باشد. کار قبلی، با تعریف مشابهی از سقوط، نشان داد که سالمدان در طی یک دوره 12 ماهه، حوادث را 13 درصد کمتر و در دوره‌های کوتاه‌تر یادآوری حوادث را 30 درصد بیشتر برآورده خودند [21]. به نظر می‌رسد یادآوری سقوط آسیب زننده بدتر باشد. بر اساس تجربه کامینگز و همکاران، کسانی که سقوط آسیب زننده داشتند در پیگیری‌های آنی کمتر احتمال دارد سقوط را به یاد آورند؛ بیش از نیمی از افراد در سه ماه گذشته سقوطی را به یاد نداشته و 40 درصد سقوط آسیب زننده را به یاد نداشتند [21].

### توجه!

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت

ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

برای جستجوی جدیدترین مقالات ترجمه شده، [اینجا](#) کلیک نمایید.