



## بخشی از ترجمه مقاله

عنوان فارسی مقاله :

رابطه بین ساختار شخصیت، کارکرد انعکاسی و طبقه بندی روان پزشکی  
در اختلال شخصیت مرزی

عنوان انگلیسی مقاله :

The Relationship Between Personality Organization, Reflective  
Functioning, And Psychiatric Classification In Borderline  
Personality Disorder



توجه !

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل  
با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.



## بخشی از ترجمه مقاله

### Discussion

The present study investigated the relationship between personality organization, reflective functioning, and psychiatric classification in 92 female borderline patients who participated in a psychotherapy treatment study.

The participants had an average of 1.6 recent and 1.8 lifetime diagnoses on Axis I and an average of 2.4 Axis II diagnoses in addition to their primary BPD diagnosis. This is consistent with previous studies in BPD patients, which found high levels of psychiatric comorbidity on Axes I and II (Critchfield, Clarkin, Levy, & Kernberg, 2008; Skodol et al., 2002). The majority of the patients (64.1%) were diagnosed as medium-level personality organization, and the most severe impairment was found in the dimension of primitive defenses in the STIPO. On the RF Scale, the mean overall score was 2.7. A score of 3 is considered questionable or low and indicates naïve/simplistic or overanalytic/hyperactive

reflections on the mental states of self and others (Fonagy et al., 1998). The RF scores varied between 0 (*negative to absent RF*) and 5 (*ordinary RF*). Marked or exceptional RF above 5 was not found in our sample. This result is in line with the Cassel-Hospital study, where a mean RF of 2.7 in BPD was reported (Fonagy et al., 1996), and consistent with the New York TFP study, where the mean RF in the TFP group was 2.9 at baseline (Levy et al., 2006).

#### تشریح مطالب

این مطالعه به بررسی رابطه بین ساختار شخصیت، کارکرد انعکاسی و طبقه‌بندی روانپزشکی در ۹۲ زن بیمار مبتلا به اختلال مرزی که در مطالعه روان‌درمانی شرکت کردند پرداخت.  
بطور متوسط، تعداد تشخیص‌های جدید و طول عمر اختلالات محور ۱ در شرکت کنندگان به ترتیب ۱/۶ و ۱/۸ و برای اختلالات محور ۲، علاوه بر تشخیص اولیه BPD، ۲/۴ بود. این نتایج با مطالعات قبلی در بیماران BPD که سطح بالای اختلالات روانی محور ۱ و ۲ همراه را یافتند مطابقت دارد. اکثر بیماران (۶۴/۱٪) دارای ساختار شخصیتی سطح متوسط تشخیص داده شدند و شدیدترین آسیب در بُعد مکانیزم‌های دفاعی اولیه در STIPO یافت شد. در مقیاس RF، میانگین امتیاز کلی ۲/۷ بود. امتیاز ۳ مشکوک یا پائین محسوب می‌شود و نشان‌دهنده انعکاسات سطحی یا ساده و یا بیش‌تحلیلی یا بیش‌فعال در مورد حالات روحی خود و دیگران است. امتیازات RF در محدوده صفر (RF منفی تا صفر) تا ۵ (RF عادی) متغیر بودند. RF زیاد یا استثنایی بیش از ۵ در نمونه آماری ما مشاهده نشد. این نتیجه با مطالعه بیمارستان کاسل که در آن میانگین RF در BPD ۲/۷ گزارش شد و با مطالعه TFP، که در آن میانگین RF در گروه TFP به عنوان سطح مینا ۲/۹ گزارش شد، همخوانی دارد.

### توجه!

این فایل تنها قسمتی از ترجمه می‌باشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

برای جستجوی جدیدترین مقالات ترجمه شده، [اینجا](#) کلیک نمایید.

