



بخشی از ترجمه مقاله

عنوان فارسی مقاله :

آریتمی بعداز جراحی پس از جراحی قلب:

رخداد، عوامل خطر و مدیریت درمانی

عنوان انگلیسی مقاله :

Postoperative Arrhythmias after Cardiac Surgery:

Incidence, Risk Factors, and Therapeutic Management



توجه !

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.



بخشی از ترجمه مقاله

6. Conclusion

Postoperative arrhythmias are frequent in the cardiac surgery setting. The most frequently observed POAs are supraventricular tachyarrhythmias, especially AFib. The general issues for the treatment of supraventricular arrhythmias are similar to those recommended in other settings. The treatment of postoperative ventricular arrhythmias is less clear but is similarly based on general indications for the treatment of ventricular arrhythmias. Finally, bradyarrhythmias are also frequently observed after cardiac surgery due to the conduction system trauma. Although conduction disturbances often recover spontaneously, permanent pacemaker implantation may be required.

۶. نتیجه گیری

آریتمی‌های بعداز جراحی در جراحی قلب معمول هستند. فراوان ترین POAs مشاهده شده، تاکی آریتمی فوق بطنی، به ویژه AFib، است. مشکلات عمومی برای درمان آریتمی‌های فوق بطنی مشابه با موارد توصیه شده در سایر وضعیت‌هاست. درمان آریتمی‌های بطنی بعداز جراحی کمتر مشخص است اما به طور مشابه بر اساس اندیکاسیون‌های عمومی برای درمان آریتمی‌های بطنی است. در نهایت، برادی آریتمی نیز اغلب بعداز جراحی قلب مشاهده می‌شود که به دلیل ترومای سیستم هدایتی است. اگرچه، اختلالات هدایتی اغلب به صورت خود بخودی ترمیم می‌شوند اما ایمپلنت ضربان ساز دائمی ممکن است مورد نیاز باشد.



توجه!

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

برای جستجوی جدیدترین مقالات ترجمه شده، [اینجا](#) کلیک نمایید.