ایران عرضه
فروشگاه کالاهای دانلودی
IRANARZE.IR

اصل سوالات استخدامی
حیطه تخصصی پرستاری
وزارت بهداشت ۱۴۰۲

توضیحات:

- مجری جهاد دانشگاهی
- آزمون مهر ۱۴۰۲
- حیطه تخصصی
- شامل ۷۵ سوال

برای دانلود رایگان جدیدترین سوالات استخدامی ادوار گذشته وزارت بهداشت، اینجا بزنید

همچنین جهت مشاهده آخرین اخبار استخدامی وزارت بهداشت، اینجا بزنید

« انتشار یا استفاده غیر تجاری از این فایل، بدون حذف لوگوی ایران عرضه، مجاز می باشد »

@iranarze @iranarze

بخش‌های ویژه

۹۱- قابل اعتمادترین و دقیق‌ترین روش غیرتهاجمی اکسیژن‌رسانی کدام است؟

الف) ماسک‌های بدون تنفس مجدد
ب) ماسک‌های با تنفس مجدد
ج) قطعه T
د) ماسک ونچوری

۹۲- MAT مخفف کدام نوع آریتمی است؟

الف) تاکیکاردی دهلیزی چندکانونی
ب) فیبریلاسیون دهلیزی
ج) تاکیکاردی حمله‌ای دهلیزی
د) ریتم فرار دهلیزی

۹۳- بهترین شیوه آموزش در ECT برای بیمار و خانواده کدام است؟

الف) بحث گروهی با حضور روانپزشک
ب) آموزش روانی
ج) مشاهده فرایند ECT
د) فیلم

۹۴- اولین قدم با مشاهده مانیتور بیمار بستری در CCU که تاکیکاردی بطنی حمله‌ای (PVT) را نشان می‌دهد، کدام است؟

الف) اعلام فوری کد احیاء قلبی - ریوی
ب) بررسی سطح هوشیاری بیمار
ج) آماده‌سازی شوک دفیبریلیشن
د) آماده‌سازی شوک کاردیوورژن

۹۵- بهترین روش تخلیه ترشحات راه هوایی در بیماران بیهوش و کومایی کدام است؟

الف) ساکشن
ب) بوسجرال درناژ
ج) تنفس عمیق
د) فیزیوتراپی

۹۶- در عفونت‌های قسمت فوقانی دستگاه تنفس کدام مداخله پرستاری توصیه می‌شود؟

الف) افزایش مایعات دریافتی و استفاده از بخور به‌منظور کاهش غلظت ترشحات
ب) استفاده از آنتی‌بیوتیک‌های تجویز شده با نظارت پرستار و مصرف داروهای بازکننده برونش‌ها
ج) استفاده از دوش آب گرم همراه با مصرف به‌موقع داروها
د) تعادل بین استراحت، فعالیت و کنترل مایعات دریافتی

۹۷- کدام مورد ازعلل شایع افت فشار خون در ضمن همودیالیز است؟

الف) بالا بودن سطح فسفات خون
ب) تخلیه سریع مایعات داخل عروقی ناشی از تنظیم نامناسب TMP
ج) محلول‌های دیالیز سرد
د) اشکالات تکنیکی

۹۸- پرستار بخش ویژه ظرفیت حیاتی ریه بیمار مبتلا به اختلال مزمن ریوی را کنترل می‌کند. کدام یافته نشان می‌دهد که بیمار کفایت تنفسی ندارد و نیاز به استفاده از وسایل کمک تنفسی برای وی مطرح است؟

الف) V=10 ml/kg
ب) V=13-14 ml/kg
ج) V=11-12 ml/kg
د) V=15-16 ml/kg

۹۹- در مبتلایان به سندرم پارلو احتمال وقوع کدام نوع آریتمی بیشتر است؟

الف) PAC
ب) PAT
ج) PVC
د) PJT

۱۰۰- در همه داروهای زیر عارضه هیپوتانسیون ارتوستاتیک دیده می‌شود، به جز .....؟

الف) آلپرازولام
ب) کلردیازپوکساید
ج) فلورازپام
د) کلونازپام

۱۰۱- PSICU مخفف کدام بخش ویژه است؟

الف) جراحی کودکان
ب) عمومی
ج) داخلی
د) جراحی تروما

۴۲۶۵۰۷۳

۱۰۲- سرعت ذاتی کانون‌های دهلیزی (Intrinsic rate of the AV node) بدون توجه به عملکرد SA.N (گره سینوسی) چقدر است؟

الف) ۲۰-۴۰ ضربه
ب) ۴۰-۶۰ ضربه
ج) ۶۰-۸۰ ضربه
د) ۸۰-۱۰۰ ضربه

۱۰۳- زمانی که دو سیکل طبیعی با یک PVC جفت می‌شود، به آن چه می‌گوییم؟

الف) دی فازیک
ب) بی فازیک
ج) بای ژمینه
د) تری ژمینه

۱۰۴- در بررسی بیمار در وضعیت کما ، پرستار کدام بررسی و ارزیابی بیمار را در اولویت قرار می دهد؟

الف) اعصاب جمجمه ای ، سطح هوشیاری
ب) سیستم حرکتی ، اعصاب جمجمه ای
ج) رفلکس ها و اعصاب جمجمه ای
د) سطح هوشیاری و رفلکس ها

۱۰۵- شایعترین عفونت بیمارستانی در ICU کدام است؟

الف) عفونت مجاری تنفسی تحتانی
ب) عفونت محل خطوط شریانی و وریدی
ج) عفونت ناشی از لوله گذاری داخل تراشه
د) عفونت زخم بستر

روان‌پرستاری

۱۰۶- بیماری با اختلال شبه جسمانی در حین مصاحبه شروع به صحبت در مورد نشانه‌ها و آسیب‌های جسمی می‌کند. به‌عنوان روان‌پرستار، کدام جهت‌گیری زیر را اتخاذ می‌کنید؟

الف) نقطه تمرکز ارتباط با بیمار را تغییر می‌دهید.
ب) درخصوص زیربنای روان علایم جسمانی، با بیمار صحبت می‌کنید.
ج) به شکایت‌های جسمانی بیمار توجه کرده و آن‌را پیگیری می‌کنید.
د) آسیب‌های جسمانی بیمار را رد می‌کنید.

۱۰۷- بیمار روانی که خود را بیمار نمی‌داند و عقیده دارد هیچ مشکلی نداشته و نیاز به معالجه ندارد، در کدامیک از موارد زیر اختلال دارد؟

الف) تمرکز حواس
ب) بصیرت
ج) هوشیاری
د) قضاوت

۱۰۸- به عنوان روان‌پرستار، مهم‌ترین نکته در برنامه بازتوانی بیمار روانی را کدام مورد می‌دانید؟

الف) بازگشت به خانواده
ب) پذیرش در اجتماع
ج) تماس هفتگی با محیط درمانی
د) شروع کار در محیط قبلی

۱۰۹- نقش پرستار در مصاحبه در مقابل بیمار روان عبارت است از:

الف) شنونده باشد.
ب) می‌تواند در زمانی که بیمار حاشیه می‌رود، خود را مشغول کار دیگری کند.
ج) بشنود و صبر کند
د) بشنود و حس کند و عکس‌العمل مناسب از خود نشان دهد

۱۱۰- سندرم غروب آفتاب (sundown syndrome) در کدام اختلال زیر دیده می‌شود؟

الف) دلیریوم
ب) دمانس
ج) افسردگی فصلی
د) کج خلقی

۱۱۱- بهترین روش مداوای بیماری که دچار «واکنش حاد اندوه» است، کدامیک از موارد زیر می‌باشد؟

الف) داروهای ضدافسردگی
ب) برون‌ریزی احساسات
ج) E.C.T
د) تقویت مکانیسم دفاعی انکار

۱۱۲- اولین قدم در معاینه وضعیت روانی بیمار عبارت است از:

الف) تعیین سطح هوشیاری
ب) بررسی علائم حیاتی
ج) بررسی نحوه عملکرد بیمار
د) ارزیابی مهارت‌های کلامی

۱۱۳- به‌عنوان روان‌پرستاردر برخورد با بیماری که از «توهمات شنوایی آمرانه» با محتوای منفی صحبت می‌کند، کدام اقدام را اتخاذ می‌کنید؟

الف) توضیح دادن در مورد اینکه صداها واقعیت ندارد
ب) درخواست از بیمار برای بستری داوطلبانه در بیمارستان
ج) تجویز قوی‌ترین داروهای ضدجنون با حداکثر دوز، ضمن درمان سرپایی
د) بستری بیمار از هر طریقی که ممکن است

۱۱۴- والدینی که از عملکرد پایین، بی‌توجهی و عدم‌تمرکز فرزند خود شاکی است. کدام اختلال زیر مطرح می‌گردد؟

الف) اوتیسم
ب) اختلال سلوک
ج) اختلال خوردن
د) بیش‌فعالی

۱۱۵- کدام یک از موارد زیر بیانگر اعتماد به نفس بالا است؟

الف) واکنش هیجانی
ب) ثبات عاطفی
ج) احساس بزرگ‌بینی
د) درون‌گرایی

۱۱۶- عوارض آنتی‌کلینرژیک داروهای ضد سایکوز کدام است؟

الف) آگرانولوسیتوز و درماتیت
ب) تاری دید و اسهال
ج) خشکی دهان و اشکال در بلع
د) تعریق زیاد و یوست مرطوب

۱۱۷- مهم‌ترین جنبه منفی سوگ انتظار (Anticipatory) کدام است؟

الف) عدم آمادگی برای مواجهه با فقدان
ب) اختلال در روابط بین‌فردی
ج) افزایش بار مراقبین
د) افزایش پرخاشگری و خشم

۱۱۸- به‌عنوان روان‌پرستار کدام روش مراقبتی را حین ترخیص به بیمار با تشخیص اضطراب مزمن توصیه می‌کنید؟

الف) پس‌زدن احساسات اضطراب بیمار
ب) شناسایی موقعیت‌های ایجادکننده اضطراب
ج) ادامه مشاوره روان‌درمانی پس از ترخیص
د) حذف موقعیت‌های اضطراب‌آور

۱۱۹- بی‌قراری، پرتحرکی، سرخوشی و گشاد شدن مردمک، از علایم مصرف کدامیک از موارد زیر است؟

الف) الکل
ب) تریاک
ج) آمفتامین
د) کوکایین

۱۲۰- بیمار افسرده‌ای پس از ۳ هفته بستری بودن در بخش، به وضوح از خلق بالاتری برخوردار شده و در جمع شرکت می‌کند. او از پیشرفت وضعیت خود رضایت دارد. مهم‌ترین مراقبت پرستاری در مورد این مددجو کدام است؟

الف) پایش عوارض دارویی در بیمار
ب) آموزش مصرف صحیح و به موقع دارو
ج) هشدار در مورد علائم عود مجدد بیماری
د) پیشگیری از خطر خودکشی در بیمار

داخلی جراحی

۱۲۱-کدامیک از تشخیص‌های پرستاری زیر برای مددجو مبتلا به دیابت بی مزه مطرح است؟

الف) اختلال افزایش حجم مایعات
ب) اختلال در الگوی تنفسی
ج) اختلال در تصویر ذهنی از خویشتن
د) اختلال در الگوی خواب

۱۲۲- پس از عمل جراحی تعویض مفصل ران، کدام یک از عوارض زیر بایستی به‌دلیل احتمال DVT مورد بررسی قرار گیرد؟

الف) خطر خونریزی از محل تزریق، درد اندام‌های انتهایی، راش پوستی
ب) درد شدید، ورم یک‌طرفه، سرخی در مسیر ورید
ج) در موقع جابه‌جایی اندام، نشت مایع بین سلولی از ناحیه جراحی
د) عدم تعادل همودینامیک، تهوع، استفراغ، هموپتزی

۱۳۸۷۶۵۰۷۲۲

۱۲۳- در مددجو مبتلا به کدام بیماری، تشخیص پرستاری «احتمال بروز صدمه در رابطه با عدم تعادل و سرگیجه»، مطرح است؟

الف) اگزوستوز
ب) پارگی پرده صماخ
ج) کلستاتوم
د) ماستوئید

۱۲۴-در آموزش به بیمار بعد از جراحی دیسک بین مهره‌ای کدام مورد صحیح است؟

الف) اجتناب از کفش پاشنه کوتاه
ب) استفاده از پوزیشن پرون
ج) ورزش گردن با خم و راست یا چرخاندن گردن
د) اجتناب از ایستادن یا نشستن بیش از ۳۰ دقیقه

۱۲۵-احساس مزه شوری در دهان بیمار پس از کرانیوتومی (اینفرا تنتوریال) به کدام یک از دلایل زیر است؟

الف) نشت CSF از بینی
ب) اختلال حس چشایی
ج) اختلال در عصب زوج ۷
د) اختلال در عصب زوج ۹

۱۲۶- در آموزش به بیماری که نیتروگلیسیرین دریافت می‌کند، کدام مورد زیر صحیح است؟

الف) مصرف دارو بعد از هر فعالیتی که ایجاد درد می‌کند
ب) نگهداری قرص در جعبه‌های پلاستیکی و فلزی
ج) بلع قرص نیتروگلیسیرین در دردهای شدید
د) چند دقیقه نشستن پس از مصرف دارو

۱۲۷- در بررسی وضعیت تغذیه‌ای بیمار مبتلا به کولیت اولسراتیو با تغذیه دهانی، پرستار متوجه می‌شود که بیمار هنوز اسهال دارد و نسبت به چند روز قبل دچار کاهش وزن شده و تعادل منفی نیتروژن مطرح است. کدام مورد به‌منظور حمایت تغذیه‌ای صحیح است؟

الف) تغذیه کامل وریدی
ب) تغذیه لوله‌ای بینی - ژژنوم
ج) تغذیه لوله‌ای بینی - معدی
د) گاستروستومی

۱۲۸- بیماری با وزن ۸۰ کیلوگرم دچار ۶۰ درصد سوختگی شده است. حداقل مایع وریدی مورد نیاز در ۸ ساعت اول بعد از سوختگی چقدر است؟

الف) ۳۶۰۰ میلی‌لیتر
ب) ۴۰۰۰ میلی‌لیتر
ج) ۴۴۰۰ میلی‌لیتر
د) ۴۸۰۰ میلی‌لیتر

۱۲۹-اختصاصی‌ترین شکایت بلافاصله بعد از پروستاتکتومی سوپراپیوبیک کدام است؟

الف) اسپاسم
ب) ایمپاتنس
ج) بی‌اختیاری ادرار
د) خونریزی

۱۳۰- اقدام پرستاری مناسب قبل از انجام آزمون TSH در بیمار مشکوک به اختلال غده تیروئید کدام است؟

الف) کنترل V/S بیمار
ب) گرفتن یک خط وریدی
ج) گرفتن شرح حال در مورد داروها و مواد یددار
د) NPO بیمار از شب قبل از آزمایش

۱۳۱- بهترین پوزیشن برای بیمار مبتلا به پریتونیت کدام است؟

الف) خوابیده به پهلو با زانوهای خم شده
ب) خوابیده به پشت و پاها صاف
ج) نیمه‌نشسته و زانوهای خم شده
د) خوابیده به پشت و پاها جمع شده

۱۳۲- بعد از جایگذاری موفقیت‌آمیز بالن پمپ داخل آئورت در بیمار با شوک کاردیوژنیک، کدام تغییرات همودینامیک ایجاد می‌شود؟

الف) کاهش SVR و کاهش SV
ب) افزایش BP دیاستولیک و کاهش BP سیستولیک
ج) کاهش CVP و افزایش فشار دهلیز چپ
د) کاهش PAWP و افزایش CO

۱۳۳- کدام مورد به پیشگیری از در رفتگی لگن پس از جراحی تعویض مفصل لگن کمک می‌کند؟

الف) نشستن با زاویه ۴۵ تا ۷۵ درجه
ب) دور و نزدیک کردن زانوها از هم در طول روز
ج) استفاده از صندلی‌های پایه بلند
د) پیشگیری از روی هم انداختن پاها

۱۳۴- تفسیر شما به‌عنوان یک پرستار هنگام پذیرش بیمار در بیمارستان با دیس‌پنه شدید و ویزینگ با سطح گازهای خون شریانی PH=7.24، Paco2=55mmHg، Pao2=65mmHg، HCO3=24 از نتایج آزمایش چیست؟

الف) اسیدوز متابولیک
ب) آلکالوز متابولیک
ج) اسیدوز تنفسی
د) آلکالوز تنفسی

۱۳۵- در مواردی که به‌دنبال ضربه سخت به بافت نرم عضلات، پروتئین‌ها شکسته و میوگلوبینوری حادث شده و التهاب ناشی از آزاد شدن بتاسیم سلول‌ها صورت پذیرد، کدام سندرم زیر حادث می‌گردد؟

الف) سندرم ولکمن
ب) سندرم کرانشی
ج) سندرم کمپارتمنت مزمن
د) سندرم پیتینگ

بهداشت جامعه

۱۳۶- سنجش روایی آزمون غربالگری با کدام است؟

الف) ویژگی و شدت
ب) ویژگی و دقت
ج) حساسیت و دقت
د) حساسیت و ویژگی

۱۳۷- عامل اصلی بحران در خانواده کدام است؟

الف) ناتوانی در سازگاری
ب) کیفیت روابط
ج) منابع ناکافی
د) شدت استرس

۱۳۸- سندروم آشیانه خالی معمولاً در چه گروه سنی و جنسی بیشتر بروز می‌کند؟

الف) زنان سالمند
ب) زنان و مردان سالمند
ج) مردان میانسال
د) زنان و مردان میانسال

۱۳۹- بهترین الگوی ارتباطی والد فرزندی کدام است؟

الف) والدین مسلط
ب) دادن آزادی نامحدود
ج) رفتار پذیرنده
د) رفتار توأم با توجه

۱۴۰- برای بررسی مخاطرات بیولوژیک و مرتبط با سن در خانواده از چه ابزاری استفاده می‌شود؟

الف) مصاحبه
ب) اکومپ
ج) ژنوگرام
د) شجره‌نامه

۱۴۱- روش بررسی سوءتغذیه کودک قبل از بروز نشانه‌های عضوی و عملکردی آشکار، کدام است؟

الف) انجام آزمایشات دوره‌ای
ب) بررسی مقدار کالری دریافتی
ج) سنجش اندازه دور سر
د) استفاده از منحنی رشد

۱۴۲- منظور از کشش نقشی کدام است؟

الف) رفتاری که فرد در پاسخ به انتظارات نقشی ایفا می‌کند.
ب) انتظارات ناسازگار نقشی
ج) مشارکت در ایفای نقش
د) احساس گناه، اضطراب و نگرانی ناشی از مواجه شدن با تضاد نقشی

۱۴۳- کدامیک از شرایط ذیل دلیلی بر ممنوعیت ایمن‌سازی بوده و نیازی به تعویق آن می‌باشد؟

الف) ابتلا به زردی دوره نوزادی
ب) نارس بودن شیرخوار یا وزن کم هنگام تولد
ج) سابقه آنافیلاکسی به یک واکسن یا اجزاء آن
د) دوره نقاهت یک بیماری

۱۴۴- ابتلای مادر به کدام یک از بیماری‌های زیر ممنوعیت شیردهی ایجاد می‌کند؟

الف) هپاتیت ب
ب) ایدز
ج) سل تحت درمان
د) مالاریا

۱۴۵- کدام یک از موارد زیر در مورد استانداردهای کیفیت آب در ۱۰۰ میلی‌لیتر صحیح است؟

الف) بدون عوامل زنده بیماری‌زا
ب) فاقد ناخالصی، مواد معلق و مواد کلوئیدی
ج) حاوی حداکثر سه میکروب در یک سی‌سی
د) حاوی حداکثر ۲ میکروب کلی‌فرم در یک سی‌سی

IRANARCHIVE.IR
آرشیو سوالات کنکورهای دانشگاهی

۱۴۶- در بررسی‌های اپیدمیولوژیک، اولین گام در یک اپیدمی کدام است؟

الف) تعریف جمعیت در معرض خطر
ب) تأیید تشخیص
ج) اثبات وجود اپیدمی
د) ارزیابی عوامل اکولوژیک

۱۴۷- پذیرفتن مسئولیت برای اتخاذ سبک زندگی سالم در کدام مرحله تکاملی توسط پرستار به کودک آموزش داده می‌شود؟

الف) قبل از مدرسه
ب) نوجوانی
ج) سن مدرسه
د) شیرخوارگی

۱۴۸- کدام یک از انواع گروه‌ها با هدف کمک در بحران‌ها تشکیل می‌شوند؟

الف) گروه‌های خودیار
ب) گروه‌درمانی
ج) گروه خودبرنامه‌ریز
د) گروه حمایتی

۱۴۹- «مددجو باید تصور حسی از چگونگی انجام مهارت را داشته باشد و بتواند خودش را در آن موقعیت قرار دهد»، از پیش شرط‌های یادگیری در کدام حیطه است؟

الف) یادگیری در حیطه روانی ـ حرکتی
ب) یادگیری در حیطه شناختی
ج) یادگیری در حیطه عاطفی
د) یادگیری در حیطه احساسی

۱۵۰- راشیتیسم به‌علت کمبود ویتامین D در کدام سن بیشتر مشاهده می‌شود؟

الف) ۶ ماه تا ۲ سال
ب) ۲ تا ۶ سال
ج) ۲ تا ۴ سال
د) ۲ ماه تا ۶ ماه

مادران و نوزادان – کودکان

۱۵۱- هدف از آموزش و توصیه به مادران جهت انجام ورزش‌های پس از زایمان کدام است؟

الف) کاهش چربی‌های شکم و پهلو
ب) بهبود تونسیته عضلات
ج) کاهش کمر درد
د) افزایش توده عضلانی و تعادل وزن

۱۵۲- جدیدترین توصیه در مراقبت از بند ناف نوزادان کدام است؟

الف) شستشوی اولیه بند ناف با اب استریل و متعاقب آن آب ساده
ب) استفاده از آنتی‌بیوتیک‌های موضعی سریع‌الاثر
ج) استفاده از پانسمان خشک و مرطوب به تناوب
د) پانسمان روزانه با محلول بتادین و الکل

۱۵۳- زیربنای مراقبت‌های پرستاری کودکان با کیفیت مطلوب کدام است؟

الف) تشخیص نیازهای کودک
ب) کنترل بر مراقبت‌های سلامت
ج) تشخیص احساسات فردی
د) ارتباط درمانی مناسب

۱۵۴- نوزادی ۱۰ ساعت پیش، از مادری معتاد به کوکائین متولد شده است و به‌طور پیوسته گریه می‌کند و به‌شدت تحریک‌پذیر است. کدامیک از اقدامات پرستاری زیر بهتر می‌تواند نوزاد را آرام سازد؟

الف) استحمام نوزاد با آب گرم
ب) محکم بیچیدن نوزاد در پتو (قنداق کردن)
ج) گذاشتن لامپ روشنایی در کنار تخت نوزاد هنگام شب
د) بکارگیری محرک‌های حسی هنگام بیداری

۱۵۵- در مادر بارداری که دچار پرولاپس بندناف است، مهم‌ترین اقدام کدام است؟

الف) محافظت و پوشاندن بندناف با گاز استریل مرطوب
ب) تزریق اکسی‌توسین به مادر جهت القای زایمان زودرس
ج) برگرداندن بند ناف به داخل با استفاده از گاز استریل
د) قرار دادن مادر در وضعیت نیمه نشسته جهت جا انداختن پرولاپس

۱۵۶- اولین اقدام در آمبولی مایع آمنیوتیک کدام است؟

الف) قطع سرم اکسی‌توسین
ب) درمان اختلال انعقادی
ج) تجویز داروی ضد فشار خون
د) دادن اکسیژن با فشار مثبت و برقراری رگ

۱۵۷- در مورد پلی‌هیدرو‌آمنیوس بارداری کدام جمله صحیح است؟

الف) مایع آمنیوتیک بیش از ۳ لیتر است.
ب) در مادران دیابتیک بیشتر است.
ج) با معاینه بالینی تشخیص داده می‌شود.
د) در حاملگی دیررس بیشتر است.

۱۵۸- تشخیص پرستاری «اضطراب متوسط در رابطه با عدم اطمینان از سلامت جنین» در کدام رده سنی مادران باردار بیشتر صدق می‌کند؟

الف) کمتر از ۲۰ سال
ب) ۲۰-۳۰ سال
ج) ۳۱-۳۵ سال
د) بیش از ۳۵ سال

۱۵۹- کدام یک از اندیکاسیون‌های تجویز اپی‌نفرین برای کودک مبتلا به آلرژی شدید غذایی است؟

الف) خشونت صدا
ب) اشک ریزش
ج) اضطراب
د) گریه کردن

۱۶۰- خانم حامله‌ای در هنگام شروع لیبر، دچار دفع خودبخود مقدار اندکی موکوس آغشته به خون از واژن شده است. محتمل‌ترین علت آن چیست؟

الف) تهدید به سقط
ب) پارگی خفیف سرویکس
ج) دکلمان جفت
د) نمایش خونی (Bloody show)

۱۶۱- در مورد معیار آپگار در نوزاد، کدامیک از پارامترهای زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد؟

الف) فشار خون نوزاد
ب) رنگ پوست
ج) میزان برون ده ادراری
د) درجه حرارت نوزاد

۱۶۲- خانمی ۳۱ ساله با بارداری اول ۲۶ هفته‌ای مراجعه کرده است. جهت آزمایشات روتین دوران بارداری، آزمایش OGTT با ۵۰ گرم گلوکز درخواست می‌شود. با توجه به جواب آزمایش (fasting=98, 1h=186, 2h=168, 3h=165) کدام تفسیر صحیح است؟

الف) جواب آزمایش طبیعی است، مراقبت دوران بارداری ادامه یابد.
ب) قند ۲ ساعت بعد غیرطبیعی است، آزمایش در ۲۴ ساعت آینده تکرار شود.
ج) به‌علت غیرطبیعی بودن جواب آزمایش، به متخصص ارجاع شود.
د) با توجه به جواب آزمایش، فرد دچار GDMA2 است و رژیم غذایی توصیه می‌شود.

۱۶۳- در تشخیص افتراقی بارداری، کونتراسپتیوها کدام علامت زیر را ایجاد می‌کنند؟

الف) Goode ll's
ب) Chadwick's
ج) Hegar's
د) Ballottemet

۱۶۴- اصطلاح افاسمان (effacement) در زمان زایمان چیست؟

الف) باز شدن پرینه و واژن
ب) باز شدن سریع دهانه رحم
ج) باز شدن تدریجی دهانه رحم
د) نرم و نازک شدن دهانه رحم

۱۶۵- کدامیک از موارد زیر احتمال بروز نمایش بریچ را افزایش می‌دهد؟

الف) الیگوهیدرآمینوس
ب) هیدروسفالی
ج) نولی پارا
د) رحم دو شاخ

۶۰۰۷۲۱

ایران عرضه
فروشگاه کالاهای دانلودی
IRANARZE.IR

ایران عرضه

مرجع نمونه سوالات

آزمون های استخدامی

به همراه پاسخنامه تشریحی

خدمات ایران عرضه:

- ارائه اصل سوالات آزمون های استخدامی
- پاسخنامه های تشریحی سوالات
- جزوات و درسنامه های آموزشی

برای دانلود رایگان جدیدترین سوالات استخدامی ادوار گذشته وزارت بهداشت، اینجا بزنید

همچنین جهت مشاهده آخرین اخبار استخدامی وزارت بهداشت، اینجا بزنید

« انتشار یا استفاده غیر تجاری از این فایل، بدون حذف لوگوی ایران عرضه، مجاز می باشد »

@iranarze

@iranarze