

توضیحات:

- مجری جهاد دانشگاهی
- آزمون مهر ۱۴۰۲
- حیطة تخصصی
- شامل ۷۵ سوال

اصل سوالات استخدامی

حیطه تخصصی مامایی

وزارت بهداشت ۱۴۰۲

برای دانلود رایگان جدیدترین سوالات استخدامی ادوار گذشته وزارت بهداشت، اینجا بنزید

همچنین جهت مشاهده آخرین اخبار استخدامی وزارت بهداشت، اینجا بنزید

« انتشار یا استفاده غیر تجاری از این فایل، بدون حذف لوگوی ایران عرضه، مجاز می باشد »



بارداری و زایمان ۱ و ۲

- ۹۱- خون ریزی قاعدگی در چه مرحله‌ای از سیکل تخمک‌گذاری رخ می‌دهد؟
 الف) هفته دوم سیکل تکثیری
 ب) هفته اول سیکل ترشجی
 ج) هفته اول سیکل تکثیری
 د) هفته دوم سیکل ترشجی
- ۹۲- در معاینه واژینال خانمی G3P2 در لیسر فاصله بین اریتم‌ها و فونتانلی قدمی به دست می‌خورد. تشخیص چه نوع پرزانتاسیونی است؟
 الف) مرکب
 ب) بیشانی
 ج) صورت
 د) ورتکسی
- ۹۳- درباره فیزیولوژی سیکل تخمدانی عبارت غلط کدام است؟
 الف) در اواخر دوره فولیکولی LH تولید اندروژن‌ها توسط سلول‌های نکا را تحریک می‌کند.
 ب) LH موجب افزایش گیرنده‌های خود و تبدیل اندروستندین به استرادیول می‌شود.
 ج) با رشد فولیکول‌های آنترال سلول‌های استرومالی احاطه‌کننده آنها به سلول‌های نکا تبدیل می‌شوند.
 د) اوج ترشح استروژن حدود ۲۶ ساعت و اوج ترشح LH حدود ۱۲ ساعت قبل از تخمک‌گذاری است.
- ۹۴- در کدامیک از موارد زیر تولید استروژن حفتی افزایش می‌یابد؟
 الف) بروز می ۲۱
 ب) اریتموپلاستوز جنینی
 ج) کمبود آروماتاز حفتی
 د) بیماری تروفوبلاستیک
- ۹۵- تحریک زود هنگام پس از زایمان از چه مزیتی برخوردار است؟
 الف) کاهش بی‌دستی
 ب) ترمیم سریع تروبی زیانومی
 ج) افزایش ترشح شیر از پستان
 د) کاهش طول مدت دفع لوشیا
- ۹۶- کیست‌های نکا - لوتئینی در کدام بارداری مشاهده نمی‌شود؟
 الف) مول
 ب) ایروایموتیرالسیون D
 ج) دیابت
 د) هیپوتیروئیدی
- ۹۷- درد مادر باردار طی مراحل مختلف زایمان منجر به کدام اختلال متابولیکی زیر می‌شود؟
 الف) اسیدوز متابولیک
 ب) الکالوز متابولیک
 ج) اسیدوز تنفسی
 د) اختلال مخلوط اسید - باز
- ۹۸- در کدامیک از موارد زیر ناکیکاردی قلبی جنین مشاهده می‌شود؟
 الف) بلوک مادرزادی قلب جنین
 ب) عبور می مادر
 ج) پیلونفریت شدید مادر
 د) تزریق آتروپین به مادر
- ۹۹- خانمی در طی بارداری دچار اورتریت و عفونت غده بارتولین بوده است. پس از زایمان که ۲۷ هفته انجام شده، نوزادش مبتلا به عفونت چشمی شده است. تشخیص شما چیست و این خاتم در بارداری باید چه درمانی دریافت می‌کرد؟
 الف) کلاندلیا / اریترومایسین
 ب) گنوره / سفتریاکسون
 ج) لنفوگراولوم و نروم / آزیترومایسین
 د) شانگروئید / آزیترومایسین
- ۱۰۰- نمای میکروسکوپی موکوس سرویکس در بارداری چگونه و در اثر کدام هورمون است؟
 الف) سرخسی، پروژسترون
 ب) سرخسی، استروژن
 ج) دانه تسبیحی، پروژسترون
 د) دانه تسبیحی، استروژن

بارداری و زایمان ۳ و ۴

۱۰۱- کدامیک از اقدامات زیر در موقعیت ابتلای به آمبولی مایع آمنیون صحیح می‌باشد؟

- الف) انجام احیاء قلبی - ریوی
 ب) حفظ درجه حرارت در سطح ۳۸ درجه سانتی‌گراد
 ج) حفظ میانگین فشار شریانی در سطح ۹۵ میلی‌متر جیوه
 د) تجویز مایعات برای اتساع بطن راست

۱۰۲- چنانچه شروع علائم بالینی آبله مرغان (varicella) در مادر باردار ۴ روز قبل از زایمان یا ۲ روز پس از آن باشد، اقدام ضروری چیست؟

- الف) ایمونوگلوبولین زوستر به نوزاد تزریق شود
 - ب) درمان دارویی برای نوزاد تزریق شود
 - ج) ایمونوگلوبولین زوستر به مادر باردار تزریق شود
 - د) ویروس آبله مرغان قابل سرایت به نوزاد نیست
- ۱۰۳- محل تزریق واکسن ب.ت.ژ کدام است؟
- الف) زیرجلد / بازو
 - ب) درون پوست / ساعد
 - ج) داخل عضله / بازو
 - د) داخل جلد / بازو
- ۱۰۴- برای اداره پارگی پیش از موعد و پره نروم برده‌ها، در کدامیک از سنین حاملگی زیر پروفیلاکسی استرپتوکوک گروه B توصیه نمی‌شود؟
- الف) کمتر از ۲۲ هفته
 - ب) ۲۴ هفته تا ۳۱ هفته کامل
 - ج) ۳۲ هفته تا ۳۳ هفته کامل
 - د) ۳۴ هفته و بیشتر

۱۰۵- در دایلم رنگی خانم باردار تمامی «حلقه آتش» دیده می‌شود. کدامیک از تشخیص‌های زیر محتمل است؟

- الف) سقط خودبخود
- ب) حاملگی اکتوپیک
- ج) مول هیداتفرم
- د) سقط ناقص

۱۰۶- کدامیک از موارد زیر از کمتراندیکاسیون‌های مصرف گنادوتروپین در درمان ناباروری است؟

- الف) آقای تخمک‌گذار، در افراد مبتلا به هیپوگنادیسم هیپوگنادوتروپیک
- ب) سوپراوولاسیون در همبازی با IUI
- ج) نارسایی اولیه تخمدان یا میزان بالای FSH
- د) القای تخمک‌گذاری در PCOS همراه با فقدان تخمک‌گذاری

۱۰۷- در جواب آزمایش پاپ‌اسمیر خانم یانسه‌ای وجود سلول‌های آندوسرویکال گزارش شده است. اقدام بعدی چیست؟

- الف) اقدامی ندارد
- ب) تکرار پاپ‌اسمیر
- ج) کولپوسکوپی
- د) بیوپسی اندومتر

۱۰۸- مکانیسم کاهش باروری در آندومتر یوز متوسط یا شدید چیست؟

- الف) چسبندگی در ناحیه تخمدان‌ها و لوله‌های رحمی
- ب) نارسایی فولیکولار
- ج) سیکل‌های نامنظم قاعدگی
- د) افزایش میزان E2 خون در مرحله قبل از تخمک‌گذاری

۱۰۹- خانمی ۲۴ ساله با سابقه ۲ سقط مکرر و آنتی‌بادی کاردیولولین مثبت مراجعه کرده است. درمان پیشنهادی در حاملگی بعدی کدام است؟

- الف) دوز کم آسپرین به اضافه استروئیدها
- ب) دوز کم آسپرین به تنهایی
- ج) دوز کم آسپرین به اضافه ویتامین C
- د) افزایش تحرکات برای سرگرمی مادر

۱۱۰- برای کاهش درد به روش دکتر دیک‌رید (Dick Read) تأکید بر کدام است؟

- الف) شرطی کردن درد زایمان
- ب) کاهش ترس از زایمان
- ج) افزایش تحرکات برای سرگرمی مادر
- د) اختلال در مسیر درد

بیماری‌های زنان و ناباروری

۱۱۱- برای نمونه‌برداری از آندومتر جهت بررسی علل نازایی، کدام زمان از سیکل قاعدگی مناسب است؟

- الف) اوایل فاز تکثیر رحم
- ب) یک روز قبل از تخمک‌گذاری
- ج) اواسط فاز لوتئینی تخمدان
- د) اواخر فاز ترشحی رحم

۱۱۲- خانمی ۲۸ ساله یا درد زیر شکم در سمت راست مراجعه نموده است. در مشاهدات سونوگرافی توده‌ای توپر به قطر ۶×۵ سانتی‌متر در تخمدان راست مشاهده می‌شود. کدام اقدام ارجح است؟

- الف) تحت نظر داشتن بیمار و معاینات مکرر هر ۶ ماه یکبار
- ب) لاپاراسکپی و برداشتن توده
- ج) تجویز OCP و تکرار سونوگرافی سه هفته بعد
- د) تکرار سونوگرافی

۱۳۸۰۵۸۹۴۱۴

۱۱۳- در خانمی هیپوتیروئید با مشکل DUB احتمال کدام عارضه بیشتر است؟

(الف) منورژی

(ب) اولیگو منوره

(ج) آمنوره

۱۱۴- مددجو با شکایت دیسمنوره دیسپارولوی - درد لگنی و نازایی مراجعه نموده و دارای طول سیکل کوتاه شده و مدت قاعدگی طولانی است. تشخیص احتمالی کدام است؟

(الف) PID

(ب) اندومتریوز

(ج) اندومیوز

(د) سالیتریت

۱۱۵- کدام یک از موارد زیر از تشخیص های افتراقی منازک زودرس ایزوله نمی باشد؟

(الف) سندرم مک کال - البرایت

(ب) هیپرتیروئیدی اولیه

(ج) تروما

(د) سوء استفاده جنسی

۱۱۶- دختری ۱۲ ساله با دردهای کولیکی و گرامپ های سوپرابوییک و تشخیص دیسمنوره اولیه مراجعه نموده است. درمان انتخابی چیست؟

(الف) نورکتومی

(ب) قرص OCP

(ج) آنتی بیوتیک های تاندرین

(د) طب سوزنی

۱۱۷- در ارتباط با تشخیص لیوموم زیر مخاطی کدام روش مناسب نیست؟

(الف) هیستروسکوپی

(ب) اولتراسونوگرافی

(ج) سونو هیستروگرام

(د) هیسترو لینگوگرام

۱۱۸- برای غربالگری سرطان تخمدان، انجام کدام روش به صورت ترکیبی پیشنهاد می شود؟

(الف) CA-125 / سونوگرافی / معاینه فیزیکی

(ب) LDH / لاپاروسکوپی

(ج) HCG / سونوگرافی / لاپاروسکوپی

(د) AFP / معاینه فیزیکی / سونوگرافی

۱۱۹- بیشترین احتمال CIN در چه زمانی است؟

(الف) در زمان استفاده از OCP

(ب) منازک

(ج) یائسگی

(د) قبل از حاملگی

۱۲۰- کدامیک از موارد زیر درباره خطر ابتلا به سرطان پستان صحیح است؟

(الف) با افزایش سن زنان، خطر ابتلا آنان به سرطان پستان کاهش می یابد.

(ب) هرچه دوران تولیدمثل زنان طولانی تر باشد، خطر ابتلا به سرطان پستان کاهش می یابد.

(ج) سابقه خانوادگی سرطان پستان، از عوامل خطر کاملاً شناخته شده ابتلا به سرطان پستان است.

(د) پیشگی زودرس در زنان، باعث افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان می شود.

بهداشت مادر و کودک

۱۲۱- خانمی با نوزاد ۲۳ روزه، بیان می کند که از روز پنجم پس از زایمان، احساس خستگی اش شروع شده است. او انرژی کمی برای مراقبت از نوزاد دارد و گهگاهی گریه می کند. تشخیص احتمالی و اقدام مناسب یک ماما چیست؟

(الف) افسردگی پس از زایمان - ارجاع به متخصص روان

(ب) سایکوز پس از زایمان - ارجاع به متخصص روان

(ج) اندوه بچه - ارجاع به متخصص روان

(د) اندوه بچه - ویزیت مجدد هفته بعدی

۱۲۲- جهت مبارزه با کمبود روی در کودکان، رایج ترین حامل غذایی برای اضافه کردن روی کدام است؟

(الف) شکر

(ب) مخمدم

(ج) شیر خشک

۱۲۳- جهت کمک به پیاده سازی سیاست های کلی جمعیت و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مناسب ترین رویکرد آموزش بهداشت کدام است؟

(الف) رویکرد قانونی

(ب) رویکرد خدماتی

(ج) رویکرد آموزشی

(د) رویکرد مراقبت های بهداشتی اولیه

۱۲۴- سیگار کشیدن همراه داشتن سابقه فامیلی به عنوان کدام عامل خطر در بروز سرطان پستان محسوب می شود؟
الف) Proxy for need
ب) تشدید می
ج) علینی
د) تجمعی

۱۲۵- آموزش روش انجام خود آزمایی پستان بر روی ماکت به زنان مراجعه کننده جهت دریافت مراقبت های سلامت باروری به مراکز بهداشتی چه نام دارد؟
الف) نقش بازی
ب) نمایش عملی
ج) تمرین شبیه سازی
د) آموزش برنامه ریزی شده

۱۲۶- غربالگری سرطان سرویکس در طبقات اجتماعی پایین جامعه چه نوع غربالگری است؟
الف) ممکن
ب) تجویزی
ج) انتخابی
د) چند مرحله ای

۱۲۷- همه موارد زیر از اهداف برنامه کشوری صندوق جمعیت ملل متحد است، به جز:
الف) تأمین حقوق باروری برای همه زوجین
ب) ارتقاء و بایش عهدنامه حقوق کودک
ج) کاهش نابرابری حقوق زن و مرد
د) بهبود وضعیت بهداشت باروری

۱۲۸- طبق دستورالعمل کشوری در مورد کودک سالم، واریش فلوراید برای کودک از چه زمانی و هر چند ماه یکبار لازم است انجام شود؟
الف) از سه سالگی، هر شش ماه
ب) از دو سالگی، هر شش ماه
ج) از دو سالگی، هر یک سال
د) از سه سالگی، هر یک سال

۱۲۹- در الگوی جامع آموزش بهداشت، تعین اهداف ویژه عملیاتی، تدوین فعالیت ها، تعیین منابع و تدوین مراحل ارزشیابی در کدام مرحله صورت می گیرد؟
الف) تعین اهداف
ب) طراحی برنامه
ج) تعین منابع
د) تدوین فعالیت ها

۱۳۰- چنانچه بخواهیم در یک مادر تک فرزند با تغییر نگرش، تقویت احساس کارایی فردی و نقش دیگران مهم، قصد او را در جهت فرزند آوری بیشتر، تقویت کنیم، با کار بست کدام تئوری اقدام به تغییر رفتار می کنیم؟
الف) مدل اعتقادی بهداشتی
ب) الگوی مراحل تغییر
ج) نظریه یادگیری اجتماعی
د) تئوری رفتار برنامه ریزی شده

۱۳۱- در الگوی برنامه ریزی برسید - برسید، ارزشیابی تأثیرات بلندمدت برنامه همانند تغییر در کیفیت زندگی و شاخص های بهداشتی کدام نوع ارزشیابی است؟
الف) ارزشیابی مرحله اجرا
ب) ارزشیابی فرایند
ج) ارزشیابی نتیجه
د) ارزشیابی تأثیر

۱۳۲- در جامعه ای اطلاعات زیر وجود دارد:
تعداد تولد زنده در سال: ۷۰۰۰ مورد / تعداد موارد مرگ نوزاد از بدو تولد تا ۷ روزگی: ۲۵ مورد / تعداد مرگ نوزاد تا ۲۸ روزگی: ۵۰ مورد / تعداد موارد مرگ از ۲۸ روزگی تا یکسالگی: ۲۵ مورد

همه شاخص های زیر قابل محاسبه است، بجز:
الف) PMR
ب) NMR
ج) PNMR
د) IMR

۱۳۳- کودک متولد شده در ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ و بدون سابقه قبلی واکسیناسیون، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ به مرکز جهت تزریق واکسن آورده شده است. در این مراجعه چه واکسن هایی به این کودک باید تزریق شود؟
الف) سه گانه، هیپاتیت ب، فلج اطفال خوراکی، فلج اطفال تزریقی، MMR
ب) پنتاوالان، فلج اطفال خوراکی، فلج اطفال تزریقی، MMR
ج) سه گانه، هیپاتیت ب، فلج اطفال خوراکی، MMR
د) پنتاوالان، فلج اطفال خوراکی، MMR

۱۳۱- کدام شاخص به منظور بررسی تأثیر مصرف روزانه ۲ عدد قرص آهن طی یک ماه در مادر بارداری که در سه ماهه دوم بارداری اش دارای هموگلوبین ۱۰ میلی گرم در دسی لیتر بوده، صحیح است؟
الف) متوسط حجم گلبولی
ب) فریتین
ج) افزایش حجم رتیکولوسیت‌ها
د) سطح سرمی آهن

۱۳۵- طبق دستورالعمل کشوری در مورد کودک سالم، کدامیک از موارد زیر در مورد تغذیه شیرخوار با شیر مادر صحیح نیست؟
الف) طی هفته اول تولد، اگر کودک خودش در شب بیدار نشود، باید او را بعد از ۳ ساعت جهت شیردهی بیدار نمود.
ب) طی هفته اول تولد، ۸-۱۰ بار شیردهی در ۲۴ ساعت کافی می‌باشد.
ج) طی ۱ هفته ۶ تا ۸ تغذیه، حداقل ۸ بار شیردهی در ۲۴ ساعت کافی می‌باشد.
د) طی ۷-۸ ماهگی، حداقل ۸ بار شیردهی در ۲۴ ساعت کافی می‌باشد.

نوزادان

۱۳۶- اولین و شایع‌ترین نشانه دیسترس تنفسی در نوزادان کدام است؟
الف) رتراکسیون قفسه سینه
ب) سیانوز
ج) تنفس بیش از ۶۰ بار در دقیقه
د) صدای ناله انتهای دمی

۱۳۷- عامل مؤثر بر امتیاز آنگار منفی کدام است؟
الف) سوکفات منیزیم
ب) نوروتائین مادرزادی
ج) آنزیم کوآن
د) اسیدوز مادر

۱۳۸- در هنگام بررسی نوزاد دختر، کدام یافته غیرطبیعی محسوب می‌شود؟
الف) خوتربزی از واژن
ب) عدم دفع مکنویم در ۲۴ ساعت اول
ج) بزرگی کلیتورس و برجسته بودن لب‌های کوچک
د) تورم و سفتی پستان‌ها

۱۳۹- عارضه کرون ایکتروس از پیامدهای عدم کنترل کدام بیماری در نوزاد است؟
الف) ماکروگلوبولینمی
ب) فیلکتینوری
ج) هیپوتیروئیدسم مادرزادی
د) غیربیلی‌روبینمی

۱۴۰- در معاینه چشم نوزاد میکروسفال تازه متولد شده، اسکار ماگولا و لکه‌های کوچک در شبکیه مشاهده شده است. محتمل‌ترین علت کدام است؟
الف) پاروویروس
ب) ویروس زیکا
ج) سوء تغذیه دوران بارداری
د) ترومای شدید مادر در دوران بارداری

۱۴۱- علت اورویاتی انسدادی در نوزاد کدام است؟
الف) سندرم مثانه بزرگ، کولون کوچک، کاهش پرستالیزم رودهای
ب) هیدروویوتر و نفروز دو طرفه
ج) اولیگوهایدر و آمینوس
د) هیپوبلازی ریبی

۱۴۲- کدامیک از جملات زیر در خصوص پلنورا صحیح است؟
الف) در نوزادان پره‌ترم شایع است.
ب) در پلی‌سیتمی دیده می‌شود.
ج) ناشی از کم‌خونی است.
د) در تشنج صخیم شدن پوست اتفاق می‌افتد.

۱۴۳- در معاینه چشم نوزادی قطر قرنیه بیش از یک سانتی متر است و فوتوفونی و اشک ریزش مشاهده می‌شود. کدام عارضه بیشتر مطرح است؟
الف) کاناراکت
ب) کوربورتینت
ج) گلوکوم
د) ریتینوپاتی نارس

۱۴۴- ادم لوکالیزه در نوزاد کدام یک از موارد زیر را بیشتر مطرح می‌کند؟
الف) نارس بودن
ب) هیپرتانرمی ثانویه به آرتریوپلاستوز
ج) سندرم هورلر
د) ناهنجاری مادرزادی عدد لنگاوی

15600701

۱۴۵- در نوزاد مبتلا به دیسترس تنفسی خاد در صورت طبیعی بودن ریه‌ها در رادیوگرافی قفسه سینه، کدامیک از موارد زیر بیشتر مطرح است؟
الف) کم‌خونی
ب) سندرم دیسترس تنفسی

۱۴۶- ساکشن مجاری تنفسی احتمال بروز کدام عارضه در نوزاد را افزایش می‌دهد؟
الف) برنکولوپنی
ب) تاکی کاردی
ج) اسپیراسیون
د) مننژیت

۱۴۷- ضربان قلب نوزاد ۵ دقیقه پس از تولد، ۷۰ ضربه در دقیقه - تنفس نامنظم و آهسته - رنگ پریده - با ورود کاتتر به داخل بینی عطسه می‌کند و اندام‌ها دارای فلکسیون است. نمره آپگار دقیقه ۵ نوزاد چقدر است و اقدامات بعدی کدام است؟

- الف) ۷ / تا یک ساعت هر ۵ دقیقه امتیاز آپگار اندازه‌گیری می‌شود.
- ب) ۵ / تا ۲۰ دقیقه هر ۵ دقیقه امتیاز آپگار کنترل می‌شود.
- ج) ۷ / نیاز به پیگیری ندارد.
- د) ۵ / احیای فوری نیاز است.

۱۴۸- همه گزینه‌ها برای ترخیص نوزاد ۲۷ هفته با لیه و زایمان بدون عارضه صحیح است. به جز
الف) تنفس ۶۸ بار در دقیقه
ب) دفع یک بار مدفوع
ج) حداقل دو بار تغذیه موفقیت‌آمیز و بدون عارضه
د) درجه حرارت زیربغل ۳۶/۴-۳۶/۵ درجه سانتی‌گراد در گهواره باز

۱۴۹- وجود مناطق نرم در ناحیه پس سری نوزاد ممکن است با کدام عارضه همراه باشد؟
الف) آپلازی مادرزادی پوست سر
ب) پلاکیوسفالی ناشی از تغییر شکل
ج) استوزنزامیرفکتا
د) بریزوشی ۱۳

۱۵۰- در نوزاد متولد شده از مادر دیابتیک در خصوص سنجش گلوکز خون، کدام اقدام صحیح است؟
الف) اگر بدون علامت باشد، نیاز به بررسی نیست.
ب) بلافاصله بعد از زایمان در همه نوزادان انجام می‌شود.
ج) در عرض ۳۰ دقیقه اول بعد از زایمان و قبل از تغذیه با شیر مادر باید انجام شود.
د) بعد از تغذیه از شیرمادر طی یک ساعت اول و دوه زندگی باید انجام شود.

جنین‌شناسی

۱۵۱- الگوی افت متغیر ضربان قلب جنین در تست استرس انتیاضی (CST) بیانگر کدام مورد زیر است؟
الف) اولیگوهیدروآمنیوس
ب) پلی‌هیدروآمنیوس
ج) طبیعی
د) ارض تشخیص ندارد

۱۵۲- در ارتباط با منشاء بخش مادری جفت کدام گزینه صحیح است؟
الف) دسیدوای کیسولی
ب) دسیدوای قاعدی
ج) کوریون صاف
د) کوریون فروندوزوم

۱۵۳- ترشح سورفاکتانت از کدام سلول‌ها و در چه زمانی شروع می‌شود؟
الف) پتوموسیت‌های نوع II از هفته ۲۷ جنینی به بعد
ب) پتوموسیت‌های نوع I از هفته ۲۶ جنینی به بعد
ج) پتوموسیت‌های نوع II از هفته ۱۸ جنینی به بعد
د) پتوموسیت‌های نوع II از هفته ۲۴ جنینی به بعد

۱۵۴- کدامیک از عوامل عفونی زیر موجب گلوسی فیکاسیون مغزی در جنین می‌شود؟
الف) ویروس سرخچه
ب) توکسوپلاسموز
ج) ویروس HIV
د) واریسلا زوستر

۱۵۵- علی فر ایند نکوبین قلب کدام ساختار زیر از شاخ سینوسی چپ به وجود می آید؟

- الف) دریچه ورود اجوف تحتانی
- ب) سینوس کروناری
- ج) سینوس ونازوم
- د) ششغ انتهای

۱۵۶- باقی ماندن مجرای دهلیزی - بطنی اولیه (Persistent atrioventricular canal) با همه ناهنجاری های زیر همراه است به جز؟

- الف) نقص دیواره بین بطنی
- ب) نقص دیواره بین دهلیزی
- ج) نقص دریچه های بستی
- د) نقص دریچه های سه لتی و دو لتی

۱۵۷- قسمت تحتانی مجرای مزونفروس در جنس مونث در حین تکامل می تواند کدامیک از ساختارهای زیر را به وجود آورد؟

- الف) Epoophoron
- ب) Appendix testis
- ج) Paroophoron
- د) Gartner's cyst

۱۵۸- در صورتی که با حرکات جنین، ضربان قلب جنین افزایش نیابد، تفسیر شما به عنوان ما ما کدام است؟

- الف) Reactive
- ب) Nonreactive
- ج) رضایت بخشی نیست
- د) طبیعی است

۱۵۹- برای ارزیابی رشد ریه های جنین کدام روش ارزیابی را توصیه می کنید؟

- الف) اولتراساوند
- ب) نمونه گیری از بزرگ های کورپون
- ج) امپوستتر
- د) الکتروکاردیوگرافی

۱۶۰- رباط گرد کبندی در اثر بسته شدن کدام ساختار زیر به وجود می آید؟

- الف) ورید نافی
- ب) شریان نافی
- ج) مجرای وریدی
- د) مجرای شریانی

۱۶۱- کدام مرحله جنینی حساس ترین دوره زندگی درون رحمی نسبت به عوامل نراتوزن است؟

- الف) مرحله پیش از لانه گذاری
- ب) علی مدت زمان لانه گذاری
- ج) هفته سوم تا هفتم حاملگی
- د) هفته نهم تا پایان حاملگی

۱۶۲- کدامیک از موارد زیر علت رقیق شدن موکوس گردن رحم را بیان می کند؟

- الف) افزایش پرومون استروژن
- ب) کاهش ترشح غدد رحمی
- ج) زیاد شدن شایع فولیکولی
- د) کاهش جریان خون سرخرگ های رحمی

۱۶۳- پوره های اولیه در حین تکامل جفت در کدام هفته تشکیل می شوند؟

- الف) چهارم
- ب) سوم
- ج) دوم
- د) اول

۱۶۴- به منظور ارزیابی سلامت جنین در حاملگی چندقلو کدام اقدام ممنوع است؟

- الف) ماینتریت خارجی جنین
- ب) تست استرس
- ج) تست بدون استرس
- د) امپوستگویی

۱۶۵- بهترین زمان بررسی آنومالی های جنین کدام است؟

- الف) ۱۷-۱۰ روز بعد از تشخیص حاملگی
- ب) ۵۶-۱۷ روز بعد از تشخیص حاملگی
- ج) ۱۷-۱۰ روز بعد از تشخیص صدای قلب
- د) ۵۶-۱۷ روز بعد از لقاح

ایران عرضه

مرجع نمونه سوالات

آزمون های استخدامی

به همراه پاسخنامه تشریحی

خدمات ایران عرضه:

- ارائه اصل سوالات آزمون های استخدامی
- پاسخنامه های تشریحی سوالات
- جزوات و درسنامه های آموزشی

برای دانلود رایگان جدیدترین سوالات استخدامی ادوار گذشته وزارت بهداشت، اینجا بزنید

همچنین جهت مشاهده آخرین اخبار استخدامی وزارت بهداشت، اینجا بزنید

« انتشار یا استفاده غیر تجاری از این فایل، بدون حذف لوگوی ایران عرضه، مجاز می باشد »

