

توضیحات:

- مجری جهاد دانشگاهی
- آزمون مهر ۱۴۰۲
- حیطة تخصصی
- شامل ۴۵ سوال

اصل سوالات استخدامی

حیطه تخصصی فوریت پزشکی

پیش بیمارستانی (کاردان)

وزارت بهداشت ۱۴۰۲

برای دانلود رایگان جدیدترین سوالات استخدامی ادوار گذشته وزارت بهداشت، اینجا بنزید

همچنین جهت مشاهده آخرین اخبار استخدامی وزارت بهداشت، اینجا بنزید

« انتشار یا استفاده غیر تجاری از این فایل، بدون حذف لوگوی ایران عرضه، مجاز می باشد »



- ۹۱- وجود کدامیک از داروهای زیر در دستورالعمل دارو و تجهیزات اورژانس بیش بیمارستانی کشور، اختیاری است؟
 الف) آمپول‌ها (ب) آنتوزین (ج) آتروپین (د) وریامیل
- ۹۲- مطالعه اثرات دارو در بدن و تعامل آن با سیستم‌ها و فرایندهای بیولوژیکی و تاثیر داروها در سطح سلولی و مولکولی را چه می‌نامند؟
 الف) فارماکودینامیک (ب) فارماکوکینتیک (ج) جذب (د) متابولیسم
- ۹۳- در کنترل علامت اضطرابه خاتم جوانی که دچار حمله پانیک شده است، کدام گزینه مناسب‌تر است؟
 الف) میدازولام (ب) پرومتازین (ج) هالوپریدول (د) مورفین
- ۹۴- کدامیک از داروهای زیر را می‌توان در محلول قندی رفیق نموده و تزریق کرد؟
 الف) فلوکسین (ب) فنی توئین (ج) فنتورستال (د) هیچ دارویی نباید در محلول قندی رفیق شود
- ۹۵- کدامیک به عنوان آنتی دوت استامینوفن می‌باشد؟
 الف) وریامیل (ب) ان استیل پیرتین (ج) اتسولین (د) بیکریئات سدیم
- ۹۶- جن احیای آلفای میانسالی که به طور ناگهانی دچار ارست قلبی تنفسی شده است، به دلیل ریتم VF شوک با AED داده آید و کماکان ریتم VF پایدار می‌باشد. داروی مناسب در درمان، کدام گزینه است؟
 الف) متوپروپولول (ب) آمپول‌ها (ج) آنتوزین (د) پروکائین آمید
- ۹۷- در درمان رای مصرف بنزودیازپین‌ها، کدام گزینه درست بیان شده است؟
 الف) دیازپام - رکتال (ب) لورازپام - ورال (ج) میدازولام - زیر پوستی (د) فنی توئین - داخل تریک
- ۹۸- کدامیک از داروهای زیر را از طریق لوله تراشه می‌توان تزریق کرد؟
 الف) دیازپام - لیدوکائین (ب) این کلرین - آمپول‌ها (ج) این کلرین - پانوکسین (د) اتسولین - آنتوزین
- ۹۹- در مورد درمان با آتروپین کدام گزینه درست است؟
 الف) حداقل دوز قابل تزریق بزرگسالان ۲ میلیول در هر ۳۰ دقیقه تزریق است.
 ب) بیشترین دوز قابل تزریق در هر ۳۰ دقیقه ۶ میلیول است.
 ج) در درمان مسهویت با قارچ شروع درمان ۶ میلیول می‌باشد.
 د) در مسهویت از گنوفسفره نباید بیش از ۱ میلیول وریدی تزریق شود.
- ۱۰۰- سندروم اکستراپیرامیدال (EPS)، دیسکنزی پارکینسون و یوسیت به ترتیب از عوارض مصرف کدام داروها است؟
 الف) متوکلوپرامید، انداسترون، انداسترون
 ب) انداسترون، انداسترون، متوکلوپرامید
 ج) متوکلوپرامید، متوکلوپرامید، انداسترون
 د) انداسترون، متوکلوپرامید، متوکلوپرامید
- ۱۰۱- منابع مناسب بیمارانی دچار سوختگی و دوز آن در یک ساعت اول درمان در اورژانس بیش بیمارستانی چقدر است؟
 الف) ۱ لیتر در بزرگسالان و ۵۰۰ سی‌سی در کودکان (ب) ۲ لیتر در بزرگسالان و ۲۵۰ سی‌سی در کودکان
 ج) ۲ لیتر در بزرگسالان و ۵۰۰ سی‌سی در کودکان (د) ۲ لیتر در بزرگسالان و ۲۵۰ سی‌سی در کودکان
- ۱۰۲- هر ویل دکنسروز ۲۰ و ۵۰ درصد به ترتیب چند میلی گرم قند دارد؟
 الف) ۲۰ - ۵۰ (ب) ۱۵ - ۲۰ (ج) ۱۰ - ۲۵ (د) ۱۰۰ - ۲۰
- ۱۰۳- کدامیک از داروهای زیر جز داروهای مهار کننده آنزیم تبدیل آنژیوتانسین قرار می‌گیرد؟
 الف) لوزین (ب) فنی توئین (ج) استروکسیپروین (د) کاپتوپریل
- ۱۰۴- جن انتقال بیمار با له شدگی اندام پز شک ۵۰-۱۰۰ دستور تجویز فنی توئین وریدی میدهد بیمار شما در حال دریافت یک سرم قندی از دست راست است. اقدام مناسب شما کدام گزینه است؟
 الف) تزریق از همان دست بالامع است.
 ب) فنی توئین را داخل همان سرم می‌ریزم.
 ج) فنی توئین را داخل دست بالامع است.
 د) فنی توئین را داخل همان سرم می‌ریزم.
- ۱۰۵- بیماری که سابقه جراحی مغز دارد دچار حمله تشنج شده است که ۵۰ نوبت بدون وقفه ادامه دارد. بیمار در حال مصرف ۵۰۰ میلیگرم فنی توئین است. اقدام مناسب کدام گزینه است؟
 الف) ۵۰۰ میلیگرم فنی توئین وریدی (ب) ۱۰۰۰ میلیگرم فنی توئین وریدی (ج) ۱۰۰۰ میلیگرم فنی توئین وریدی (د) ۱۰۰۰ میلیگرم فنی توئین وریدی

۱۱- بیماری دچار تروما شده است. در صحنه دهان بیمار واضحاً بوی الکل می‌دهد و شروع به تشنج می‌کند کدام اقدام را اولویت است؟

- (الف) چک قند خون بیمار
- (ب) تزریق میدازولام
- (ج) مانیثورینگ قلبی و اکسیژن
- (د) انتقال بیمار در حالت خوابیده به بیلو

۱۱۸- آقای جوانی حین کار با دستگاه برش در کارگاه دچار آمپوتاسیون از بالای مچ دست شده است خونریزی شریانی شدید دارد. کدام گزینه حین انتقال نادرست است؟

- (الف) سستشوی عضو قطع شده یا فشار با نرمال سالین
- (ب) تورنیک اندام
- (ج) پانسمان فشاری محل زخم
- (د) عضله شده باید همراه بیمار منتقل شود

۱۱۹- عابر پیاده ای به دنبال حادثه ترافیکی روی زمین افتاده است. در بدو معاینه متوجه آسیب به ناحیه سر می‌شوید. قبل از رسیدن شما تکنسین موتور آمبولانس از بیمار رگ گرفته است. قبل از شروع ارزیابی اولیه، بیمار دچار تشنج تونیک کلونیک می‌شود. بهترین اقدام در زمان تشنج فعال بیمار کدام است؟

- (الف) کنترل تشنج با استفاده از بنزودیازپین
- (ب) اتوباسیون بیمار
- (ج) تزریق قلی تونین وریدی
- (د) کنترل فشار خون بیمار

۱۲۰- شکل مقابل نشان دهنده کدام نوع خونریزی مغزی متعاقب تروماست؟



- (الف) ساب دورال
- (ب) SAH
- (ج) ایی دورال
- (د) ICH

اورژانس‌های داخلی و برخورد با عوارض ناشی از آن

۱۲۱- کدامیک از انواع شوک در بیمار دچار آمبولی ریه شایع‌تر است؟

- (الف) شوک نروژنیک
- (ب) شوک توزیعی
- (ج) شوک انسدادی
- (د) شوک هموراژیک

۱۲۲- کدام دارو برای بیمار دچار مسمومیت با متانول مناسب نیست؟


- (الف) فومبیزول
- (ب) اتانول خوراکی
- (ج) اتانول وریدی
- (د) دفروکسامین

۱۲۳- همکار شما با سابقه مصرف داروی ضد تشنج دارد و به طور ناگهانی تشنج تونیک کلونیک می‌کند. اولین اقدام شما کدام گزینه است؟

- (الف) تزریق میدازولام
- (ب) محافظت از تروما تا اتمام تشنج
- (ج) چک نبض کاروتید
- (د) چک قند خون

۱۲۴- بیمار آقای ۵۸ ساله با سابقه آسم، دچار تنگی نفس شده است. تنگی نفس وی ناگهانی و فعالیتی بوده است. در معاینه هوشیار ولی مضطرب است. سمع ریه رال دارد. BP:105/80 HR:106 RR:20 کدامیک در درمان وی مناسب تر است؟ (نوار قلب را در شکل می‌بینید)

- (الف) سالیتامول
- (ب) آنرووت
- (ج) هیدروکورتیزون
- (د) لازیکس



۱۲۵- کودکی با وزن حدود ۲۰ کیلوگرم دچار اختلال سطح هوشیاری و تعریق و رنگ پریدگی است و اختلال در بلع دارد. در چک قند، عدد ۳۸ را روی دستگاه گلوکومتر می‌بینید. کدامیک از درمان‌های زیر را برای بیمار انجام می‌دهید؟

- (الف) ۵۰ سی سی از محلول دکستروز ۲۰ درصد
- (ب) ۲۵ سی سی از محلول دکستروز ۲۰ درصد
- (ج) ۲۵ سی سی از محلول دکستروز ۵۰ درصد
- (د) ۵۰ سی سی از محلول دکستروز ۵۰ درصد

۱۲۶- پسر ۱۷ ساله روستایی با کاهش سطح هوشیاری را ویزیت می‌کنید. در گلوکومتری High BS می‌باشد با توجه به اینکه تا مرکز درمانی یک ساعت فاصله دارید، اقدام مناسب در صحنه کدام گزینه است؟ بیمار انسولین در منزل دارد

- (الف) تزریق N.S
- (ب) تزریق انسولین
- (ج) تزریق متوکسیل
- (د) تزریق انسولین NPH

۱۲۷- پنج شنبه شب والدین کودک ۷ ساله ای با ۱۱۵ تماس گرفته‌اند. طبق گزارش ایشان کودک دچار یک حمله تشنج شده است. شما بر بالین وی حاضر می‌شوید در معاینه کودک تب دار و دچار افت هوشیاری است. معاینه نرولوژیک وی نشان دهنده سفتی و ردور گردن است. روی پوست ضایعاتی مشاهده می‌شود. شما مجبور به مدیریت راه هوایی وی شده اید و بدلیل اضطراب والدین فراموش کردید که ماسک بزنید. کدام گزینه در این ماموریت درست است؟

- (الف) سیروفلوکساسین خوراکی می‌خورید.
- (ب) منتظر جواب CSF بیمار می‌شوید، اگر مثبت بود سفتریاکسون به خودتان تزریق می‌کنید.
- (ج) آموکسی سیلین شروع می‌کنید.
- (د) تا شنبه صبر می‌کنید و برای مشاوره به کلینیک عفونی می‌روید.

۱۲۸- بر بالین بیماری حاضر می‌شوید که در مقابل شما دچار علائم تشنج می‌شود. متعاقب اجرای پروتکل جامع برخورد با بیمار ترومایی، و به محض دیدن تشنج در بیمار اولین اقدام نبض را چک می‌کنید. بیمار نبض ندارد. محتمل‌ترین تشخیص کدام است؟

- (الف) در جریان تشنج، نبض معمولاً نبض لیس نمی‌شود
- (ب) VF
- (ج) آسیتول
- (د) PEA

۱۲۹- بیماری با سابقه آسم دچار آسم شده و علی‌رغم مصرف اسپری خوب نشده و با EMS تماس گرفته است. در حال حاضر بیمار کاملاً سیانوتیک است. دیسترس تنفسی دارد. BP:100/30 PR:140 است و سمع دو طرفه صدایی شنیده نمی‌شود. بیمار کاملاً بی‌قرار است اقدام مناسب در این مرحله کدام گزینه است؟

- (الف) هیدروکورتیزون وریدی (ب) ای تیفرین عضلانی (ج) میدازولام وریدی (د) آمینوفیلین وریدی

۱۳۰- تندر نس در نقطه مک بوزنی به نفع کدام تشخیص است؟

- (الف) آپاندیسیت
- (ب) کوله سیستیت
- (ج) ایسکمی شریان مزانتریک
- (د) پرفوراسیون معده

۱۳۱- مسمومیت بیماری دو ساعت قبل دوز بالای آبی تربیتلین مصرف کرده و با ۱۱۵ تماس گرفته است. در بالین مختصری طپش قلب دارد و در نوار قلب فقط تاکی کاردی سینوسی دارد. اقدام مناسب کدام است؟

- (الف) توصیه به استفراغ
- (ب) تجویز برابرانول و توصیه مراجعه سر بایی
- (ج) تزریق بی کربنات وریدی
- (د) اعزام به بیمارستان و انجام مانیتورینگ دقیق قلبی

۱۳۲- خانم ۳۵ ساله بعلت تپش قلب مراجعه نموده است. بیمار تنگی نفس یا درد قفسه سینه و احساس سنگی سر ندارد. فشار خون بیمار ۱۲۰/۷۸ می‌باشد. کدام اقدام اول توصیه می‌شود؟

- (الف) آدنوزین ۳ میلی گرم IV Bolus
- (ب) آدنوزین ۱۲ میلی گرم IV slow push (طی ۱ تا ۲ دقیقه)
- (ج) ای تیفرین ۱ میلی گرم IM و تکرار در صورت لزوم
- (د) مانور تحریک سمباتیک

۱۳۳- در بیماری که علامت FAST مثبت است کدام اقدامات در صحنه انجام می‌شود؟

- (الف) بایش فشار خون - برقراری خط وریدی - کنترل قند خون
- (ب) فعال کردن کد سما - بایش فشار خون - برقراری خط وریدی - کنترل قند خون
- (ج) فعال کردن کد سما - بایش فشار خون - برقراری خط وریدی - کنترل قند خون - شرح حال
- (د) بایش فشار خون - برقراری خط وریدی - کنترل قند خون - شرح حال

۱۳۴- آقای میانسال با سابقه مشکل ربوی دچار تب و تاکی کاردی و ضعف شده است. واضحاً دیسترس تنفسی دارد و در سمع ریه‌ها و بزرنگ و کراکل پنرالیزه سمع می‌شود. کدام یک از درمانهای زیر در اولویت نمی‌باشد؟

- (الف) اسپری سالیونامول
- (ب) هیدروکورتیزون وریدی
- (ج) سفتریاکسون تزریقی
- (د) اسپرس آنروونت

۱۳۵- کودک ۷ ساله ای در هتل دچار تهوع و استفراغ و اسهال شده است. اسهال بیمار غیر خونی ولی حجیم است. بدلیلی شخصی تمایل به اعزام به بیمارستان ندارد. از بین داروهای زیر کدام گزینه مناسب وی نیست؟

- (الف) سرم نرمال سالین
- (ب) متوکلوپرامید
- (ج) هیوسین
- (د) فلاناسترون

www.kapook.com

موارد ویژه (اطفال، سالمندان، زنان و اورژانس محیطی)

۱۳۶- بهترین اقدام مناسب برای بیمار دچار هایپرنرمی کدام است؟

- (الف) اسبیری آب ۱۵ درجه و استفاده از فن
- (ب) اسبیری آب ۲۵ درجه و استفاده از فن
- (ج) اسبیری آب سرد و استفاده از فن
- (د) قرار دادن کیسه یخ در دست و پا و صورت بیمار

۱۳۷- خانم ۲۶ ساله باردار در هفته ۳۱ بارداری دچار سردرد شدید و درد اینگاستر شده است. حین انتقال به بیمارستان دچار تشنج تونیک کلونیک می شود. موثرترین درمان برای پیشگیری از تشنج های بعدی در این بیمار کدام است؟

- (الف) دیازپام
- (ب) فنی توئین
- (ج) ای کربونات سدیم
- (د) سولفات منیزیم

۱۳۸- کودک ۵ ساله ای متعادل گزش زنبور دچار تورم صورت و لبها، تنگی نفس، تهوع، درد شکم و دیسترس تنفسی شده است اقدام مناسب کدام گزینه است؟

- (الف) ای کربن ۰.۳ میلی گرم عضلانی
- (ب) ای کربن ۰.۵ میلی گرم عضلانی
- (ج) هیستروکورتیزون وریدی
- (د) درمان های حمایتی

۱۳۹- خانمی به دنبال زایمان یک ساعت قبل دچار تداوم خونریزی واژینال شده است. با توجه به فاصله حدود یک

- (الف) یک ساعت تا مرکز درمانی کدام اقدام زیر درست می باشد؟
- (ب) جک وازن با گاز استریل
- (ج) جک وازن با گاز استریل
- (د) اقدامی لازم ندارد

۱۴۰- در کنترل بیمار دچار اختلال رفتاری و روانی در صورت نیاز به ایجاد مهار فیزیکی کدام گزینه صحیح نیست؟

- (الف) استفاده از مهار کننده عریض و جرعی
- (ب) ایجاد محدودیت فیزیکی فقط با استفاده از دست و پا
- (ج) کنترل علامت حیاتی هر ۱۵ دقیقه
- (د) قرار دادن بیمار در وضعیت Prone

۱۴۱- بدنیاال تناس تلفیقی با مالگرد به منطقه کوهستانی اعزام شده است. آقای ۲۷ ساله ای را ویزیت می کنید که بدنیاال گزش مع دست با نیش مار یا ۱۱۵ تماس گرفته است. مار را کشته اند و شکل آن را مشاهده می کنید. همراهان بالای آرنج وی را محکم با باند بستند. به نحوی که جریان خون قطع شده است. شما نیم ساعت تا مرکز درمانی فاصله دارید. بیمار

علامتی به جز اضطراب و تبش قلبی ندارد. کدام اقدام مناسب است؟

- (الف) باز کردن توریکه و اقل دست و قرار دادن دست زیر قلب
- (ب) حفظ توریکه در طول اعزام
- (ج) باز کردن توریکه و بستن بانداژ الاستیک به جای آن
- (د) ماسک سی نیست و اقدام خاصی جزه اطمینان دهی لازم نیست



Lithotomy (د)

۱۴۲- در زایمان اگر عضو نمایش سر نوزاد نباشد مادر در چه پوزیشنی باید قرار گیرد؟

- (الف) Prone
- (ب) Squatting
- (ج) Knee-chest
- (د) Lithotomy

۱۴۳- نوزاد ۲۵ روزه ای نیازمند تهویه با ماسک است وزن وی ۲ کیلوگرم است. در مورد تعداد تنفس و حجم نسبی در هر نفس کدام گزینه مناسب تر است؟

- (الف) ۳۰ تا ۴۰ دقیقه - ۳۰ سی سی
- (ب) ۲۰ تا ۳۰ دقیقه - ۲۰ سی سی
- (ج) ۱۶ تا ۲۰ دقیقه - ۲۰ سی سی
- (د) ۲۰ تا ۳۰ دقیقه - ۱۲ سی سی

۱۴۴- بیمار سابقه مصروف داروهای متعدد به دلیل فشار خون بالا و مشکل قلبی ریوی و آلزایمر دارد. جراحی تنگی کانال نخاعی ۱۰ سال قبل انجام داده اند. اقدام مناسب کدام است؟

- (الف) تریپل کتیلوлак عضلانی
- (ب) جک بسترهای بیمارستان
- (ج) تریپل بتاستازون عضلانی
- (د) نیازمند کاربیشتری نمی باشند

۱۴۵- در مورد بی حرکت سازی بیماری که دچار مارگزیدگی شده کدام گزینه صحیح است؟

- (الف) بی حرکت سازی کامل بیمار و عضو گزیده شده لازم است
- (ب) بی حرکت سازی بیمار لازم نیست
- (ج) بی حرکت سازی عضو گزیده شده توسط ایل کفایت
- (د) بی حرکت سازی بیمار لازم نیست

۱۴۶- در خونریزی واژینال در صورت وجود علامت شوک انجام کدامیک از گزینه ها صحیح نیست؟

- (الف) دادن مایع سالین وریدی ۲-۱ لیتر
- (ب) ماساژ فوندوس در خونریزی بعد از زایمان
- (ج) قرار دادن پدهای جثی در زیر بیمار
- (د) قرار دادن پدهای جثی در زیر بیمار

ایران عرضه

مرجع نمونه سوالات

آزمون های استخدامی

به همراه پاسخنامه تشریحی

خدمات ایران عرضه:

- ارائه اصل سوالات آزمون های استخدامی
- پاسخنامه های تشریحی سوالات
- جزوات و درسنامه های آموزشی

برای دانلود رایگان جدیدترین سوالات استخدامی ادوار گذشته وزارت بهداشت، اینجا بزنید

همچنین جهت مشاهده آخرین اخبار استخدامی وزارت بهداشت، اینجا بزنید

« انتشار یا استفاده غیر تجاری از این فایل، بدون حذف لوگوی ایران عرضه، مجاز می باشد »

