

توضیحات:


- مجری آزمون دانشگاه علوم پزشکی
- شامل اصل سوالات تخصصی
- آزمون شهریور ۱۳۹۸
- شامل ۱۲۹ سوال

اصل سوالات آزمون استخدامی کاردانی و کارشناسی بهورزی ۱۳۹۸

برای دانلود رایگان جدیدترین سوالات استخدامی ادوار گذشته بهورزی، اینجا بزنید

همچنین جهت مشاهده آخرین اخبار استخدامی بهورز، اینجا بزنید

« انتشار یا استفاده غیر تجاری از این فایل، بدون حذف لوگوی ایران عرضه، مجاز می باشد »



فهرست مطالب (برای مراجعه به هر بخش، روی عنوان بزنید)

❖ بیماری های واگیر - صفحه ۲

❖ بهداشت محیط - صفحه ۴

❖ آموزش و ارتقاء سلامت - صفحه ۴

❖ بهداشت حرفه ای - صفحه ۵

❖ مراقبت مادران - صفحه ۶

❖ مراقبت سالمند - صفحه ۶

❖ بهداشت دهان و دندان - صفحه ۷

❖ بیماری های غیرواگیر - صفحه ۷

❖ بهداشت روان - صفحه ۸

❖ دارویی - صفحه ۹

❖ کودک سالم - صفحه ۹

❖ مراقبت میانسالان - صفحه ۱۰

❖ بهداشت مدارس - صفحه ۱۱

❖ سلامت نوجوانان - صفحه ۱۱

❖ سلامت جوانان - صفحه ۱۲

❖ باروری سالم - صفحه ۱۲

❖ مانا - صفحه ۱۳

❖ شیر مادر - صفحه ۱۴

❖ آمار - صفحه ۱۴

❖ نوزادان - صفحه ۱۵

❖ تغذیه - صفحه ۱۶

❖ پزشک خانواده - صفحه ۱۶

❖ استریلیزاسیون - صفحه ۱۷

❖ زیج حیاتی - صفحه ۱۷

❖ فصلنامه بهورزی - صفحه ۱۸

بیماری های واگیر

۱- کدام یک از موارد زیر نشان دهنده وقوع طغیان در منطقه تحت پوشش نمی باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) بروز بیماری بیشتر از حد انتظار

(۲) بروز بیماری در حد انتظار

(۳) بروز یک مورد بیماری در صورتی که قبلا هیچ موردی نبوده است.

(۴) بروز دو مورد یا بیشتر با علائم مشابه که از منبع غذایی یا اشامیدنی مشترک استفاده کرده اند.

۲- کدام بیماری آنفلوآنزای فصول گرم نام دارد؟ (iranarze.ir)

(۱) لیشرمانیوز

(۲) سیاه سرفه

(۳) هموفیلوس آنفلوآنزا نوع ب

(۴) تب کریمه گنگو

۳- شاخص VVM نشانه چیست؟ (iranarze.ir)

(۱) در معرض سرما زدگی واکسن

(۲) در معرض گرما زدگی واکسن

(۳) خراب شدگی واکسن

(۴) هم سرما زدگی و هم گرمazedگی واکسن

۴- مهمترین علامت بیماری آنفلوآنزا کدام است؟ (iranarze.ir)

(۱) تب بالای ۳۸.۵

(۲) سرفه

(۳) گلو درد

(۴) درد عضلانی

۵- علائم مظنون به بیماری دیفتری چیست؟ (iranarze.ir)

(۱) هر بیمار مبتلا به فارنژیت، لارنژیت به همراه غشاء چسبنده روی لوزه ها، حلق و یا داخل بینی

(۲) هر موردی که طبق نظر پزشک از لحاظ بالینی به بیماری دیفتری مشکوک باشد.

(۳) گزینه ۱ و ۲

(۴) هیچ کدام

۶- جهت تشخیص سل ریوی چند نمونه نیاز است؟ (iranarze.ir)

(۱) سه نمونه خلط در عرض ۲ تا ۳ روز جمع آوری شود

(۲) ۲ نمونه خلط در عرض ۲ روز جمع آوری شود.

(۳) گزینه ۱ و ۲ صحیح می باشد.

(۴) هیچکدام

۷- در صورتیکه جواب آزمایش نمونه خلط مشکوک به سل منفی باشد چه اقدامی باید انجام شود؟ (iranarze.ir)

(۱) مجددا نمونه خلط از بیمار گرفته شود.

(۲) درمان با انتی بیوتیک وسیع الطیف

(۳) درخواست عکس رادیولوژی از قفسه سینه

(۴) کار خاصی نیاز نیست صورت گیرد.

۸- عوارض واکسن پولیو خوراکی کدامند؟ (iranarze.ir)

(۱) فلجی پس از دریافت واکسن

(۲) آلرژیک (سختی در تنفس یا بلع، خارش، قرمزی پوست، التهاب چشمها

(۳) تحریک پذیری، از دست دادن اشتها و خستگی

(۴) همه موارد

۹- اولین نوبت اجباری انجام تست اچ ای وی در زنان باردار چه زمانی است؟ (iranarze.ir)

- (۱) اولین ویزیت
- (۲) ۳ ماهه سوم بارداری
- (۳) هفته ۳۶ بارداری
- (۴) هیچ کدام

۱۰- کلیه اتباع غیر ایرانی که در ۲ سال اخیر به کشور وارد شده اند و یا در ۲ سال اخیر رفت و آمد به کشور مبداء داشته اند، مشمول اجباری چه نوع

آزمایشی هستند؟ (iranarze.ir)

- (۱) بررسی از نظرتب کریمه کنگو
- (۲) بررسی از نظر سل
- (۳) بررسی از نظر مالاریا(تهیه لام)
- (۴) بررسی از نظر ایدز

بهداشت محیط

۱۱- در طبقه بندی کلی پسماند پزشکی، حدود ۸۰ درصد وزنی پسماند پزشکی را کدام دسته تشکیل می دهد؟ (iranarze.ir)

- (۱) پسماند غیرخطرناک
- (۲) پسماند خطرناک
- (۳) پسماند نوک تیز و برنده
- (۴) پسماند عفونی

۱۲- حسب قانون مدیریت پسماندها، مسئولیت مدیریت پسماند پزشکی ویژه بر عهده کیست؟ (iranarze.ir)

- (۱) شهرداری
- (۲) بخشداری و دهیاری
- (۳) شخص تولیدکننده
- (۴) سازمان مدیریت پسماند کشور

۱۳- به ترتیب داروهای مورد استفاده در درمان سرطان، بطری و جعبه دارو جزء کدام نوع از پسماند پزشکی ویژه است؟ (iranarze.ir)

- (۱) پسماند دارویی، پسماند دارویی
- (۲) پسماند ژنوتوکسیک، پسماند دارویی
- (۳) پسماند دارویی، پسماند عادی
- (۴) پسماند شیمیایی، ظروف تحت فشار

۱۴- حضور کاتیون های کلسیم و منیزیم به همراه آنیون های کربنات، بیکربنات و سولفات و... در آب که باعث تشکیل پوسته در جدار داخلی سماور، کتری،

سینک ظرفشویی و شیرآلات شده و صابون به سختی در آب کف می کند معرف کدام یک از خصوصیات آب است؟ (iranarze.ir)

- (۱) خصوصیات شیمیایی - سختی
- (۲) خصوصیات فیزیکی - سختی
- (۳) خصوصیات شیمیایی - قلیائیت و اسیدیته
- (۴) خصوصیات فیزیکی - قلیائیت و اسیدیته

۱۵- طبق استاندارد، میزان کلر آزاد باقیمانده آب شرب بر حسب PPM کدام مورد است؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۰/۸ - ۰/۵
- (۲) ۵ - ۸
- (۳) ۱
- (۴) ۱/۲

آموزش و ارتقاء سلامت

۱۶- از یک موزه دیدن کنیم یا به طبیعت برویم چه نوع خود مراقبتی می باشید؟ (iranarze.ir)

- (۱) خود مراقبتی اجتماعی
- (۲) خود مراقبتی روانی و عاطفی
- (۳) خود مراقبتی فردی
- (۴) خود مراقبتی معنوی

۱۷- کدامیک جز برنامه خود مراقبتی اجتماعی نیست؟ (iranarze.ir)

- (۱) نیاز به تعلق -عشق-محبت
(۲) حفظ روابط بین فردی
(۳) حفظ دوستی های نزدیک
(۴) توجه به اوقات فراغت

۱۸- کدامیک از موارد زیر از انواع نیاز نمی باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) نیاز درخواست شده
(۲) نیاز احساس شده
(۳) نیاز هنجاری
(۴) نیاز مقایسه ای

۱۹- کدام تعریف در مورد سواد سلامت صحیح است؟ (iranarze.ir)

- (۱) میزان ظرفیت هر فرد برای تصمیم گیری و عمل مناسب لازم است
(۲) میزان ظرفیت هر فرد برای کسب درک و فهم مربوط به سلامت و تصمیم گیری و عمل مناسب لازم است
(۳) میزان ظرفیت هر فرد برای کسب درک و فهم موضوعات سلامت در دنیای مجازی
(۴) همه موارد

۲۰- کدامیک جزء اصول نیاز سنجی نمی باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) اصل جامعیت
(۲) اصل مشارکت
(۳) اصل توجه نا برابر
(۴) همه موارد

بهداشت حرفه ای

۲۱- در کدامیک از عوارض ناشی از گرما درجه حرارت ممکن است تا ۴۵ درجه افزایش پیدا کند؟ (iranarze.ir)

- (۱) گرما زدگی
(۲) خستگی مخصوص
(۳) جوش های گرمایی
(۴) ۱ و ۲

۲۲- حساس ترین عضو بدن در مقابل اشعه مادون قرمز کدام است؟ (iranarze.ir)

- (۱) پوست
(۲) شبکیه چشم
(۳) عدسی چشم
(۴) همه موارد

۲۳- کدامیک از علائم مسمومیت حاد می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) تهوع
(۲) اختلال دید
(۳) تنگ شدن مردمک چشم
(۴) همه موارد

۲۴- مهمترین راه ورود مواد شیمیایی به بدن کدام است؟ (iranarze.ir)

- (۱) تنفسی
(۲) پوستی
(۳) گوارشی
(۴) موارد ۲ و ۳

۲۵- در کدام مورد تمامی بدن فرد شاغل در معرض ارتعاش است؟ (iranarze.ir)

- (۱) آهنگران
(۲) نجارها
(۳) رانندگان تراکتور
(۴) معدنچیان

مراقبت مادران

۲۶- در صورتی که مادر نیاز به خدمات درمانی دندانپزشکی داشته باشد مناسبتین زمان آن ؟ (iranarze.ir)

- (۱) سه ماهه اول بارداری
- (۲) سه ماهه دوم بارداری
- (۳) سه ماهه سوم بارداری
- (۴) ارائه خدمات دندان پزشکی در هر سنی از بارداری امکان پذیر است

۲۷- کدام مورد صحیح نیست ؟ (iranarze.ir)

- (۱) پوسیدگی دندان: تخریب ساختمان دندان به دنبال فعالیت میکروبیهای پوسیدگی زای دهان
 - (۲) سقط دیرس: سقط پس از سه ماهه اول بارداری
 - (۳) زایمان: تولد نوزاد پس از شروع هفته ۲۸ بارداری
 - (۴) تعداد بارداری: تعداد بارداریها بدون در نظر گرفتن نتایج آن
- ۲۸- نوبت دوم کومبیس غیر مستقیم (در مادر RH منفی با همسر RH مثبت) در کدامین هفته بارداری است؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۲۰-۲۴
- (۲) ۲۴-۳۰
- (۳) ۱۶-۲۰
- (۴) ۲۸-۳۲

۲۹- قند خون ناشتای مادر بارداری ۱۲۵ است کدام گزینه در مورد اقدام مورد نیاز مادر صحیح است؟ (iranarze.ir)

- (۱) دیابت آشکار، تکرار آزمایش یک هفته بعد
- (۲) دیابت بارداری، ارجاع به متخصص زنان
- (۳) دیابت آشکار، ارجاع به متخصص زنان
- (۴) پره دیابتیک، ارائه توصیه های تغذیه ای، توصیه به ورزش و فعالیت بدنی، توصیه به تکرار آزمایش FBS و قند دو ساعت پس از غذا در دو هفته بعد.

۳۰- زمان انجام غربا لگري ناهنجاری جنینی مرحله دوم در بارداری است؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۱۵-۱۷ هفته
- (۲) ۱۱-۱۳ هفته
- (۳) ۱۴-۱۶ هفته
- (۴) ۱۳-۱۵ هفته

مراقبت سالمند

۳۱- در خصوص ارجاع سالمند از نظر احتمال ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی به پزشک کدام گزینه صحیح نیست؟ (iranarze.ir)

- (۱) سالمندانی که سابقه مصرف دخانیات دارند
- (۲) سالمندانی که چاق هستند
- (۳) کلیه سالمندان
- (۴) مصرف داروی کنترل کننده چربی خون

۳۲- چه سالمندی در طبقه بندی احتمال ابتلا به دیابت قرار دارد (تهیه شده توسط ایران عرضه)؟ (iranarze.ir)

- (۱) سالمند با سابقه اختلال در قند خون ناشتا
- (۲) سالمند با سابقه دیابت در فامیل
- (۳) سالمند با نمایه توده بدنی مساوی یا بیش از ۳۰
- (۴) همه موارد

۳۳- اگر سالمندی با عینک بتواند بخواند و یا سوزن نخ کند چه اقدامی برای وی انجام می دهید؟ (iranarze.ir)

- (۱) ارجاع غیر فوری به پزشک
- (۲) آموزش مراقبت از چشم ها
- (۳) پیگیری بعد از ۶ ماه
- (۴) هیچکدام

۳۴- کدام اقدام برای سالمند با احساس غم و افسردگی صحیح است؟ (iranarze.ir)

- (۱) ارجاع غیر فوری
- (۲) پیگیری پس از یک ماه
- (۳) پیگیری پس از ۳ ماه
- (۴) ارجاع غیر فوری به همراه آموزش شیوه زندگی سالم

۳۵- در چه صورتی می‌گوییم سالمند تکرر ادرار دارد؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۳ بار دفع ادرار از صبح تا ظهر
- (۲) احساس ناگهانی و شدید برای ادرار کردن
- (۳) بیدار شدن از خواب به دلیل احساس ادرار
- (۴) خروج بی اختیار ادرار به همراه سرفه

بهداشت دهان و دندان

۳۶- زمان رویش و تکمیل دندان‌های شیری به ترتیب کدام است؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۶ ماهگی- ۲ تا ۵ سالگی
- (۲) ۸ ماهگی- ۲ تا ۵ سالگی
- (۳) ۶ ماهگی- ۵ تا ۵/۵ سالگی
- (۴) ۸ ماهگی- ۵ تا ۵/۵ سالگی

۳۷- همه موارد زیر اهمیت دندان‌های شیری را نشان می‌دهد به جز؟ (iranarze.ir)

- (۱) حفظ فضای لازم برای رویش دندان‌های دائمی
- (۲) اهمیت در تکلم و بیان صحیح
- (۳) اهمیت در جویدن و هضم غذا
- (۴) جلوگیری از مشکلات گوارشی

۳۸- پس از مصرف غذاهای حاوی شکر چند دقیقه طول می‌کشد تا میکروب‌ها از مواد قندی استفاده کرده و تولید اسید کنند؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۳ تا ۷ دقیقه بعد
- (۲) ۲ تا ۵ دقیقه بعد
- (۳) ۵ تا ۷ دقیقه بعد
- (۴) ۳ تا ۵ دقیقه بعد

۳۹- میزان فلوراید طبیعی آب آشامیدنی چقدر است؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۰/۱-۷/۲
- (۲) ۱-۱/۵
- (۳) ۳-۳/۵
- (۴) ۱/۳-۵

۴۰- همه موارد زیر جزء محل‌های شایع پوسیدگی است بجز؟ (iranarze.ir)

- (۱) شیارهای سطح جونده
- (۲) سطوح بین‌دندانی
- (۳) طوق دندان‌ها
- (۴) سطح باکال دندان

بیماری‌های غیرواگیر

۴۱- اعلام مراقبت ژنتیک موقت در باره کدام زوجین زیر مصداق دارد؟ (iranarze.ir)

- (۱) زوجی که ناقل قطعی تالاسمی می‌باشند
- (۲) زوجی که ناقل قطعی پی‌کی‌یو می‌باشند.
- (۳) زوج دارای فرزند مبتلا به سندرم داون
- (۴) زوجی که در بستگان درجه ۲ زوج، فرد مبتلا به هموفیلی وجود دارد.

۴۲- برطبق دستورالعمل کشوری غربالگری سندرم داون در سه ماهه اول بارداری آزمایش.....می‌بایست برای مادر باردار درخواست گردد.

- (۱) Quadruple tesh
- (۲) Triple marker
- (۳) Double Marker
- (۴) Combined test

۴۳- میزان NT: 4.7 در سونوگرافی مادر باردار ۱۲ هفته و ۳ روزه ای گزارش شده است. در مرحله بعد چه اقدامی می‌بایست برای مادر باردار انجام شود؟

- (۱) ارجاع به آزمایشگاه جهت انجام مارکرهای خونی
- (۲) ارجاع به متخصص زنان جهت انجام آمینوسنتز

۳) ارجاع مستقیم جهت انجام CVS ۴) توصیه به انجام تست های غیرتهاجمی (NIPT)

۴۴- کدامیک از شرایط زیر باعث مثبت کاذب شدن آزمایشهای متابولیک ارثی نمی شوند؟ (iranarze.ir)

۱) تغذیه با مواد کم پروتئین ۲) تزریق خون ۳) دوقلوئی ۴) نارس بودن

۴۵- نمونه گیری متابولیک از شیرخوار ۱۳ ماهه به چه روشی انجام می شود؟ (iranarze.ir)

۱) از پاشنه پا ۲) از نوک انگشت میانی دست ۳) از نرمة کناری دست ۴) بصورت وریدی

۴۶- (تنظیم توسط فروشگاه ایران عرضه) درمراجعه مادر بارداری با اندکس MCH: 24.5 اقدام بعدی چیست؟ (iranarze.ir)

۱) بررسی اندکس همسر ۲) تکرار آزمایش مادرباردار

۳) آهن درمانی ۴) عدم نیاز به پیگیری

۴۷- در شیرخواری که پس از مصرف داروی آسپرین توسط مادر دچار زردی چشمها وچهره شد است. اولین تشخیص محتمل برای وی کدام بیماری زیر می

باشد؟ (iranarze.ir)

۱) آنمی شدید ۲) تالاسمی ۳) هیپاتیت داروئی ۴) فاویسم

۴۸- حداکثر زمان نگهداری نمونه جمع اوری شده در ظرف نمونه گیری فیت در دمای اتاق چند ساعت می باشد. (iranarze.ir)

۱) ۱۲ ساعت ۲) ۲۴ ساعت ۳) ۴۸ ساعت ۴) ۷۲ ساعت

۴۹- فاکتور خطر غیر قابل تغییر بیماری فشار خون کدام مورد است؟ (iranarze.ir)

۱) وراثت ۲) فعالیت بدنی ۳) وزن ۴) مصرف الکل

۵۰- در برنامه ایران کدام یک از عوامل زیر در ارزیابی میزان خطر ده ساله سکته قلبی و مغزی تاثیر گذار نمی باشد؟ (iranarze.ir)

۱) ابتلا به دیابت ۲) سابقه خانوادگی ۳) جنس ۴) کلسترول تام

بهداشت روان

۵۱- بیمارانی که افکار خودکشی یا اقدام به خودکشی داشته اند، پیگیری باید چگونه باشد؟ (iranarze.ir)

۱) درفواصل کوتاه حداکثر ۱۵ روز انجام شود ۲) درفواصل کوتاه حداکثر هفتگی انجام شود

۳) درفواصل کوتاه حداقل ۱۰ روز انجام شود ۴) درفواصل کوتاه حداقل ۱۲ روز انجام شود

۵۲- معمولا درمان کدام دسته از اختلالات زیردراز مدت است؟ (iranarze.ir)

۱) اختلالات سایکوتیک ۲) اختلال افسردگی خفیف

۳) اختلال اضطراب اجتماعی ۴) عادت رفتاری ناخن جویدن در کودکان

۵۳- کدامیک از موارد زیر را بهورزان نباید پس از بروز بلایا در منطقه تحت پوشش خود انجام دهند؟ (iranarze.ir)

۱) مانع ابراز احساسات افراد ۲) افراد را از دیدن جنازه عزیزانشان محروم نکنند

۳) مانع تجمع داغدیدگان شوند ۴) سعی نکنند افراد را به زور از محل سکونت خود دور کنند

۵۴- خواندن یک داستان برای کودک جزء کدامیک از پاداش های زیر است؟ (iranarze.ir)

۱) پاداش های کلامی ۲) پاداش های فعالیتی ۳) پاداش های فیزیکی ۴) هیچکدام

۵۵- وابستگی جسمی به صورت (نیاز به مصرف مقادیر بیشتر ماده برای رسیدن به اثر قبلی) و (تجربه حالات خماری در صورت کاهش یا قطع مصرف

ماده) در فرد معتاد ایجاد می شود. (iranarze.ir)

- (۱) محرومیت - تحمل
(۲) تحمل - مسمومیت
(۳) مسمومیت - محرومیت
(۴) تحمل - محرومیت

دارویی

۵۶- داروی استامینوفن برای کدام یک از افراد زیر منع مصرف دارد؟ (iranarze.ir)

- (۱) بیماران کبدی
(۲) بیماران دیابتی
(۳) افراد با سابقه ورم معده
(۴) همه موارد

۵۷- مصرف صحیح قرص آلومینیوم ام جی اس به چه صورت می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) باید ۱ ساعت قبل از غذا و با معده خالی میل شود.
(۲) باید وسط غذا و با ۱ لیوان آب میل شود.
(۳) باید ۱ ساعت بعد از غذا و به صورت جویدنی استفاده شود.
(۴) دستور مصرف خاصی ندارد.

۵۸- کدام یک از جملات زیر در مورد قرص لوونورژسترول صحیح است؟ (iranarze.ir)

- (۱) بهتر است با معده ی خالی مصرف نشود .
(۲) می تواند به عنوان یک روش دائمی جلوگیری از بارداری مورد استفاده قرار گیرد.
(۳) در صورت استفراغ تا ۲ ساعت بعد از مصرف، خوردن مجدد قرصها ضروری است.
(۴) ۱ و ۳

۵۹- شامپو یا لوسیون لیندان برای کدام یک از گروههای زیر منع مصرف دارد؟ (iranarze.ir)

- (۱) کودکان ۵- ۱۲ سال
(۲) افراد با سابقه تشنج و صرع
(۳) افراد ۱۲ - ۱۸ سال
(۴) ۱ و ۳

۶۰- در مورد درمان عفونت چشمی شیرخوار زیر ۲ ماه کدام گزینه صحیح میباشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) قطره سولفاستامید ۱۰٪ - تا ۵ روز هر ۳ ساعت ۱ قطره
(۲) قطره سولفاستامید ۱۰٪ - تا ۳ روز هر ۵ ساعت ۱ قطره
(۳) پماد چشمی تتراسایکلین ۱٪ - تا ۳ روز ۳ بار در روز
(۴) پماد چشمی تتراسایکلین ۱٪ - تا ۵ روز ۳ بار در روز

کودک سالم

۶۱- کم وزنی شدید ؟ (iranarze.ir)

- (۱) پایین z- score -3
(۲) بیشتر از +1 z- score
(۳) مساوی z- score -3 تا کمتر از z- score -2
(۴) بالای z- score -3

۶۲- ارزیابی کودک از نظر دور سر (شیرخوار زیر ۲ سال) (iranarze.ir)

- (۱) بالای +3 z- score دور سر بزرگ و ماکروسفالی میباشد .
(۲) پایین z- score -3 دور سر کوچک میکروسفالی میباشد .

(۳) طبقه بندی "نیازمند بررسی بیشتر از نظر دور سر" پیگیری کودک زیر ۶ ماه ۱۰ روز بعد و بالای ۶ ماه ۲ هفته بعد میباشد .
(۴) ۱ و ۲ صحیح میباشد .

۶۳- ارزیابی کودک زیر ۲ سال از نظر مصرف مکمل های دارویی به چه صورت است : (iranarze.ir)

(۱) نوزادان ترم و با وزن تولد کمتر از ۲۵۰۰ گرم مکمل A+D از ۵ - ۳ روزگی در روز معادل یک سی سی و مکمل آهن از پایان ۶ ماهگی یا همزمان با شروع تغذیه تکمیلی با دوز ۱ mg/ day kg/ حداکثر ۱۵ میلی گرم آهن المنتال (خالص) در روز تقریباً معادل ۱۵ قطره داده می شود
(۲) نوزادان نارس با وزن ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ مکمل A+D از ۵ - ۳ روزگی به میزان معادل یک سی سی و مکمل آهن با دوز ۲ mg/ day kg/، حداکثر ۱۵ میلی گرم آهن المنتال (خالص) در روز تقریباً معادل ۱۵ قطره از زمانی که وزن کودک ۲ برابر وزن هنگام تولد شود (حدود ۲ ماهگی) روزانه
(۳) شیرخواران با وزن تولد بسیار کم (کمتر از ۱۵۰۰ گرم) مکمل A+D از ۵ - ۳ روزگی به میزان معادل یک سی سی و مکمل آهن با دوز ۳ - ۴ mg/ day kg/، حداکثر ۱۵ میلی گرم آهن المنتال (خالص) در روز تقریباً معادل ۱۵ قطره از زمانی که وزن کودک ۲ برابر وزن هنگام تولد شود (حدود ۲ ماهگی) روزانه
(۴) ۲ و ۳ صحیح میباشد .

۶۴- غربالگری تکاملی تست استاندارد (ASQ) در چه سنی انجام می شود ؟ (iranarze.ir)

(۱) ۶ ماهگی - ۹ ماهگی - ۱۲ ماهگی - ۲ سالگی - ۵ سالگی (۲) ۹ ماهگی
(۳) ۶ ماهگی - ۱۲ ماهگی - ۲۴ ماهگی - ۳۶ ماهگی - ۶۰ ماهگی (۴) ۱۲ ماهگی
۶۵- در ارزیابی کودک از نظر سلامت دهان و دندان (بالای ۲ سال) کدام گزینه صحیح نمیشود ؟ (iranarze.ir)

(۱) در ۶۰، ۵۴، ۴۸، ۳۶ ماهگی برای کودک واریش فلوراید انجام شود .
(۲) در ۳۶ ماهگی و ۶۰ ماهگی بعد از مراقبت روتین کودک به دندانپزشک ارجاع شود .
(۳) اگر از ماکزیمم زمان نهایی مشخص شده برای رویش یک دندان (مطابق جدول رویش) پیش از ۹ ماه بگذرد تاخیر در رویش انجام شود .
(۴) اگر از ماکزیمم زمان نهایی مشخص شده برای رویش یک دندان (مطابق جدول رویش) پیش از ۹ ماه بگذرد تاخیر در رویش انجام شود .

مراقبت میانسالان

۶۶- میزان بروز سرطان در میانسالان به ترتیب چیست ؟ (iranarze.ir)

(۱) سرطان پستان /رحم /تخمدان /دهانه رحم
(۲) سرطان پستان /تخمدان /دهانه رحم /رحم
(۳) سرطان پستان /دهنه رحم /تخمدان /رحم
(۴) سرطان پستان /دهانه رحم /رحم /تخمدان

۶۷- کدامیک از موارد زیر از علائم مسمومیت مکمل ویتامین د۳ نمی باشد ؟ (دستورالعمل مکمل یاری-راهنمای اجرایی)

(۱) ضعف و خستگی و خواب آلودگی
(۲) تهوع و استفراغ و سردرد
(۳) خشکی دهان و مزه آهن در دهان
(۴) افزایش اشتها و پر نوشی

۶۸- عمده ترین اختلال روانپزشکی در دوره یائسگی ؟ (iranarze.ir)

(۱) شیوع افسردگی در دوره منوپوز ۲۰ تا ۳۰ سال
(۲) سابقه PMS
(۳) سابقه اختلالات خلقی قبلی
(۴) میزان انطباق ضعیف با استرسورهای قبلی

۶۹- شایع ترین علت درد پستان بیش از یائسگی چیست ؟ (iranarze.ir)

(۱) وجود توده های خوش خیم
(۲) سرطان پستان

- (۳) تغییرات هورمونی
(۴) تغییرات فیبروکیستی
- ۷۰- در خصوص خانم ۴۰ ساله با قد ۱۶۰ و وزن ۶۵ و دور کمر ۹۱ کدام یک از موارد زیر صحیح است؟ (iranarze.ir)
- (۱) دارای اضافه وزن، چاقی شکمی
(۲) دچار چاقی، چاقی شکمی
- (۳) دارای اضافه وزن، بدون چاقی شکمی
(۴) دچار چاقی، بدون چاق شکمی

بهداشت مدارس

- ۷۱- در آلودگی به کدام یک از انواع شیش، گزارش فوری به سطوح ستادی الزامی است؟ (iranarze.ir)
- (۱) شیش سر (۲) شیش تن (۳) شیش عانه (۴) هر سه نوع
- ۷۲- در مدارس فاصله بسته های شیر از کف انبار و دیوارها به ترتیب باید حداقل و سانتیمتر باشد. (iranarze.ir)
- (۱) ۱۵، ۵۰ سانتیمتر (۲) ۳۰، ۴۵ سانتیمتر
(۳) ۱۵، ۴۵ سانتیمتر (۴) ۲۵، ۵۰ سانتیمتر
- ۷۳- مدت زمان نگهداری غذای بسته شده خارج از یخچال چقدر است؟ (iranarze.ir)
- (۱) نهایتاً یک ساعت (۲) نهایتاً ۴۰ دقیقه
(۳) نهایتاً ۳۰ دقیقه (۴) نهایتاً دو ساعت
- ۷۴- فاصله دانش آموز در امتحان نجوا تا فرد آزمون کننده چقدر باید باشد؟ (iranarze.ir)
- (۱) ۶۰ سانتی متر (۲) ۵۰ سانتی متر
(۳) ۴۰ سانتی متر (۴) ۷۰ سانتی متر
- ۷۵- انحراف ستون مهره ها به سمت راست یا چپ چه نام دارد؟ (iranarze.ir)
- (۱) اسکولیوز (۲) قوز (۳) لوردوز (۴) کیفوز

سلامت نوجوانان

- ۷۶- میزان نیاز فعالیت بدنی متوسط تا شدید در نوجوانان تا ۱۸ سال چقدر است؟ (iranarze.ir)
- (۱) روزانه ۳۰ دقیقه (۲) روزانه ۳۵ دقیقه (۳) روزانه ۶۰ دقیقه (۴) روزانه ۶۵ دقیقه
- ۷۷- در صورت وجود کدام موارد می گوییم نوجوان رفتار پرخطر دارد؟ (iranarze.ir)
- (۱) دانش آموز از رژیم غذایی صحیح برخوردار نیست
(۲) دانش آموز را برای خرید سیگار، تنباکو و یا سایر مواد دخانی می فرستند
(۳) میزان فعالیت بدنی کمتر از ۳۰ دقیقه در روز و کمتر از ۳ روز در هفته می باشد
(۴) همه موارد
- ۷۸- (تهیه شده توسط ایران عرضه) کدام مورد جزء مشکل شدید دهان و دندان می باشد؟ (iranarze.ir)
- (۱) لثه پر خون و قرمز و متورم (۲) زخم یا مورد غیرطبیعی در داخل دهان
(۳) آبسه دندان (۴) وجود ناهنجاری های فکی

۷۹- در ارزیابی دانش آموز از نظر رفتارهای پرخطر کدام مورد جزء ارزیابی نمی باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) رژیم غذایی
(۲) قرار داشتن در معرض دود سیگار، قلیان و.....
(۳) فعالیت بدنی
(۴) بیماری های تحت نظر

۸۰- در چه صورت فرد در معرض خطر ابتلا به سل قرار دارد؟ (iranarze.ir)

- (۱) بدون نشانه (فاقد سرفه) با عامل خطر
(۲) بدون نشانه و بدون عامل خطر
(۳) دارای نشانه یا بدون نشانه (سرفه مساوی یا کمتر از ۲ هفته) به همراه عامل خطر
(۴) هیچکدام

سلامت جوانان

۸۱- چنانچه میانگین فشار خون فرد ۱۴۰/۹۰ میلی لیتر جیوه بیشتر باشد، اقدام لازم برای وی چیست؟ (iranarze.ir)

- (۱) ارجاع فوری به پزشک
(۲) ارائه توصیه های مرتبط با شیوه زندگی سالم
(۳) ارجاع غیر فوری به پزشک
(۴) ادامه مراقبت ها

۸۲- از مهمترین آثار ازدواج ایجاد مودت و رحمت بین زوجین است، این ترجمه کدام آیه و کدام سوره قرآن است؟ (iranarze.ir)

- (۱) سوره مبارکه روم، آیه ۲۱
(۲) سوره مبارکه نور، آیه ۴۱
(۳) سوره مبارکه یاسین آیه ۲۱
(۴) سوره مبارکه روم، آیه ۴۱

۸۳- تاخیر درباروری و افزایش سن ازدواج با چه تبعاتی همراه است؟ (iranarze.ir)

- (۱) افزایش ریسک پذیری درخصوص دیابت وفشارخون
(۲) خطری ندارد
(۳) افزایش ریسک زایمان زودرس
(۴) ۱ و ۳

۸۴- کدام گونه از هیاتیت از راه آب و غذا منتقل می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) A , B
(۲) A , E
(۳) B , C
(۴) E, C

۸۵- کدام گزینه غلط است؟ (iranarze.ir)

- (۱) جوان باید طوری روی ترازو قرار گیرد که وزن خود را بخواند.
(۲) توزین کننده باید با ایستادن جلوی ترازو وزن دقیق را بخواند.
(۳) وزن جوان پس از اندازه گیری در شناسنامه ثبت گردد.
(۴) از قرار دادن یک خط کش با یک برگ کاغذ بر روی سر اندازه گیری قد استفاده شود.

باروری سالم

۸۶- مشکلات کودکان تک فرزندانرهمقایسه با چند فرزندان همه گزینه ها هستند به جز: (iranarze.ir)

- (۱) تنها بوده وبادوستان خیالی بازی می کنند
(۲) تمایل بیش ازحده اسباب بازی وحیوانات دارند
(۳) زودرنج وحساس بودن به انتقادات
(۴) اعتمادبه نفس زیاد

۸۷- در خصوص علائم بیماری تخمدان پلی کیستیک کدام جمله صحیح نمی باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) نازک شدن و ریزش موهای سر در ۹۰ درصد افراد مبتلا ی به این بیماری اتفاق می افتد.
- (۲) بروز آکنه درهرسنی حتی غیرازسن بلوغ شایع است.
- (۳) شایعترین علامت بیماری تخمدان پلی کیستیک اختلالات قاعدگی است.
- (۴) افزایش هورمونهای مردانه دراین بیماری سبب تیرگی پوست نواحی گردن، کتاله ران، زیربغل و اندام تناسلی می شود.

۸۸- نرخ باروری مورد انتظار در حد جایگزینی به چه میزانی است؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۱.۸
- (۲) ۲
- (۳) بیشتر از ۲.۱
- (۴) ۱.۵

۸۹- در چه سنی می بایست بررسی ناباروری بعد از ۶ ماه صورت بگیرد؟ (iranarze.ir)

- (۱) بالاتر از ۴۰ سال
- (۲) بالاتر از ۳۰ سال
- (۳) بالاتر از ۳۵ سال
- (۴) بالاتر از ۴۵ سال

۹۰- در صورت فراموشی قرص شیردهی، بیش از ۲ قرص اقدام لازم چگونه می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) به محض یاد آوری قرص های فراموش شده یکجا خورده شده و بقیه قرص ها ادامه یافته و تا ۷ روز از روش مضاعف مثل کاندوم استفاده شود.
- (۲) به محض یاد آوری قرص های فراموش شده را خورده و بقیه قرص ها طبق معمول ادامه میابد.
- (۳) خوردن بقیه قرص ها ادامه یافته و به مدت یک هفته از روش کمکی دیگر استفاده و بلافاصله پس از اتمام بسته مصرف بسته بعدی آغاز گردد.
- (۴) هیچکدام

مانا

۹۱- کاهش شدید سطح هوشیاری به چه معناست؟ (iranarze.ir)

- (۱) واکنش به تحریک دردناک
- (۲) واکنش به هیچگونه محرکی ندارد
- (۳) هیچکدام
- (۴) ۱ و ۲

۹۲- اگر خس خس همراه با دو نشانه تنفس تند یا توكشیده شدن قفسه سینه وجود داشته باشد چه باید کرد؟ (iranarze.ir)

- (۱) از اسپری سالبوتامول استفاده کرد سپس تنفس شمرده شود
- (۲) از قرص مونته لوکاست استفاده کرد سپس تنفس شمرده شود
- (۳) بعد از نیم ساعت مجدداً شمارش کرد
- (۴) ارجاع فوری به پزشک مرکز انجام شود

۹۳- کدامیک از گزینه های زیر جزء تعریف زردی شدید می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) زردی بعد از ۲۴ ساعت اول تولد
- (۲) زردی تنه بدون زردی کف پا
- (۳) زردی همراه با نشانه های زردی خطرناک
- (۴) زردی طول کشیده (بیش از ۲ هفته)

۹۴- در ارزیابی شیر خوار از نظر " کم آبی " طبقه بندی مشکوک به کم آبی شدید؟ (iranarze.ir)

- (۱) فرو رفتگی ملاج
- (۲) زردی کف دست و پا
- (۳) دفعات ادرار شیر خوار بیشتر از ۶ بار در ۲۴ ساعت
- (۴) ۱ و ۲ صحیح میباشد .

۹۵- محدوده طبیعی دمای بدن شیرخوار: (iranarze.ir)

(۲) ۳۷/۳۶-۵/۵

(۱) ۳۶-۳۷/۷

(۴) ۳۷/۳۷-۷

(۳) ۳۷/۳۶-۵/۷

شیرمادر

۹۶- چگونه میتوان از کافی بودن شیرمادر مطمئن شویم؟ (iranarze.ir)

(۱) افزایش وزن شیرخوار بر اساس منحنی رشد

(۲) حداقل ۸-۶ بارادرار کردن در شبانه روز

(۳) خواب کافی و آرام بین وعده های شیردهی

(۴) همه موارد

۹۷- هورمون اساسی در بیوسنتز شیر کدام است؟ (iranarze.ir)

(۱) استروژن

(۲) اکسی توسین

(۳) TSH

(۴) پرولاکتین

۹۸- از فواید شیرمادر برای شیرخوار کدام یک از موارد زیر می باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) افزایش ضریب هوشی و ارتقاء تکامل

(۲) کاهش ابتلا به اسهال و مرگ ناشی از اسهال

(ج) برقراری رابطه عاطفی بیشتر مادر

(۴) همه موارد

۹۹- کدام مورد وضعیت صحیح شیرخوردن شیرخوار نمی باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) مکیدن ها کند و عمیق است

(۲) سر و بدن شیرخوار در یک امتداد است

(۳) لب تحتانی به طرف خارج برگشته است

(۴) صدای بلعیدن شیر به سختی شنیده می شود

۱۰۰- کدام گزینه صحیح می باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) شیر پیشین غلیظ تر بوده و انرژی موری نیاز شیرخوار را تامین میکند

(۲) شیر پسین سرشار از چربی بوده و انرژی مورد نیاز شیرخوار را تامین می کند.

(۳) شیر پیشین حاوی مقادیر زیاد پروتئین بوده و آب مورد نیاز شیرخوار را تامین می کند.

(۴) موارد ۲ و ۳

آمار

۱۰۱- روشهای جمع آوری اطلاعات را نام ببرید (تهیه شده توسط ایران عرضه)؟ (iranarze.ir)

(۱) سرشماری - نمونه گیری

(۲) سرشماری

(۳) نمونه گیری

(۴) هیچکدام

۱۰۲- آمار حیاتی چه وقایعی را نشان می دهد؟ (iranarze.ir)

(۱) تولد - مرگ

(۲) تولد - مرگ - ازدواج

(۳) تولد - ازدواج - جمعیت

(۴) تولد - ازدواج - طلاق - مرگ - اطلاعات جمعیتی

۱۰۳- در خصوص ثبت وقایع حیاتی کدام گزینه صحیح است؟ (iranarze.ir)

(۱) ثبت وقایع حیاتی تغییرات جمعیت شناختی را به طور پیوسته تحت کنترل ندارد

۲) گزارش های موارد مردمی کمک شایانی به ثبت وقایع حیاتی می نماید

۳) گزارش مربوط به بیماریهای واگیر و غیر واگیر با توجه به لزوم اقدامات سریع و اساسی هر منطقه جهت برنامه ریزی مناسب نمی باشد.

۴) هیچکدام

۱۰۴- تعریف میزان خام تولد چیست؟ (iranarze.ir)

۱) کل تولدهای زنده در طول یک سال در یک مکان مشخص تقسیم بر کل جمعیت پنج سال گذشته آن منطقه * ۱۰۰۰

۲) کل تولدهای زنده در طول یک سال در یک مکان مشخص تقسیم بر تعداد کل مرگ های همان مکان در همان سال * ۱۰۰۰

۳) کل تولدهای زنده در طول یک سال در یک مکان مشخص تقسیم بر کل جمعیت وسط سال همان مکان * ۱۰۰۰

۴) هیچکدام

۱۰۵- شاخص چیست؟ (iranarze.ir)

۱) متغیری است که برای ارزیابی شرایط و حساسیت ها ، مقایسه بین مکان ها و موقعیتهای و نیز ارزیابی شرایط و گرایش ها در ارتباط با اهداف و مقاصد تامین اطلاعات هشدار دهنده ، پیش بینی شرایط و روند آینده به کار رود.

۲) شاخص ها در برخی سطوح بسیار مهم و موثر هستند و بنابراین قابل به کارگیری برای برنامه ریزی ، پایش و ارزشیابی هستند

۳) شاخص ها راهی برای مقایسه و پیش بینی هایی برای آینده می باشند و نشان می دهد سیستم در عمل چگونه خصوصیتی دارد

۴) همه موارد

نوزادان

۱۰۶- قدرت بینایی نوزاد چقدر است؟ (iranarze.ir)

۱) ۳۰ برابر بیشتر از بالغین

۲) ۳۰ برابر کمتر از بالغین

۳) ۶۰ برابر بیشتر از بالغین

۴) ۶۰ برابر کمتر از بالغین

۱۰۷- نوزاد در چندمین روز تولد میتواند بوی مادر را تمیز دهد؟ (iranarze.ir)

۱) ۴ امین روز تولد

۲) ۶ امین روز تولد

۳) ۵ امین روز تولد

۴) ۳۰ امین روز تولد

۱۰۸- دمای اتاق نوزاد باید بین.....درجه سانتی گراد باشد. (iranarze.ir)

۱) ۳۶- ۳۷

۲) ۲۵- ۲۷

۳) ۲۵- ۲۶

۴) ۲۶- ۲۵

۱۰۹- بهترین روش شیردهی به نوزادان دوقلو کدام روش است؟ (iranarze.ir)

۱) زیربغلی

۲) گهواره ای

۳) خوابیده به پهلو

۴) گهواره ای متقابل

۱۱۰- عوامل خطری که احتمال ابتلا به ROP را زیاد میکند عبارتند از : (iranarze.ir)

۱) کم بودن وزن نوزاد (۲۰۰۰ گرم یا کمتر)

۲) نیاز به اکسیژن در هفته اول تولد

۳) وجود مشکل در سلامتی نوزاد بلافاصله پس از تولد

۴) همه موارد

تغذیه

۱۱۱- گروه های غذایی کدام است؟ (iranarze.ir)

- (۱) پروتئینها- نان و غلات- چربی ها- لبنیات
- (۲) نان و غلات- سبزیها- میوها- گوشت و تخم مرغ- حبوبات- لبنیات
- (۳) لبنیات- کربوهیدرات- گوشت ها و حبوبات
- (۴) ویتامین ها- مواد معدنی- درشت مغذی ها- ریزمغذی ها

۱۱۲- جهت مقوی کردن غذای کودک به غذای کودک چه موادی اضافه می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) حبوبات- جوانه گندم
- (۲) کره- روغن- شیرخشک
- (۳) گوشت- سبزیجات
- (۴) مغزها- گوشت

۱۱۳- افزایش دهنده جذب آهن کدام است؟ (iranarze.ir)

- (۱) فیبر و فیتات
- (۲) سویا
- (۳) ویتامین C در میوه و سبزی
- (۴) چای و دمنگه گیاهی

۱۱۴- به کودک LBW چه موقع قطره آهن تجویز می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) از زمانی که وزن کودک به دو برابر وزن تولد برسد
- (۲) پایان دو ماهگی
- (۳) از زمان شروع غذای تکمیلی
- (۴) ۱ و ۲

۱۱۵- کدام گزینه در مورد مکملیاری آهن در مدارس صحیح می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) ماهی یک عدد به مدت ۴ ماه
- (۲) روزی یک عدد به مدت ۳ هفته
- (۳) هفته ای یک عدد به مدت ۱۶ هفته
- (۴) هفته ای ۳ عدد به مدت ۱۴ هفته

پزشک خانواده

۱۱۶- تعداد دهگردشی مورد انتظار در بیمه روستایی چند بار می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) در روستاهای اصلی به خانه های بهداشت با جمعیت ساکن ۳۰۰۰ نفر حداقل ۱ بار در هفته و روستاهای قمر هر ماه یکبار و روستاهای سیاری سه ماه یکبار
- (۲) در روستاهای اصلی با جمعیت کمتر از ۵۰۰ نفر به صورت هر دو هفته یکبار و برای روستاهای قمر ماهی یکبار و روستاهای سیاری سه ماه یکبار می باشد
- (۳) در روستاهای اصلی با جمعیت کمتر از ۲۰۰۰ نفر یکبار در هفته و روستاهای قمر هر دو هفته و سائری هر سه ماه یکبار
- (۴) در روستاهای اصلی با جمعیت بیش از ۳۰۰۰ نفر دو بار در هفته و برای روستاهای قمر هر دو هفته یکبار و روستاهای قمر هر ماه یکبار

۱۱۷- معیار تعیین اعضای تیم سلامت طبق جمعیت تحت پوشش چقدر است؟ (iranarze.ir)

- (۱) به ازای هر ۴۰۰۰ نفر ساکن یک پزشک تعیین می گردد. برای جمعیت ۴۰۰۰ نفر تا ۱۲۰۰۰ نفر ۲ پزشک
- (۲) به ازای هر ۸۰۰۰ نفر جمعیت ساکن یک ماما و به ازای ۱۲۰۰۰ نفر دو ماما
- (۳) به ازای هر ۲۰۰۰ نفر جمعیت ساکن یک ماما و یک پزشک ثابت وجود داشته باشد
- (۴) به ازای هر ۷۰۰۰ نفر جمعیت تحت پوشش ساکن ، یک نفر کاردان یا کارشناس آزمایشگاه تعیین می گردد.

۱۱۸- میانگین اقلام تجویزی پزشک چند قلم داروی بیمه روستایی می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) دو قلم
- (۲) ۳ و نیم قلم
- (۳) ۲ و نیم قلم
- (۴) ۴ قلم

استریلیزاسیون

۱۱۹- زمان لازم جهت استریل کردن وسایل با فور کدام است؟ (iranarze.ir)

(۱) ۱۶۰ درجه/۱۲۰ دقیقه

(۲) ۱۷۰ درجه/۹۰ دقیقه

(۳) ۱۸۰ درجه/۶۰ دقیقه

(۴) هر سه مورد

۱۲۰- کدام روش جزء موارد استریلیزاسیون با بخار آب (حرارت مرطوب) نمی باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) جوشاندن

(۲) پاستوریزه کردن

(۳) فور

(۴) اتوکلاو

۱۲۱- کدام مورد در روش استریلیزاسیون با اتوکلاو صحیح نمی باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) پک ها و بسته ها باید به طور عمودی در اتوکلاو قرار گیرد.

(۲) وسایل را می توان بلافاصله پس از استریل کردن از اتوکلاو خارج کرد.

(ج) برای استریلیزاسیون با اتوکلاو، دمای ۱۲۱ درجه و مدت زمان ۶۰ دقیقه مطلوب می باشد.

(۴) گزینه ۲ و ۳

زیج حیاتی

۱۲۲- تاریخ ولادت فردی ۹۳/۵/۲۰ است. سن او در تاریخ ۹۵/۷/۲۶ چند سال و چند ماه و چند روز است؟ (iranarze.ir)

(۱) یک سال و ۲ ماه و ۸ روز

(۲) دو سال و ۲ ماه و ۶ روز

(۳) دو سال و ۶ ماه

(۴) سه سال و ۲ ماه و ۵ روز

۱۲۳- در محاسبه میزان مرگ مادر کدامیک از موارد زیر در مخرج کسر قرار می گیرد؟ (iranarze.ir)

(۱) تعداد کل زنان در همان سال

(۲) تعداد کل زنان ۱۰ تا ۴۹ ساله در همان سال

(۳) تعداد تولدهای زنده در همان سال

(۴) جمعیت کل منطقه همان سال

۱۲۴- کدام مورد در جدول تولدها (تنظیم توسط فروشگاه ایران عرضه) در ستون مرده به دنیا آمده ثبت می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) مرگ نوزادان

(۲) ختم بارداری زیر ۲۲ هفته

(۳) ختم بارداری بالای ۲۲ هفته بدون علائم حیاتی

(۴) موارد سقط

۱۲۵- خانمی ۳ قلو زایمان کرده که ۲ قل آن مرده بدنیا آمده اند در ستون سن مادر در این تولد زنده علامت و در ستون شرایط زایمان علامت

زده می شود. (iranarze.ir)

(۱) ۲-۱

(۲) ۱-۱

(۳) ۲-۱

(۴) ۲-۲

۱۲۶- خانمی ۳۰ ساله در دوران بارداری خود بر اثر تصادف فوت می کند در این مورد کدام قسمتهای زیج حیاتی تکمیل می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) جدول مرگ مادران در قسمت سایر علل - جدول مرگ برحسب سن و جنس و در قسمت آبی گردونه

(۲) جدول مرگ برحسب سن و جنس و در قسمت سبز گردونه

(۳) جدول مرگ مادران در قسمت سایر علل - جدول مرگ برحسب سن و جنس و در قسمت سبزرنگ گردونه

(۴) جدول مرگ برحسب سن و جنس و در قسمت آبی گردونه

فصلنامه بهورزی

۱۲۷- کدامیک از فاکتورهای خطر برای سرطان پستان نیست ؟ (iranarze.ir)

- (۱) سقید پوست بودن
(۲) وجود نسج متراکم پستان در ماموگرافی
(۳) بلوغ و یائسگی زودرس
(۴) مصرف نوشیدنیهای الکلی

۱۲۸- برای جلوگیری از فرسودگیهای شغلی چه پیشنهادهایی به افراد می کنیم ؟ (iranarze.ir)

- (۱) ایجاد حدو حدود برای خود
(۲) یادگیری راهکارهای مدیریت استرس
(۳) گرفتن مرخصی طولانی مدت
(۴) ۱ و ۲

۱۲۹- برای پیشگیری از نابینایی و کم بینایی معاینه کودکان بهتر است در چه سالی توسط پزشک انجام شود ؟

- (۱) قبل از ۳ سالگی
(۲) سن ۵ سالگی
(۳) زمان ورود به مدرسه
(۴) پایان سال اول ابتدایی



ایران عرضه

مرجع نمونه سوالات

آزمون های استخدامی

به همراه پاسخنامه تشریحی

خدمات ایران عرضه:

- ارائه اصل سوالات آزمون های استخدامی
- پاسخنامه های تشریحی سوالات
- جزوات و درسنامه های آموزشی

برای دانلود رایگان جدیدترین سوالات استخدامی ادوار گذشته بهورزی، اینجا بزنید

همچنین جهت مشاهده آخرین اخبار استخدامی بهورز، اینجا بزنید

« انتشار یا استفاده غیر تجاری از این فایل، بدون حذف لوگوی ایران عرضه، مجاز می باشد »

