

سوالات استخدامی

مادران و نوزادان و کودکان


توضیحات:

- بخشی از محصول
- شامل ۵۵ سوال
- با قابلیت پرینت
- کد محصول: ES1093

برای دانلود رایگان جدیدترین سوالات استخدامی کارشناس مادران و نوزادان و کودکان، اینجا بزنید

همچنین جهت مشاهده آخرین اخبار استخدامی، اینجا بزنید

« انتشار یا استفاده غیر تجاری از این فایل، بدون حذف لوگوی ایران عرضه، مجاز می باشد »



۵ سوال ابتدایی این فایل، دارای پاسخنامه تشریحی می باشد. در صورت تمایل به دریافت سوالات بیشتر با جواب تشریحی می توانید این محصول را از سایت ایران عرضه خریداری نمایید.

خرید محصول

❖ سوالات استخدامی مادران و نوزادان و کودکان تالیف ایران عرضه ۱۴۰۳

۱- کدام یک از گزینه های زیر از جمله بخش های واحد های تولد کودک میباشد؟ (iranarze.ir)

(۱) اتاق ریکاوری (۲) اتاق زایمان (۳) اتاق انتظار (۴) همه موارد

✓ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۴ ← بسیاری از بیمارستان ها دارای واحدهای تولد کودک هستند. این واحدها شامل بخشهایی از جمله اتاق انتظار، اتاق زایمان و ریکاوری است (LDR) که در بعضی از مراکز، مکان زایمان طبیعی و ریکاوری در یک واحد قرار داده شده است.

۲- طبق قانون، افرادی که از طریق سزارین زایمان کرده اند چه مدت میتوانند در مراکز دارای تسهیلات زایمان اقامت کنند؟

(۱) ۲۴ ساعت (۲) ۲۴ تا ۴۸ ساعت (۳) ۴۸ ساعت (۴) ۷۲ ساعت

✓ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۲ ← بر اساس قانون، در مراکز دارای تسهیلات زایمان نظیر بیمارستان، افراد بارداری که زایمان واژینال (زایمان طبیعی) دارند، میتوانند ۲۴ تا ۴۸ ساعت و افرادی که از طریق سزارین زایمان کرده اند، ۷۲ ساعت اقامت کنند. در واحدهای مستقل تولد کودک در ایالات متحده، تعداد کمی زایمان صورت میگیرد، چون بیمه اشتباهات پزشکی در این واحدها بسیار گران است و دریافت آن نیز مشکل میباشد لذا بیشتر ماماها ترجیح میدهند در بیمارستان ها یا مراکز زایمان فعالیت داشته باشند.

۳- پروژه ژنوم انسان، تلاشی همگانی برای مشخص کردن تمام ژن های موجود در بدن انسان است.

(۱) نقشه (۲) عیوب (۳) پیشرفت (۴) جهش

✓ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۱ ← پروژه ی ژنوم انسان تلاشی همگانی برای مشخص کردن «نقشه» تمام ژنهای موجود در بدن انسان است. ژنها مسئول ایجاد بیماریهایی از قبیل فیبروز کیستیک، سندرم X شکسته و سرطان پستان شناخته شده اند. پروژه ی ژنوم انسان کمک میکند تا با جایگزین کردن کمبودهای ژنی یا جابه جا کردن ژنهای معیوب از طریق ژن درمانی، بتوان بروز بسیاری از بیماریهای ژنتیکی را کاهش داد.

۴- (منبع ایران عرضه) واریانس چیست؟ (iranarze.ir)

(۱) اختلالات واضح در تشخیص اولیه ارایه دهندگان مراقبت بهداشتی

(۲) بهبود بیماری با ارائه روش های درمانی

(۳) مشخص شدن بیماری و ارائه برنامه درمانی توسط ارائه دهندگان مراقبت بهداشتی

(۴) اختلالاتی که با توجه به چارچوب ویژه مشخص شود

✓ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۴ ← با مشخص کردن چارچوبی ویژه که با توجه به پیامدهای مورد انتظار در زمینه ی بهبود بیماری و مراقبت اختصاصی تدوین می شود، ارایه دهندگان مراقبت بهداشتی میتوانند به وضوح و روشنی هر نوع اختلال را مشخص کنند. این اختلالات که با توجه به چارچوب ویژه مشخص میشود، واریانس (انحراف) نامیده میشود.

۵- کدام یک از موارد زیر جز ارکان اصلی برقراری ارتباط نمیشد؟ (iranarze.ir)

(۱) مشاهده (۲) شنیدن (۳) جو محیط (۴) ثبت اطلاعات

✓ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۳ ← سه رکن اصلی برقراری ارتباط، شامل شنیدن، مشاهده و ثبت اطلاعات است. یک شنونده ی خوب میتواند در طرف مقابل ایجاد اطمینان و احترام کند. از طریق تکنیک مشاهده، پرستار میتواند با استفاده از هر دو روش کلامی و غیر کلامی، به طور زیرکانه ای دریابد که ارتباط بین پرستار و بیمار چگونه است تا تبادل دوسویه افکار و عقاید صورت گیرد.

۶- کدام گزینه در رابطه با فرهنگ نادرست می باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) فرهنگ به وسیله باورها و عملکرد هایی شکل میگیرد که بین افرادی با زمینه غیر یکسان مبادله میشود.

(۲) فرهنگ قسمتی از ویژگی های اجتماعی است که به توسط نسلی به نسل بعد منتقل میشود

(۳) ویژگی های فرهنگی، فکری و عملکردی به ما نشان میدهد که چه کسی هستیم.

(۴) ویژگی ها یا سنت های نسل به نسل منتقل شده تبدیل به ارزش های فرهنگی میشوند که در رفتار بروز پیدا میکند

۷- بلوغ چه زمانی آغاز میشود؟ (iranarze.ir)

(۱) آغاز تولید اسپرم بالغ (۲) پدیدار شدن تغییرات ثانویه جنسی

(۳) برقرار شدن چرخه های منظم قاعدگی (۴) همه موارد

۸- اولین هورمون مردانه که موجب بمی صدای آنها می شود چیست؟ (iranarze.ir)

(۱) هورمون FSH (۲) هورمون LH (۳) پرولاکتین (۴) تستوسترون

۹- اولین دوره قاعدگی چند سال پس از رشد پستان ها رخ می دهد؟ (iranarze.ir)

(۱) ۱ تا ۱.۵ سال (۲) ۲ تا ۲.۵ سال (۳) ۲.۵ تا ۳ سال (۴) ۳ تا ۳.۵ سال

۱۰- کدام عضو از دستگاه تناسلی زنان توسط موهای عانه پوشیده شده است؟ (iranarze.ir)

(۱) مونس پوبیس (۲) کلیتوریس (۳) وستیبول (۴) لب های بزرگ

۱۱- کدام ساختار همچون پنیس در مردان عمل میکند؟ (iranarze.ir)

(۱) مونیس پوبیس (۲) پرینه (۳) کلیتوریس (۴) دهلیز واژنی

۱۲- پایین ترین قسمت رحم کدام است؟ (iranarze.ir)

(۱) کورپوس (۲) لایه ی سروزی (۳) سرویکس (۴) فوندوس

۱۳- کدام یک جزو دستگاه تناسلی خارجی مردان است؟ (iranarze.ir)

(۱) اسکروتوم (۲) بیضه ها (۳) غده پروستات (۴) غدد مجاری

۱۴- اسپرم طی چه مدت میتواند به لوله های فالوپ در زنان برسد؟ (iranarze.ir)

۱) چهار دقیقه ۲) پنج دقیقه ۳) شش دقیقه ۴) هفت دقیقه

۱۵- در چه صورت به مایع آمنوتیک، هیدرآمیوس می گویند؟ (iranarze.ir)

- ۱) مایع آمنوتیک به حدود یک لیتر برسد. ۲) مایع آمنوتیک به یک و نیم لیتر برسد.
۳) مایع آمنوتیک به حدود دو لیتر برسد. ۴) مایع آمنوتیک به حدود دو و نیم لیتر برسد.

۱۶- کدام یک از علائم توسط مادر نشان دهنده این است که وقوع زایمان نزدیک است؟ (iranarze.ir)

- ۱) نزول جنین ۲) درد های کاذب ۳) ترشحات واژینال ۴) همه موارد

۱۷- کدام مرحله از زایمان با خروج جنین آغاز شده و با خروج جفت پایان میابد؟ (iranarze.ir)

- ۱) مرحله اول ۲) مرحله دوم ۳) مرحله سوم ۴) مرحله چهارم

۱۸- طولانی ترین و متغیرترین مرحله از زایمان کدام است؟ (iranarze.ir)

- ۱) مرحله اول ۲) مرحله دوم ۳) مرحله سوم ۴) مرحله چهارم

۱۹- مادران چند زا باید چه زمانی به بیمارستان مراجعه کنند؟ (iranarze.ir)

- ۱) در یک ساعت هر ۵ دقیقه یک بار دچار انقباض میشوند
۲) در یک ساعت هر ۶ دقیقه یک بار دچار انقباض می شوند
۳) در یک ساعت هر ۸ دقیقه یک بار دچار انقباض می شوند
۴) در یک ساعت هر ۱۰ دقیقه یک بار دچار انقباض میشوند

۲۰- بزرگ ترین چالش پرستاران چیست؟ (iranarze.ir)

- ۱) جمع آوری اطلاعات مربوط به فرد پذیرش شده ۲) تدوین برنامه مراقبتی برای لیبر و زایمان
۳) روند پذیرش و پر کردن فرم های پذیرش مددجو ۴) مراقبت از بیمار در مرحله زایمان کاذب

۲۱- در صورتی که فرد تحت مانیتورینگ الکترونیک نمیباشد، FHR باید از چه طریقی ارزیابی شود؟ (iranarze.ir)

- ۱) سونوگرافی ۲) سمع با ترانس دیوسر داپلر
۳) فتوسکوپ ۴) گزینه ۲ و ۳

۲۲- در فاز دوم لیبر کنترل مانیتورینگ ضربان قلب جنین، با فواصل چند دقیقه ای انجام می شود؟ (iranarze.ir)

- ۱) ۱۰ دقیقه ای ۲) ۱۵ دقیقه ای ۳) ۲۰ دقیقه ای ۴) ۳۰ دقیقه ای

۲۳- الگوی نرمال ضربان قلب جنین چقدر است؟ (iranarze.ir)

- ۱) ۱۰۰ تا ۱۵۰ ضربه در دقیقه ۲) ۱۱۰ تا ۱۵۵ ضربه در دقیقه
۳) ۱۱۰ تا ۱۶۰ ضربه در دقیقه ۴) ۱۲۰ تا ۱۷۰ ضربه در دقیقه

۲۴- چه تغییری در مایع آمنوتیک احتمال دفع مکنونیوم را نشان میدهد؟ (iranarze.ir)

- ۱) مایع سبز رنگ باشد. ۲) مایع شرابی رنگ باشد.

۳) مایع بوی تند و ناخوشایند بدهد. ۴) مایع آبی رنگ باشد.

۲۵- در ارتباط با Doula کدام گزینه صحیح میباشد؟ (iranarze.ir)

- ۱) یکی از اعضای خانواده یا دوستان است که تجربه زایمان دارد
- ۲) تنها توسط وسیله انجمن بین المللی آموزش زایمان تأیید میشوند
- ۳) برای کمک به زایمان یا راهنمایی و تشویق مادر در طول لیبر فراخوانده شود
- ۴) حامی خانواده است و به وسیله دکتر مسئول مادر برای کمک به خانواده انتخاب میشود

۲۶- مرحله سوم لیبر چه زمانی خاتمه می یابد؟ (iranarze.ir)

- ۱) بعد از خروج جفت ۲) بعد از زایمان نوزاد ۳) بعد از جمع شدن رحم ۴) هیچکدام

۲۷- ایران عرضه! جفت معمولاً در عرض چند دقیقه بعد از زایمان نوزاد خارج می شود؟ (iranarze.ir)

- ۱) ۵ الی ۱۰ دقیقه ۲) ۱۰ الی ۲۵ دقیقه ۳) ۱۵ الی ۳۰ دقیقه ۴) ۳۰ الی ۳۵ دقیقه

۲۸- نوزاد تا چه زمانی نمی تواند مرخص شود؟ (iranarze.ir)

- ۱) اثبات باز بودن مجرای معدی - روده ای ۲) ثبات و پایداری وضعیت کلی نوزاد
- ۳) اثبات باز بودن ژنیتال - ادراری ۴) گزینه ۱ و ۳

۲۹- به طور معمول چه مقدار از خون بند ناف توسط مراقبین بهداشتی بعد از زایمان نوزادان و قبل از خروج جفت جمع آوری می شود؟ (iranarze.ir)

- ۱) ۴۰ تا ۵۰ میلی لیتر ۲) ۵۰ تا ۶۰ میلی لیتر ۳) ۷۰ تا ۸۰ میلی لیتر ۴) ۸۰ تا ۹۰ میلی لیتر

۳۰- کدام یک از علل اصلی درد در طول لیبر نمی باشد؟ (iranarze.ir)

- ۱) دیلاتاسیون و کشیدگی سرویکس ۲) وضعیت جنین
- ۳) انقباضات رحمی ۴) فشار و کشیده شدن ساختمان های لگن

۳۱- (منتشر کننده سوالات ایران عرضه) !! با توجه به سرعت جذب بالای شیر مادر نسبت به شیرخشک، نوزاد در چه بازه زمانی نیاز به شیردهی دارد؟ (iranarze.ir)

- ۱) ۱ تا ۲ ساعت ۲) ۲ تا ۳ ساعت ۳) ۱ تا ۳ ساعت ۴) ۲ تا ۴ ساعت

۳۲- کدام یک از روش های قرار گیری کودک برای ایجاد آروغ در نوزاد نمی باشد؟ (iranarze.ir)

- ۱) نگه داشتن نوزاد در بالای شانه ۲) قراردادن در وضعیت نیمه نشسته
- ۳) خواباندن نوزاد به پهلو ۴) دمر نمودن نوزاد روی زانو

۳۳- برای برطرف کردن قولنج نوزاد کدام دم کرده مرسوم است؟ (iranarze.ir)

- ۱) زیره سیاه ۲) بادیان ۳) رازیانه ۴) یونجه

۳۴- کدام نوع شیر خشک نیاز به نگهداری در یخچال یا آماده سازی ندارند؟ (iranarze.ir)

- ۱) آماده برای تغذیه (۲) پودر حلال در آب (۳) مایع غلیظ (۴) گزینه ۱ و ۳
- ۳۵- دوران اولیه از دوره نقاهت پس از زایمان یا نفاس شامل چه بازه زمانی است؟ (iranarze.ir)
- ۱) ۲۴ ساعت اول (۲) سه روز اول (۳) هفته اول (۴) هفته اول تا چهارم
- ۳۶- کدام یک از عوامل تسریع کننده ی برگشت پذیری می باشد؟ (iranarze.ir)
- ۱) لیبر طولانی (۲) زایمان های قبلی (۳) بیهوشی (۴) شیردهی از پستان
- ۳۷- جریان تعریق اغلب چه زمانی رخ میدهد؟ (iranarze.ir)
- ۱) صبح (۲) ظهر (۳) عصر (۴) شب
- ۳۸- با افزایش شیردهی سطوح افزایش بیشتری می یابد. (iranarze.ir)
- ۱) استروژن (۲) پرولاکتین (۳) پروژسترون (۴) گزینه ۱ و ۳
- ۳۹- کنترل پس از زایمان شامل کدام مورد زیر نمی باشد؟ (iranarze.ir)
- ۱) ارزیابی پستان ها (۲) ارزیابی مثانه (۳) ارزیابی حرارت بدن (۴) ارزیابی لوشیا
- ۴۰- چه داروهایی برای تسکین ناراحتی ناشی از هموروئید به کار می رود؟ (iranarze.ir)
- ۱) اسپری ها (۲) پماد دیبوکائین (۳) پد های هازل (۴) همه موارد
- ۴۱- طی دوران پس از زایمان، مسئولیت کنترل پیشرفت دلبستگی میان اعضای خانواده و نوزاد به عهدهی چه فردی می باشد؟
- ۱) پرستار (۲) مادر (۳) پدر (۴) زائو
- ۴۲- لوشیا سروزی در چه بازه زمانی جریان دارد؟ (iranarze.ir)
- ۱) یک تا سه روز اول بعد از زایمان (۲) یک هفته اول (۳) پس از گذشت سه روز از زایمان تا ۲۷ روز (۴) تا شش هفته پس از زایمان
- ۴۳- چند درصد از برون ده قلبی مادر در بستر جفت جریان دارد؟ (iranarze.ir)
- ۱) ۱۰ درصد (۲) ۱۵ درصد (۳) ۲۰ درصد (۴) ۲۵ درصد
- ۴۴- لانه گزینی به طور شایع در کجا رخ میدهد؟ (iranarze.ir)
- ۱) لوله فالوپ (۲) تخمدان (۳) حفره شکم (۴) سرویکس
- ۴۵- کدام یک از علل اصلی خونریزی های سه ماهه ی دوم و سوم بارداری نمی باشد؟ (iranarze.ir)
- ۱) جفت سرراهی (۲) پولیب سرویکس (۳) جداشدگی زودرس جفت (۴) انعقاد منتشر درون عروقی
- ۴۶- راهکارهای غیر دارویی جهت تسکین درد در نوزادان چیست؟ (iranarze.ir)
- ۱) صدای ملایم (۲) تکان دادن (۳) مکیدن پستانک (۴) همه موارد
- ۴۷- سندرم داون اغلب حاصل از است و تحت عنوان نیز شناخته میشود؟ (iranarze.ir)
- ۱) حضور کروموزوم اضافی - تریوزومی ۲۱ (۲) حضور کروموزوم اضافی - تریوزومی ۱۹

۳) نبود تعدادی کروموزوم - تریوزومی ۲۱ (۴) نبود تعدادی کروموزوم - تریوزومی ۱۹

۴۸- کدام بیماری در اثر اختلالات متابولیسمی حاصل از کمبود ید رخ میدهد؟ (iranarze.ir)

۱) هیپوتیروئیدی (۲) گالاکتوزمی (۳) فنیل کتونوری (۴) بیماری شربت افرا

۹۴- در صورتی که بیلی روبین پس از ساعت فوتراپی همچنان بیش از باشد، درمان

تعویض خون توصیه میشود. (iranarze.ir)

۱) ۴ ساعت - 25 mg/dl (۲) ۴ ساعت - 30 mg/dl

۳) ۶ ساعت - 25 mg/dl (۴) ۴ ساعت - 30 mg/dl

۴۹- کدام یک از علائم شایع هایپوگلیسمی نمی باشد؟ (iranarze.ir)

۱) آپنه (۲) گریه ضعیف (۳) تعریق (۴) لتارژی

۵۰- چه مواردی موجب می شود از شکل گیری عاطفی میان والد و کودک جلوگیری کنند؟ (iranarze.ir)

۱) انکوباتور (۲) ونتیلاتورها (۳) خطوط وریدی (۴) همه موارد

۵۱- خونریزی در دوران نقاهت پس از زایمان به طور متداول به از دست دادن چه مقدار خون پس از زایمان طبیعی اطلاق

میشود؟ (iranarze.ir)

۱) بیش از ۴۰۰ میلی لیتر (۲) بیش از ۵۰۰ میلی لیتر

۳) بیش از ۶۰۰ میلی لیتر (۴) بیش از ۱۰۰۰ میلی لیتر

۵۲- در ارزیابی پس از زایمان، برون ده ادراری باید حداقل چند ml/h باشد؟ (iranarze.ir)

۱) ۱۵ (۲) ۲۰ (۳) ۲۵ (۴) ۳۰

۵۳- کندگی لخته خون و حرکت آن به سمت عروق ریوی موجب وقوع کدام اختلال می شود؟ (iranarze.ir)

۱) آمبولی ریوی (۲) خونریزی (۳) هایپرتانسیون (۴) آندومتریت

۵۴- غالباً طی چه مدت بعد از زایمان فعالیت جنسی به حالت طبیعی بر میگردد؟ (iranarze.ir)

۱) سه ماه بعد (۲) ۶ ماه بعد (۳) ۸ ماه بعد (۴) یک سال بعد

۵۵- کدام یک از وظایف اصلی تکاملی نوجوانی نمی باشد؟ (iranarze.ir)

۱) تکامل امنیتی (۲) تکامل حس موفقیت (۳) تکامل هویت (۴) تکامل استقلال