



کد محصول
ES1218



آخرین بروزرسانی
۲۴ دی ۱۴۰۳

سوالات استخدامی

فارماکولوژی

- ✓ ویژه آزمون های استخدامی
- ✓ نسخه رایگان شامل ۱۷ سوال (تعداد کمتر و تنها برخی دارای پاسخ)
- ✓ برای تهیه نسخه اصلی، با ۳۵ سوال به همراه پاسخنامه تشریحی، به سایت ایران عرضه مراجعه نمایید.



لینک های مفید آزمون استخدامی فارماکولوژی

خرید این محصول	خرید سوالات کارشناس فوریت های پزشکی
خرید سوالات عمومی وزارت بهداشت	خرید درسنامه دروس عمومی
خرید سوالات استخدامی ۱۰ سال اخیر	اخبار آزمون
شبکه های اجتماعی ایران عرضه (فایل های رایگان + تخفیفات هفتگی + اخبار)	
<p>آخرین بروزرسانی ها: ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ سوالات موجود آپدیت شد.</p>	
<p>(برای مشاهده هر بخش روی آن بزنید )</p>	

فهرست مطالب

❖ فصل ۱: سوالات فارماکولوژی و داروهای موجود در اورژانس، آمبولانس و داروهای تجویزی از راه

ورید تالیف ایران عرضه

◀ بخش اول: سوالات داروهای مورد نیاز در آمبولانس - {صفحه ۴ - ۱۷ سوال}



در هر بخش، تنها ۲ سوال ابتدایی دارای پاسخنامه تشریحی می باشد. در صورت تمایل به دریافت سوالات بیشتر با جواب تشریحی می توانید این محصول را از سایت ایران عرضه خریداری نمایید.

خرید محصول

❖ فصل اول: سوالات فارماکولوژی و داروهای موجود در اورژانس، آمبولانس و

داروهای تجویزی از راه ورید تالیف ایران عرضه

◀ بخش اول: سوالات داروهای مورد نیاز در آمبولانس

۱- اپی نفرین تحت تاثیر کدام یک از مواد اکسید کننده زیر تخریب می گردد؟

(۱) سدیم (۲) کرومات (۳) روی (۴) سولفات

☑ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۲ ← اپی نفرین به سرعت تحت تاثیر مواد اکسید کننده چون ید، کرومات، نیترات، نیتريت، اکسیژن و املاح فلزات قابل احیاء (همچون آهن) تخریب می شود.

۲- اثرات جانبی سولفات آتروپین کدام است؟

(۱) سکتة قلبی (۲) دیس ریتمی (۳) اضطراب (۴) گشاد شدن مردمک

☑ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۴ اثرات جانبی سولفات آتروپین: تاکیکاردی، سردرد، سرگیجه، اضطراب، خشکی دهان، گشاد شدن مردمک، تاری دید، احتباس ادراری (بخصوص در مردان مسن تر)

۳- "هیپوکلسمی" مربوط به منع مصرف کدام دارو است؟

(۱) اپی نفرین ۱:۱۰۰۰ (۲) سولفات آتروپین (۳) بیکربنات سدیم (۴) نیتروگلیسیرین

۴- در تجویز بیکربنات سدیم، جهت تجویز وریدی در نوزادان، باید ویال بیکربنات سدیم رقیق شود.

(۱) ۷/۵ یا ۸/۴ درصد (۲) ۵/۵ یا ۷/۵ درصد (۳) ۲/۵ یا ۴/۵ درصد (۴) ۳/۵ یا ۷/۵ درصد

۵- مهار تحریک سمپاتیک مربوط به تاثیر کدام دارو است؟ (منبع فروشگاه اینترنتی ایران عرضه)

(۱) اپی نفرین ۱:۱۰۰۰ (۲) نیتروگلیسیرین (۳) سولفات آتروپین (۴) آمیودارون

۶- در چه صورت داروی آمیودارون، را باید موقتا قطع نمود؟

(۱) بروز برادیکاردی (۲) کاهش فشارخون

(۳) افزایش فشار داخل جمجمه (۴) موارد ۱ و ۲

۷- اثرات جانبی لیدوکائین چیست؟

(۱) افت فشارخون (۲) تاری دید

(۳) افزایش فشار داخل جمجمه (۴) آلكالوز خارج سلولی

۸- آسپرین جز کدام گروه دارویی قرار میگیرد؟

۱) دیورتیک قوس هنله (۲) ضد دیس ریتمی (۳) آنتی دوپامینرژیک (۴) ضد درد و مهارکننده عملکرد پلاکت

۹- با مصرف کدام دارو احتمال واکنش ازدیاد حساسیت به سالیسیلات ها زیاد میشود؟

۱) آسپرین (۲) لیدوکائین (۳) فوروزماید (۴) لیدوکائین

۱۰- "سندروم نورولپتیک بدخیم" از اثرات جانبی کدام دارو است؟

۱) آسپرین (۲) هالوپریدول (۳) لیدوکائین (۴) فوروزماید

۱۱- در چه بیمارانی دیازپام وریدی را بسیار با احتیاط باید مصرف نمود؟

۱) افراد باردار (۲) بیماران آلرژیک (۳) مبتلایان به COPD (۴) شوک کاردیوژنیک

۱۲- کدامیک از داروهای زیر موجب افزایش اثرات مهارى GABA میگردد؟

۱) لیدوکائین (۲) فنوباریتال (۳) هالوپریدول (۴) فوروزماید

۱۳- در چه موردی سالبوتامول باید با احتیاط مصرف شود؟

۱) دیابت (۲) گواتر (۳) ایسکمی قلبی (۴) مبتلا به آسم

۱۴- کدام گزینه بیانگر منع مصرف سولفات مورفین است؟

۱) فشار خون بالا (۲) درد شدید

۳) مشکلات تنفسی شدید (۴) پارکینسون

۱۵- میزان دوز مصرفی داروی دگزامتازون برای عوارض شناخته شده توده های داخل مغز در کودکان چند mg/kg است؟

۱۶- موارد احتیاط در مصرف رانیتیدین و متوکلوپرامید به ترتیب چیست؟

۱) هیپرتانسیون- اختلالات کبدی (۲) فشارخون پایین- COPD

۳) دیابت شیرین- ایسکمی قلبی (۴) افراد پیر- هیپوکالمی

۱۷- اثرات جانبی دکستروز هیپرتونیک چیست؟

۱) ترومبوفلیت (۲) اسهال (۳) هیپوتانسیون (۴) سرگیجه