



کد محصول
ES1228



آخرین بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۳/۱۴

سوالات استخدامی

جراحی عمومی و زنان و زایمان

- ✔ ویژه آزمون های استخدامی
- ✔ نسخه رایگان شامل ۶۶ سوال (تعداد کمتر و تنها برخی دارای پاسخ)
- ✔ برای تهیه نسخه اصلی، با ۱۵۵ سوال به همراه پاسخنامه تشریحی، به سایت ایران عرضه مراجعه نماید



لینک های مفید آزمون استخدامی پزشک عمومی بیمه دانا

خرید این محصول	خرید سوالات پزشک عمومی بیمه دانا
خرید سوالات عمومی وزارت بهداشت	خرید سوالات عمومی بیمه دانا
منابع آزمون پزشک عمومی بیمه دانا	آشنایی با بیمه دانا
اخبار آزمون بیمه دانا	فایل اطلاعات آزمون بیمه دانا
شبکه های اجتماعی ایران عرضه (فایل های رایگان + تخفیفات هفتگی + اخبار)	

آخرین بروزرسانی ها:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰: سوالات موجود آپدیت شد.

(برای مشاهده هر بخش روی آن بزنید )

۶ سوال ابتدایی این فایل، دارای پاسخنامه تشریحی می باشد. در صورت تمایل به دریافت سوالات بیشتر با جواب تشریحی می توانید این محصول را از سایت ایران عرضه خریداری نمایید.

خرید محصول

❖ سوالات جراحی عمومی و زنان و زایمان تالیف ایران عرضه

۱- در کدام مانور لئوپولد به این سوال پاسخ داده میشود که پشت جنین به کدام سمت واقع شده است؟ (منبع ایران عرضه)

(۱) اول (۲) دوم (۳) سوم (۴) چهارم

☑ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۲ ← بررسی پوزیشن جنین (با استفاده از مانورهای لئوپولد) از اواسط حاملگی

مانور اول لئوپولد: در مانور اول لئوپولد، هدف تعیین عضوی میباشد که در ناحیه ی فوندوس رحم قرار گرفته است.

"یادآوری: سر جنین، در لمس کاملا سفت و مدور میباشد، درحالیکه باتک جنین نرم و نامنظم میباشد."

مانور دوم لئوپولد: در مانور دوم به این سوال پاسخ داده میشود که پشت جنین به کدام طرف واقع شده است.

در مانور دوم لئوپولد، پزشک کف دستهای خود را در طرفین رحم بیمار قرار می دهد. در یک طرف پشت جنین را لمس مینماید

که کاملا صاف و استخوانی بوده و در طرف دیگر شاهد لمس اندام های جنین خواهد بود که به صورت یک حاشیه ی تدویر با

فرورفتگی و برجستگی های زیاده خود را پرزانتته مینماید.

۲- در حضور کدام یک از فاکتورهای زیر Upper limit تست به جای ۱۴۰ عدد ۱۳۰ را نشان میدهد؟

(۱) سن بالای مادر (۲) مادر چاق

(۳) سابقه خانوادگی دیابت (۴) همه موارد

☑ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۴ ← در حضور یکی از ریسک فاکتورهای زیر Upper Limit تست یک ساعته به جای ۱۴۰،

عدد ۱۳۰ در نظر گرفته می شود:

✓ سن مادر بالای ۳۰ سال

✓ سابقه خانوادگی دیابت یا GDM در بارداری قبلی

✓ مادر چاق

✓ سابقه ی تولد نوزاد ماکروزوم یا دچار Malformaion و یا IUFD

✓ سابقه مصرف کورتون یا بناسمپاتومیمیک توسط مادر

✓ گلوکوزوری مداوم

۳- طبق توصیه جناب دنفورت در چه سنی از حاملگی، لازم است تمام بانوان RH منفی که در ابتدای حاملگی حساس نبوده

اند مجددا مورد ارزیابی قرار بگیرند؟

(۱) ۲۰ تا ۲۲ هفتگی (۲) ۳۰ تا ۳۵ هفتگی

(۳) ۲۶ تا ۲۸ هفتگی

(۴) ۲۸ تا ۳۰ هفتگی

☑ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۳ ← غربالگری برای آنتی بادی RH:

طبق توصیه جناب دنفورت، در هفته ی ۲۶-۲۸ حاملگی، لازم است تمام بانوان Rh منفی که در ابتدای حاملگی حساس نبوده اند، «یعنی Coombs منفی بوده اند و آنتی بادی علیه HD نداشته اند» را مجدداً مورد ارزیابی قرار دهیم. اگر همچنان Coombs منفی بودند، باید در هفته ی ۲۸ حاملگی ۳۰۰ میلی گرم ایمونوگلوبولین (HD یا همان روگام فورمان را دریافت کنند تا از بروز ایزوایمونیزاسیون در سه ماهه سوم بارداری جلوگیری شود.

۴- کدام مورد از خطرات عفونت GBS در بانوان باردار نیست؟

(۱) سقط جنین

(۲) آندومتريت

(۳) عفونت زخم جراحی در مادر

(۴) آمنیوتیت

☑ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۱ ← غربالگری جهت استرپتوکوک های گروه B: همان طور که میدانیم در حدود ۳۰٪ از بانوان جوان جامعه، شاهد حضور استرپتوکوک های گروه B (GBS) به عنوان قسمتی از فلور نرمال واژن، دستگاه ادراری تناسلی و حتی دستگاه گوارش می باشیم و جالب است بدانیم همین عفونت GBS ممکن است با خطرات زیر در بانوان باردار همراهی داشته باشد:

✓ آمنیوتیت

✓ آندومتريت

✓ عفونت زخم جراحی در مادر

✓ Sepsis نوزادی در اثر انتقال عمودی در طول زایمان و در نتیجه موربیدیتی طولانی مدت و یا مرگ نوزاد

۵- میزان وزن گیری مادر در وضعیت نرمال طی بارداری چه میزان میباشد؟

(۱) ۱۵ پوند (۲) ۲۵ تا ۳۵ پوند (۳) ۱۲ تا ۲۵ پوند (۴) ۳۰ تا ۴۰ پوند

☑ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۲ ← میزان مورد انتظار وزن گیری مادر در طی بارداری:

وضعیت مادر	مادر BMI	میزان مورد انتظار وزن گیری
Thin	BMI < ۱۹/۸	۳۰-۴۰ Pound
Normal	۱۹/۸-۲۶	۲۵-۳۵ Pound
Overweight	۲۶/۱-۲۹	۱۲-۲۵ Pound
Obese	> ۲۹	۱۵ Pound

۶- در چه زمانی انجام سونوگرافی به منظور ارزیابی دقیق و اطمینان از عدم وجود اینرمالیتهی ضرورت دارد؟

(۱) قبل از هفته ۱۸

(۲) قبل از هفته ۲۰

(۳) بعد از هفته ۲۰

(۴) بعد از هفته ۲۲

☑ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۲ ← انجام سونوگرافی روتین:

در تمامی بانوان باردار لازمست حداقل ۲ بار سونوگرافی در زمانهای پیشنهادی زیر به عمل آید:

- قبل از هفته ی ۲۰ بارداری "به منظور ارزیابی دقیق جنین و اطمینان از عدم وجود ابرنمالیتی در وی"
- اواخر سه ماهه ی دوم "به منظور تعیین سن و سلامت جنین و محل جفت".

۷- در صورت وجود کدام یک از علائم زیر سریعاً نیاز به مراجعه به معالج می باشد؟

(۱) درد شکمی کوتاه مدت افزایش یابنده

(۲) اسهال شدید

(۳) دردهای کرامپی منظم بیش از ۳ بار در ساعت

(۴) استفراغ طولانی مدت

۸- در مادرانی که بیماری فنیل کتونوری دارند در صورت مصرف غذاهای دارای اسیدآمینو فنیل آلانین، چه خطری جنین را

تهدید میکند؟

(۱) IUGR

(۲) Mental retardation

(۳) میکروسفالی

(۴) همه موارد

۹- کدام مورد یا موارد زیر در pH اسیدی معده بهتر جذب میشوند؟

(۱) ویتامین D

(۲) کلسیم و فسفر

(۳) کلسیم و آهن

(۴) ویتامین D و ویتامین آ

۱۰- مدت زمان مرحله دوم زایمان به کدام عامل وابسته نیست؟

(۱) وجود یا عدم وجود بی حسی منطقه ای

(۲) سن مادر

(۳) سایز جنین

(۴) نژاد

۱۱- نام پرزانتاسیونی که باسن جنین در ورودی لگن قرار میگیرد چیست؟ (منبع سوالات سایت ایران عرضه)

(۱) Brow

(۲) face

(۳) shoulder

(۴) brich

۱۲- نقطه مرجع برای پرزانتاسیون صورت چیست؟

(۱) occiput

(۲) ساکروم

(۳) چانه

(۴) گوش

۱۳- کدام یک از حرکات جنین حین عبور از کانال زایمان در زنان نولی پار معمولاً روزها و هفته ها قبل از زایمان به وقوع می

پیوندد؟

(۱) فلکشن

(۲) انگاژمان

(۳) flexion

(۴) Descent

۱۴- یکی از علائم مهم شروع لیبر وقوع می باشد.

(۱) پارگی ممبران

(۲) درد بسیار شدید در کمر یا لگن

(۳) vaginal bleeding

(۴) انقباضات دردناک و منظم رحمی

۱۵- تقریباً در چند درصد بارداری ها شاهد پارگی ممبران ها قبل از شروع دردهای زایمانی میباشیم؟

- (۱) ۱۰ درصد (۲) ۱۵ درصد (۳) ۲۰ درصد (۴) ۲۵ درصد

۱۶- در زمان بستری مادران باردار در بیمارستان به منظور انجام زایمان، چه اقدامی لازم است انجام شود؟

- (۱) سمع قلب و ریه (۲) تعیین محور جنین

- (۳) معاینه داخلی انگشتی (۴) همه موارد

۱۷- در مرحله ی اول لیبر انجام کدام آزمایش ضروری نمیشود؟

- (۱) غربالگری آنتی بادی (۲) تست HIV

- (۳) سرولوژی سیفلیس (۴) هموگلوبین و هماتوکریت

۱۸- تجویز آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک GBS برای کدام افراد زیر توصیه میشود؟

- (۱) بیماران حاوی کشت غربالگری GBS (+) (۲) پارگی ممبران ها به مدت بیش از ۱۸ ساعت

- (۳) لیبر قبل از ۳۷ هفته (۴) شواهد عفونت داخل رحمی مادر

۱۹- در صورت آلرژی شدید به پنی سیلین داروی انتخابی ما کدام مورد خواهد بود؟

- (۱) آمپی سیلین (۲) سفازولین (۳) ونکوماپسین (۴) او ۲

۲۰- نوزادی که بدن کاملاً صورتی با ضربان قلب کمتر از ۱۰۰ و رفلکس Gas با عضلات قوی و فعال دارد دارای نمره آپگار چند

میباشد؟ ایران عرضه

- (۱) ۰ (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

۲۱- بهترین زمان برای انجام Dilution and Evacuation چه زمانی از حاملگی میباشد؟

- (۱) هفته ۱۳ تا ۱۶ حاملگی (۲) هفته ۱۳ تا ۱۵ حاملگی

- (۳) هفته ۱۸ تا ۲۰ حاملگی (۴) هفته ۱۳ تا ۱۸ حاملگی

۲۲- در بین انواع و اقسام آنومالی رحمی بدترین پیش آگهی مربوط به کدام بخش میباشد؟

- (۱) رحم دیواره دار (۲) اتصال نامتقارن رحم

- (۳) رحم دوشاخ (۴) رحم مضاعف

۲۳- کدام مورد از ریسک فاکتورهای متوسط وقوع EP میباشد؟

- (۱) حضور پاتولوژی در لوله های فالوپ (۲) سابقه EP قبلی

- (۳) سابقه عفونت ناحیه ژنیتالیا (۴) سابقه عفونت لگنی

۲۴- کدام مورد از عوارض نادر متوروسکات نمیشود؟

- (۱) بروز هیپوتنشن ارتوستاتیک (۲) پنومونیت بینابینی گذرا

- (۳) نوتروپنی تهدید کننده حیات (۴) اولویسی قابل برگشت

۲۵- ریسک فاکتورهای خطر بالای EP چیست؟

- (۱) حضور پاتولوژی در لوله های فالوپ
(۲) سابقه EP قبلی
(۳) تجربه استفاده از IUD
(۴) همه موارد

۲۶- شایع ترین نوع حاملگی های شکمی کدام نوع میباشد؟

- (۱) حاملگی خارج از رحم
(۲) حاملگی رحمی
(۳) حاملگی لوله فالوپ
(۴) حاملگی تخمدانی

۲۷- بهترین زمان برای انجام تست تریپل و کوادری چه زمانی میباشد؟

- (۱) بین هفته های ۱۸ و ۲۰
(۲) بین هفته های ۱۵ و ۱۸
(۳) بین هفته های ۲۰ و ۲۲
(۴) بین هفته های ۲۸ و ۳۰

۲۸- کدام گزینه از بررسی های مورد نیاز برای غربالگری سندروم داون در سه ماه اول بارداری نیست؟

- (۱) وزن کودک
(۲) سن مادر
(۳) تعیین NT با سونوگرافی
(۴) تعیین سطوح PAPP_A

۲۹- به کمک روش غربالگری قادر به شناسایی چند درصد موارد سندروم داون در سه ماهه ی اول بارداری میباشیم؟

- (۱) ۷۸ درصد
(۲) ۷۷ درصد
(۳) ۸۷ درصد
(۴) ۸۸ درصد

۳۰- برای درمان بیماری آسم در دوران بارداری موظف به رعایت کدام مورد می باشیم؟

- (۱) واکسیناسیون سالانه آنفولانزا
(۲) استفاده از داروهای مجاز
(۳) پرهیز از مواجهه با آلرژن و دود سیگار
(۴) همه موارد

۳۱- کدام دارو در درمان طولانی مدت بیماران مبتلا به آتوپی مورد استفاده قرار میگیرد؟

- (۱) تتوفیلین
(۲) سیتیزین
(۳) لوراتادین
(۴) کرومولین سدیم

۳۲- کدام دارو جزو داروهای آنتی هیستامینی به شمار نمیروند؟

- (۱) داکسیلامین
(۲) پروکلرپرازین
(۳) هیدروکسی زین
(۴) پرممتازین

۳۳- کدام دارو برای درمان بیماری های التهابی روده مورد استفاده قرار نمیگیرد؟

- (۱) مسالامین
(۲) آزاتیوپرین
(۳) مترونیدازول
(۴) سولفاسارین

۳۴- مصرف کدام دارو در دوران بارداری باعث افزایش خطر دکولمان جفت میشود؟

- (۱) ایندومتاسین
(۲) آسپرین
(۳) ایبوپروفن
(۴) استامینوفن

۳۵- کدام گزینه از عوارض ناشی از مصرف فنو باربیتال نیست؟

- (۱) نقایص دستگاه عصبی
(۲) نقایص مادرزادی قلب
(۳) شکاف دهانی - صورتی
(۴) سندروم هیدانتوتئین جنینی

۳۶- از مهم ترین دلایل کوچک بودن جنین نسبت به سن حاملگی چیست؟

- (۱) سقط های مکرر مادر
(۲) سن کم مادر
(۳) اختلالات ژنتیکی
(۴) رژیم غذایی و ورزش سنگین

۳۷- دقیق ترین پارامتر برای تعیین سن حاملگی در ۳ ماهه دوم بارداری چیست؟ (منتشر کننده سوالات ایران عرضه)

- (۱) CRL (۲) TCD (۳) BPD (۴) AC

۳۸- دوره جنینی یا fetal کدام مرحله از بارداری می باشد؟

- (۱) از ۲۸ هفتگی تا پایان بارداری
(۲) از هفته ۹ تا پایان بارداری
(۳) هفته ۹-۴ بارداری
(۴) از لقاح تا هفته پنجم بارداری

۳۹- به ترتیب تعداد ورید و شریان نافی جنین در رحم مادر چه تعداد میباشد؟

- (۱) یک شریان - یک ورید
(۲) یک شریان - دو ورید
(۳) دو شریان - یک ورید
(۴) دو شریان - دو ورید

۴۰- کدام روش معاینه به جراح اجازه می دهد تا به اندازه، طرح و نمای کلی، استحکام، موقعیت و انعطاف پذیری رحم و لوله

های فالوپ و تخمدان ها بپردازد؟ (منبع فروشگاه اینترنتی ایران عرضه)

- (۱) معاینه دو دستی
(۲) معاینه اندام تحتانی
(۳) معاینه زیر بیهوشی
(۴) معاینه شکمی

۴۱- در ژینکولوژی مامایی از چه روشی برای بررسی ساختارهای لگنی بهره میگیرند؟

- (۱) روش شکمی
(۲) روش واژینال
(۳) روش خلفی صفاقی
(۴) ۱ و ۲

۴۲- کدامیک، از وسایل موجود در ست پرپ واژن نمی باشد؟

- (۱) سوند فولی شماره ۱۶
(۲) گلی پات
(۳) سوزن گیر
(۴) رسیور

۴۳- کدامیک از داروهای مورد استفاده در ژینکولوژی، مانع تقسیم سلولی می گردند؟

- (۱) داروهای اکسی توسیک
(۲) داروهای توکولیتیک
(۳) داروهای آنتی متابولیت
(۴) داروهای میزو پرستول

۴۴- لیزر CO2 و آرگون به چه منظور در ژینکولوژی اندیکاسیون دارد؟

- (۱) درمان اندومتریوز لگنی
(۲) مراحل نهایی بدخیمی های ولو و واژن
(۳) جراحی جنین
(۴) ۱ و ۲

۴۵- کدامیک از مزایای لاپروسکوپی می باشد؟

۱) کمک به تشخیص سریع تر و آسان تر

۲) عفونت کمتر زخم به دلیل عدم دستکاری شکم و ارگان های درگیر

۳) درد کمتر بعد از جراحی

۴) همه موارد

۴۶- وضوح در دوربین های دارای ۳ چپ به چه صورت است؟

۱) ۴۵۰ خط در اینچ

۲) ۷۵۰ خط در اینچ

۳) ۸۳۰ خط در اینچ

۴) ۹۰۰ خط در اینچ

۴۷- گزینه نادرست کدام است؟

۱) بعد از معاینه و تشخیص موقعیت رحم، سرویکس توسط تناکولوم بیرون کشیده می شود.

۲) در صورت وجود ضایعات یا توده های غیر طبیعی در آندومتر جهت مطالعات آزمایشگاهی از آنها بیوپسی گرفته می شود.

۳) معمولا روش D&C را به بیوپسی آندومتر ترجیح می دهند.

۴) هیستروسکوپی درمان انتخابی جراحی در پولیپ های رحمی به شمار می آید.

۴۸- علت چسبندگی داخل رحمی چیست؟

۱) ضخامت دیواره رحم

۲) آسیب به لوله فالوپ

۳) وارد شدن تروما به آندومتر رحم

۴) برداشت سیتوم رحمی

۴۹- کدامیک از ابزارهای مورداستفاده در کولیوسکوپی جهت تراشیدن و نمونه برداری از دیواره رحمی سرویکس کاربرد دارد؟

۱) پانچ بیوپسی

۳) کورت آندو سرویسکال

۳) محرک سرویسکال

۴) اسپکولوم آندوسرویسکال

۵۰- زایمان با وکیوم در جنین های چند هفته ای رخ می دهد؟

۱) ۲۸ هفته و کمتر

۲) ۳۰ هفته ای و بیشتر

۳) ۳۴ هفته یا بالاتر

۴) ۳۱ هفته و کمتر

۵۱- uterine inversion به کدام گزینه اشاره دارد؟ (منتشر کننده سوالات ایران عرضه)

۱) وارونگی و بیرون زدگی رحم در طی مرحله سوم زایمان

۲) پارگی رحم در حین زایمان

۳) خارج شدن بند ناف قبل از زایمان

۴) جفت سر راهی و جدا شدن جفت و جنین از هم ...

۵۲- رایج ترین برش رحم در اعمال سزارین چیست؟

۱) برش طولی تحتانی

۲) برش عرضی تحتانی

(۴) برش مایل

(۳) برش کلاسیک

۵۳- Kerr به کدام نوع برش گفته می شود؟

(۲) برش کلاسیک

(۱) برش مایل

(۴) برش طولی تحتانی

(۳) برش عرضی تحتانی

۵۴- برش کلاسیک در کدام مورد اندیکاسیون دارد؟

(۱) آنو پالی های جنین

(۲) چند قلبی

(۳) جفت سر راهی به همراه واریسی بودن سگمان تحتانی

(۴) همه موارد

۵۵- وظیفه اصلی پرستار اسکراب به هنگام دوختن رحم چیست؟

(۱) اکسپوژر مناسب موضع عمل و شمارش گاز

(۲) پوشاندن ترشحات با باند استریل

(۳) شستشوی شکم توسط نرمال سالین گرم شکم

(۴) مرطوب نمودن داخل رحم توسط یک سون گاز مرطوب تمیز بعد از خارج شدن جفت داخل رحم

۵۶- جراحی سرکلاژ به منظور پیشگیری از کدام عارضه انجام می شود؟

(۲) جلوگیری از دیلاتاسیون سرویکس

(۱) بیرون زدگی غشای رحم

(۴) ۲ و ۳

(۳) خروج پیش از موعد جنین

۵۷- در عمل شیروودکار بیمار در چه پوزیشنی قرار می گیرد؟

(۴) لترا

(۳) تندلینبرگ

(۲) لیتوتومی

(۱) سوپاین

۵۸- معمولا اولین تست پیشنهادی پزشک بعد از دیدن علائم حاملگی خارج رحمی چیست؟

(۱) سونوگرافی

(۲) نمونه برداری از طریق D&C

(۳) اندازه گیری هورمون گنادوتروپین و پرژسترون خون

(۴) کولد سنتریس و لاپاروسکوپی

۵۹- در کدام روش جراحی حاملگی های خارج رحمی، لوله فالوپ از یک سوراخ 10mm که قبلا روی شکم ایجاد شده است

از شکم خارج می گردد؟

(۲) حاملگی درون ایستموس لوله فالوپ

(۱) سالپینژکتومی درحاملگی درون لوله ای

(۴) حاملگی درون آمپول لوله فالوپ

(۳) حاملگی درون فیمبریا

۶۰- در کدام نوع از پرولاپس های واژن، روده باریک به دیواره قدامی، خلفی یا راس واژن بیرون زدگی پیدا می کند؟

Rectal prolapse (۲) vaginal vault prolapse (۱)

Bladder prolapse (۴) small bowel prolapse (۳)

(۴) برای برداشتن نمونه از جنین

۶۱- مبتلایان به کانسر تخمدان پیشرفته در معرض خطر ابتلا به کدامیک از بیماری های زیر هستند؟

(۱) آسیت (۲) چسبندگی رحم (۳) افیوژن ریوی (۴) ۱ و ۳

۶۲- احتمال رشد و بزرگی تومورهای میومکتومی در چه زمانی بیشتر وجود دارد؟

(۱) هنگام تخمک گذاری (۲) سه ماهه اول بارداری

(۳) به هنگام یائسگی (۴) ۱ و ۲

۶۳- به مسدود کردن عروق خونی تغذیه کننده فیبروم به اصطلاح چه می گویند؟

(۱) آمبولیزاسیون فیبروئید رحمی (۲) کولدوسنتز

(۳) لاپاراتومی (۴) هیسترتکتومی ترانس واژینال

۶۴- در کدام عمل ابتدا برش عرضی در دیواره خلفی واژن زده می شود و سپس با پیتلا جدار خلفی واژن از فاشیای پریوکتال

جدا می گردد؟

(۱) عمل اصلاح سیستوسل (۲) عمل اصلاح رکتوسل

(۳) عمل رباط ساکرواسپینوس (۴) عمل بستن کانال واژن

۶۵- کولدوسنتز در کدامیک از موارد زیر اندیکاسیون دارد؟

(۱) تشخیص حاملگی های خارج رحمی (۲) تشخیص PID

(۳) تشخیص و درمان آسیت (۴) همه موارد

۶۶- به هنگام قرار دادن تروکارها در هیسترتکتومی به روش LAVH باید از آسیب به کدام بخش خودداری نمود؟

(۱) لوله فالوپ (۲) اپیکاستریک (۳) روده ها (۴) مثانه