



کد محصول
ES1255



آخرین بروزرسانی
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴

سوالات استخدامی

بیماری‌های کودکان

- ✓ ویژه آزمون های استخدامی
- ✓ نسخه رایگان شامل ۶۸ سوال (تعداد کمتر و تنها برخی دارای پاسخ)
- ✓ برای تهیه نسخه اصلی، با ۱۳۶ سوال به همراه پاسخنامه تشریحی، به سایت ایران عرضه مراجعه نمایید.



لینک های مفید آزمون استخدامی پزشک عمومی

خرید این محصول	سوالات استخدامی پزشک عمومی
سوالات استخدامی وزارت بهداشت	سوالات استخدامی تامین اجتماعی
خرید سوالات استخدامی ۱۰ سال اخیر	اخبار استخدامی وزارت بهداشت
منابع تخصصی وزارت بهداشت	اخبار استخدامی تامین اجتماعی
شبکه های اجتماعی ایران عرضه (فایل های رایگان + تخفیفات هفتگی + اخبار)	

(برای مشاهده هر بخش روی آن بزنید )

آخرین بروزرسانی ها:

۱۴۰۴/۰۲/۱۵: سوالات موجود آپدیت شد

۲ سوال ابتدایی این فایل، دارای پاسخنامه تشریحی می باشد. در صورت تمایل به دریافت سوالات بیشتر با جواب تشریحی می توانید این محصول را از سایت ایران عرضه خریداری نمایید.

خرید محصول

❖ سوالات بیماری های کودکان تالیف ایران عرضه

۱- میزان ایمنی در نوزادی که مادر آن در حین حاملگی آبله مرغان گرفته است تا چه مدت باقی می ماند؟

(۱) ۱ تا ۳ ماه (۲) ۲ تا ۴ ماه (۳) ۴ تا ۱۲ ماه (۴) ۱ تا ۲ سال

❑ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۳ ⇐ اگر مادر یک نوزاد قبلاً یا در حین حاملگی آبله مرغان گرفته باشد کودک وی تا چندین ماه در برابر آبله مرغان ایمنی دارد اما این ایمنی در عرض ۴ تا ۱۲ ماه پس از تولد کاهش می یابد.

۲- کدام یک از موارد زیر از نشانه های آپاندیسیت نمی باشد؟ (منبع ایران عرضه)

(۱) درد مداوم در شکم که معمولاً از منطقه ناف شروع می شود و سریعاً به سمت ربع پایین و راست شکم تغییر مکان می دهد
(۲) حساس بودن شکم به لمس
(۳) افت فشار
(۴) تب

❑ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۳ ⇐ نشانه های کلیدی آپاندیسیت شامل موارد زیر است:

(۱) درد مداوم در شکم که معمولاً از منطقه ناف شروع می شود و سریعاً به سمت ربع پایین و راست شکم تغییر مکان می دهد.
نشانه های محتمل آپاندیسیت شامل موارد زیر می شود:
(۱) حساس بودن شکم به لمس (با لمس شکم احساس درد پیدا می شود)
(۲) تهوع و استفراغ
(۳) تب

۳- بند ناف کودک معمولاً چند روز بعد از تولد خشک می شود؟

(۱) ۱ تا ۳ روز (۲) ۳ تا ۵ روز (۳) ۸ روز (۴) ۱۰ تا ۲۱ روز

۴- از نشانه های کلیدی آرتريت در کودکان محسوب می شود؟

(۱) بادکردگی مفاصل (۲) گزرگ شدن مفاصل
(۳) سرد شدن مفاصل (۴) کبودی مفاصل

۵- کدام یک از موارد زیر از نشانه های بیماری آسم در کودکان محسوب می شود؟

(۱) تنفس پشت سر هم (۲) اشکال در دم
(۳) کبودی صورت در زمان سرفه (۴) احساس ولع به هوا

۶- چرا باید از مصرف ترکیبات حاوی وازلین بروی پوست کودکان در هنگام آفتاب سوختگی پرهیز نمود؟

(۱) زیرا ممکن است باعث واکنش‌های آلرژیک شود.

(۲) زیرا باعث تحریک پوست می‌شود.

(۳) زیرا از تعریق و دفع حرارت پوست جلوگیری می‌کند.

(۴) زیرا احتمال بروز جوش و آکنه را زیاد می‌کند.

۷- شایع‌ترین انگل در کودکان کدام است؟

(۱) کرم سنجاقی (۲) کرم نواری (۳) کرم آسکاریس (۴) کرم تینیا

۸- مهمترین کاری که والدین می‌توانند برای کاهش ترس کودکان در هنگام مواجه با دکتر و آمپول انجام دهند چیست؟

(۱) در آغوش گرفتن و بغل کردن کودک (۲) حفظ آرامش و خودداری از تنبیه کودک

(۳) تشویقی دادن به کودک (۴) نشان ندادن عکس العمل

۹- در مطب دندانپزشکی کنترل رفتاری کودک را باید به چه کسی سپرد؟

(۱) والدین کودک (۲) دندانپزشک (۳) همراه کودک (۴) دستیار دندانپزشک

۱۰- موثرترین و مطمئن‌ترین راه برای آموزش دختران در مورد تغییرات جسمی، علائم خلقی، روانی و اجتماعی و همچنین

تغییر فرهنگی و اجتماعی (جهت مقابله با HIV) چیست؟

(۱) آموزش از طریق خانواده (۲) آموزش از طریق کتاب درسی

(۳) آموزش از طریق پرسنل بهداشتی-درمانی (۴) آموزش از طریق مدرسه

۱۱- گلودردهایی که منشا آنها، ویروسی است، چگونه درمان می‌شوند؟

(۱) با آنتی بیوتیک‌ها (۲) با پروبیوتیک‌ها

(۳) درمان دارویی ندارد و خودبخود از بین میرود (۴) با پنی سیلین

۱۲- اولین و مهم‌ترین اصل در مراقبت از نوزاد چیست؟

(۱) نحوه خوابیدن نوزاد (۲) جلوگیری از به وجود آمدن راش یا کهیر

(۳) دادن شیر مادر به نوزاد (۴) روش صحیح نگه داشتن نوزاد

۱۳- کدام یک از موارد زیر از نشانه‌های آنسفالیت در کودکان محسوب نمی‌شود؟

(۱) استفراغ (۲) تشنج یا از دست رفتن هوشیاری

(۳) شل شدن گردن (۴) گیجی

۱۴- به توصیه پزشکان، کودکان از چه سنی احتیاج به معاینه چشم دارند؟

(۱) از یک سالگی تا ۳ سالگی (۲) بین ۶ تا ۱۲ ماهگی

(۳) بعد از سه سالگی تا قبل از ۶ سالگی (۴) از ۱ ماهگی تا ۶ ماهگی

۱۵- به منظور پیشگیری از تولد نوزاد مبتلا به زردی ناشی از ناسازگاری خونی Rhesus کدام آمپول تجویز می‌شود؟

(۱) آمپول میگرستاپ (۲) آمپول کتورولاک (۳) آمپول دیفرلین (۴) آمپول آنتی روگام

۱۶- سودمندترین روش ارزیابی رشد و سلامت جسمانی در کودک چیست؟ (تالیف توسط سایت ایران عرضه)

(۱) اندازه‌گیری وزن (۲) اندازه‌گیری قد (۳) اندازه‌گیری استخوان (۴) همه موارد

۱۷- مناسب‌ترین زمان برای شروع برنامه‌های تحریکی موسیقی قبل از تولد، از چند ماهگی بارداری شروع می‌شود؟

(۱) ماه اول بارداری (۲) اواسط سه ماهه اول بارداری

(۳) اواسط سه ماهه دوم بارداری (۴) سه ماهه آخر بارداری

۱۸- بهترین کار برای رفع احساس ضعف و خستگی در کودکان چیست؟

(۱) استفاده از ویتامین‌ها (۲) استفاده از رژیم غذایی متعادل و پر پروتئین

(۳) استفاده از ویتامین‌های دارو درمانی (۴) ۱ و ۲

۱۹- کدام یک از موارد زیر از نشانه‌های تیروئید کم کار محسوب می‌شود؟

(۱) یبوست شدید (۲) لرزش دست (۳) مشکلات رفتاری (۴) اگزوفتالموس

۲۰- خونریزی علامت عمده کمبود کدام ویتامین محسوب می‌شود؟

(۱) ویتامین d (۲) ویتامین c (۳) ویتامین k (۴) ویتامین B1

۲۱- مناسب‌ترین عینک برای محافظت چشم‌ها از بازتاب‌های محیطی کدام مورد است؟

(۱) عینک‌هایی که ۵۰ درصد اشعه مادون قرمز را جذب می‌کنند

(۲) عینک گاکل

(۳) عینک ایمنی طبی دارای خاصیت ضد فرابنفش

(۴) عینک‌های دارای خاصیت ضد فرابنفش تا ۴۰۰ نانومتر

۲۲- مکونیوم چیست؟

(۱) اولین مدفوع دفع شده از کودک (۲) اولین ادرار دفع شده از کودک

(۳) اولین شیرینی که نوزاد می‌خورد (۴) به ماده‌ی که نوزاد بعد از آروغ بالا می‌آورد

۲۳- اولین اقدام درمانی در هر کودک مبتلا به اسهال چیست؟

(۱) مصرف آنتی بیوتیک زیر نظر پزشک (۲) برطرف نمودن علت اسهال

(۳) جایگزین کردن آب و املاح از دست رفته (۴) مصرف داروهای ضد اسهال

۲۴- از عواملی که شنوایی کودک را در بدو تولد تا ۸۲ روزگی به خطر می‌اندازد چیست؟

(۱) مننژیت باکتریایی

(۲) ضربه سر خصوصاً استخوان گیجگاهی توام با بیهوشی

۳) عفونت‌های پایدار یا عود کننده گوش میانی همراه با ترشح که سه ماه بیشتر طول بکشد

۴) یرقان شدید نوزادی که نیاز به تعویض خون باشد

۲۵- شایع‌ترین فرم کره اکتسابی که تنها علامت نورولوژیک موجود در بیماری تب روماتیسمی محسوب می‌شود چه نام دارد؟

۱) کره سیدنهام ۲) آتونزیس ۳) کره هانتینگ ۴) کره میوکلونوس

۲۶- دوره کمون بیماری اوریون در کودکان چه مدت می‌باشد؟

۱) ۷ تا ۲۱ روز ۲) ۷ تا ۱۴ روز ۳) ۱۴ تا ۲۱ روز ۴) ۲۱ تا ۳۱ روز

۲۷- جهت استفاده از پیوند مغز استخوان، چه تعداد پروتئین سلولی اهدا کننده با پروتئین‌های بیمار باید مشابه باشد؟

۱) دست کم ۷ پروتئین از ۸ پروتئین سلولی ۲) دست کم ۶ پروتئین از ۸ پروتئین سلولی

۳) دست کم ۴ پروتئین از ۶ پروتئین ۴) دست کم دو پروتئین از چهار پروتئین

۲۸- نام بیماری پوستی که بصورت خون ریزی زیر پوستی بوده و بر اثر اختلال خونی پدید می‌آید چیست؟

۱) کهیر پوستی ۲) پسوریازیس ۳) پورپورا ۴) حساسیت لاکتس

۲۹- عامل ایجاد بیماری برفک چیست؟

۱) بروسلوز ۲) کاندیدا آلبیکانس ۳) توکسوپلاسموز ۴) پاراتیفوئید

۳۰- به آسیب و جراحی که پوست و بافت زیر آن را پاره کند به طوری که منجر به خونریزی گردد گفته می‌شود.

۱) خراش ۲) زخم ۳) اگزاما ۴) بریدگی

۳۱- کدام یک از موارد زیر از نشانه‌های بوتولیسم محسوب می‌شود؟

۱) تب شدید ۲) دوتا دیدن اجسام ۱۲ تا ۴۸ ساعت پس از شروع دل درد

۳) تنفس سریع و گاه مشکل ۴) رنگ پوست متمایل به آبی

۳۲- به عدم توانایی در فکر کردن قبل از انجام عمل یا حرف زدن و به عبارتی عمل کردن به واسطه انگیزه آنی گفته می‌شود؟

۱) تکانشگری ۲) اختلال ترکیبی ۳) بی توجهی ۴) حواس پرتی

۳۳- کدام گزینه از نشانه‌های بیماری فیبروز کیستیک است؟ (منبع سوالات سایت ایران عرضه)

۱) عفونتهای مکرر تنفسی ۲) خارش و تورمی چشم

۳) بیرون زدگی راست روده انتهای روده از مقعد ۴) تب شدید

۳۴- کدام بیماری سیستم تعادلی گوش داخلی دچار را دچار تغییر می‌کند؟

۱) سندرم الپورت ۲) بیماری حرکت ۳) بیماری گوش شناور ۴) بیماری وزوز گوش

۳۵- به پارگی بافت‌های سفت و تسمه ماندی به اسم رباط که کارشان حمایت از مفصل و محدود کردن حرکات آن است چه گفته می‌شود؟

۱) کشیدگی ۲) پیچ خوردگی ۳) پارگی رباط ۴) پارگی مفصل زانو

۳۶- داروی موسوم به FTI می‌تواند در زمینه کدام بیماری زیر به کودکان کمک کند؟

- (۱) پروجریا (۲) صرع (۳) کولیک (۴) هیپاتیت

۳۷- چرا کودکان اغلب مستعد تشنج ناشی از تب هستند؟

- (۱) ضعف سیستم ایمنی (۲) عدم تکامل مغز در کودکان
(۳) عدم تکامل تراکم استخوانی (۴) به دلیل تغییرات ژنتیکی و هورمونی

۳۸- کدام گزینه برای جلوگیری از عفونت ناشی از ترکیدن تاول ها می باشد؟

- (۱) پمادهای آنتی بیوتیک (۲) دیفن هیدرامین مایع
(۳) تریامسینولون (۴) پمادهای بی‌حسی موضعی

۳۹- کدام یک از موارد زیر از نشانه‌های حملات صرع بدون تشنج محسوب نمی‌شود؟

- (۱) خیره شدن به هوا (۲) دیدن نورهای برق مانند
(۳) لرزش در عضلات دست و صورت (۴) احساس بوهای بد
۴۰- چنانچه تنبلی چشم در کودکان تا پیشگیری نشود، کودک به کم بینائی دائمی و غیر قابل علاج منجر خواهد شد.

- (۱) ۳ تا ۵ سالگی (۲) ۵ تا ۸ سالگی (۳) ۸ تا ۱۰ سالگی (۴) ۱۰ تا ۱۲ سالگی

۴۱- استفراغ جهنده نوزاد از نشانه‌های کدام بیماری در کودکان می‌باشد؟

- (۱) مننژیت یا آنسفالیت (۲) تهوع ناشی از حرکت
(۳) توکسوکاریازیس (۴) تنگی باب المعده

۴۲- انجام جراحی لوزه در چه سنی برای کودکان مناسب است؟

- (۱) زیر ۲ سال (۲) زیر ۳ سال (۳) زیر ۵ سال (۴) زیر ۷ سال

۴۳- چه زمانی می‌توان یک کودک را چاق در نظر گرفت؟

- (۱) هنگامی که وزن وی ۱۰ درصد بیشتر از متوسط قد و سن او باشد
(۲) هنگامی که وزن وی ۲۰ درصد بیشتر از متوسط قد و سن او باشد
(۳) هنگامی که وزن وی ۲۵ درصد بیشتر از متوسط قد و سن او باشد
(۴) هنگامی که وزن وی ۳۰ درصد بیشتر از متوسط قد و سن او باشد

۴۴- نام علمی بیماری تنبلی چشم در کودکان چه نام دارد؟

- (۱) آمبلیوپی (۲) گلوکوم (۳) انیزوکوریا (۴) پیفوری

۴۵- شایع‌ترین علت خفگی در کودکان محسوب می‌شود؟

- (۱) نقایص مادرزادی قلب یا ریه (۲) کودکانی که دچار خناق هستند
(۳) بلع اشیا (۴) عفونت های دستگاه تنفسی، ذات الریه، کروپ و ویروسی در کودکان

۴۶- چرا درد مربوط به مفصل همراه با تب میتواند خطرناک باشد؟

- (۱) زیرا می‌تواند به علت التهاب چرکی مفصل باشد
- (۲) زیرا می‌توان نشانه‌ی از تب روماتیسمی باشد
- (۳) زیرا می‌تواند نشانه‌ی دررفتگی مفاصل باشد
- (۴) زیرا میتواند منجر به بیماری پاژه استخوان شود

۴۷- عامل ایجاد عفونت در پیازچه مو که منجر به دمل می‌شود چیست؟

- (۱) هایپرتریکیوزیس
- (۲) تریکوپیتیلوزیس
- (۳) استافیلوکوکوس اورئوس
- (۴) هیرزوتیسم

۴۸- به لایه نازک از بزاق و باقیمانده‌های غذا که باکتری در آن رشد می‌کند چه می‌گویند؟

- (۱) بیوپسی
- (۲) پلاک
- (۳) پیله دندان
- (۴) روت

۴۹- زمانی رخ می‌دهد که قند خون فرد به شدت پایین بیاید. (منبع فروشگاه اینترنتی ایران عرضه)

- (۱) شوک دیابتی
- (۲) اغمای دیابتی
- (۳) دیابت بی مزه
- (۴) کمای دیابتی

۵۰- چرا در ۸ تا ۱۲ ماهگی کودکان، به جای راه افتادن زودتر باید کودک را به چهار دست و پا رفتن تشویق کرد؟

- (۱) زیرا سبب ایجاد هماهنگی میان حرکات دست و چشم می‌شود.
- (۲) زیرا از فشار بیش از اندازه بر روی مفاصل جلوگیری می‌شود.
- (۳) زیرا هنوز استخوان‌ها دارای کلسیم و فسفر به میزان کافی نیست.
- (۴) زیرا سبب ایجاد تعادل بیشتر بین اندام حرکتی کودک می‌شود.

۵۱- به اختلال یادگیری که بر توانایی خواندن کودک تاثیر گذاشته و موجب اختلال در درک نوشته‌ها می‌شود چه می‌گویند؟

- (۱) دیگرافیا
- (۲) اختلال ویژه زبانی
- (۳) عقب ماندگی ذهنی
- (۴) دیسلکسیا

۵۲- اگر کودکی هیچ کدام از علائم عیوب انکساری یا مشکلات بینایی را نداشته باشد، باید در چه سنی مورد اولین معاینه

کامل سیستم بینایی قرار گیرد؟

- (۱) ۳ ماهگی
- (۲) ۶ ماهگی
- (۳) یکسالگی
- (۴) ۳ سالگی

۵۳- روشی که پزشکان برای بررسی قسمت فوقانی دستگاه گوارش از آن استفاده می‌کنند کدام است؟

- (۱) کولونوسکوپی
- (۲) سیگموئیدوسکوپی
- (۳) رادیوگرافی
- (۴) آندوسکوپی معده

۵۴- اگر ستون مهره‌ها انحراف جانبی داشته باشد به آن بیماری..... گویند.

- (۱) اسکولیوز
- (۲) ارتروز
- (۳) اسپوندیلیت آنکیلوزان
- (۴) دیسک دژنراتیو

۵۵- میزان مصونیت واکسن سرخه در کودکان به چه میزان می‌باشد؟

- (۱) ۸۷ درصد
- (۲) ۹۰ درصد
- (۳) ۹۷ درصد
- (۴) ۱۰۰ درصد

۵۶- به سرطان سلول‌های سفید خون در کودکان چه گفته می‌شود؟

- (۱) لوکمی (۲) لوسمی (۳) لنفو پلاستیک (۴) ۱ و ۲

۵۷- اگر سرفه کودک به دلیل بیماری‌هایی از قبیل عفونت گوش میانی، ورم لوزها و یا خروسک مربوط باشد تجویز دکتر چه چیز میتواند باشد؟

- (۱) تجویز داروهای باز کننده برونشیت.
(۲) آموزش اینکه چگونه کودک خلط خود را سرفه کند.
(۳) تجویز آنتی بیوتیک به منظور از بین بردن عفونت.
(۴) تجویز قطره‌های بینی که از ریزش ترشحات به حلق جلوگیری به عمل آورد.

۵۸- کدام بیماری زیر به دلیل استفاده از آسپیرین برای درمان آبله مرغان یا آنفلوآنزا در کودکان پدیدار می‌شود؟

- (۱) سندرم ری (۲) سندرم مرگ ناگهانی نوزاد
(۳) سندرم اورشلیم (۴) سندرم مزمن

۵۹- برای چه مدت پس از سوراخ کردن گوش کودک، نباید گوسواره را درآورد؟

- (۱) ۲ تا هفته (۲) ۲ تا ۳ هفته (۳) ۴ تا ۶ هفته (۴) ۶ تا ۷ هفته

۶۰- شایع‌ترین دلیل بروز مسمومیت غذایی در کودکان چیست؟

- (۱) پنوموکوک (۲) کوکوباسیل (۳) اشرشیا کولی (۴) استرپتوکوک

۶۱- آرتریت چیست؟

- (۱) التهاب یک یا تعدادی مفصل
(۲) التهاب ناشی از عفونت آپاندیس
(۳) التهاب مغز کودکان
(۴) التهاب ریه

۶۲- بهترین و قدیمی‌ترین داروی درمان آسم چه نام دارد؟

- (۱) تئوفیلین (۲) سیتريزن (۳) آنتی هیستامین (۴) بکلومتازون

۶۳- استفاده از کدام یک از موارد زیر به عنوان اولین خط درمان آکنه در نوجوانان محسوب می‌شود؟

- (۱) استفاده از آنتی بیوتیک‌های خوراکی
(۲) استفاده از اشعه ایکس
(۳) استفاده از آب تمیز و گرم
(۴) استفاده از پماد ویتامین A یا بنزیل پروکسید

۶۴- التهاب مغز در کودکان را چه می‌نامند؟ - طراحی شده توسط ایران عرضه -

- (۱) آنسفالیت (۲) آرتریت (۳) درماتیت آتوپیک (۴) سلولیت

۶۵- در بیماری آنفلوآنزای کودکان چه مدت پس از ظهور علائم، فرد مبتلا می‌تواند بیماری را منتقل کند؟

- (۱) ۳ روز (۲) ۵ روز (۳) ۷ روز (۴) ۱۰ روز

۶۶- منظور از هیپرتیروئیدیسم چیست؟

(۲) کم کاری تیروئید در هنگام تولد

(۱) کم کاری تیروئید بعد از تولد

(۴) تیروئید زود رس

(۳) فعالیت بیش از حد تیروئید

۶۷- استفراغ شدید و متناوب در جریان دو ماه اول زندگی نوزاد نشانگر چیست؟

(۲) عدم تحمل نسبت به غذای کمکی شیر

(۱) عفونت شدید دستگاه گوارشی

(۴) اختلالات مغزی

(۳) انسداد انتهای معده

۶۸- عمده‌ترین علت اسهال در کودکان بالای ۵ سال چیست؟

(۲) آنتریت ناحیه‌ای

(۱) ویروس‌های روده‌ای

(۴) باکتری‌های اسهال خونی

(۳) انگل‌های روده‌ای

