
ایران عرضه
فروشگاه کالاهای دانلودی
IRANARZE.IR



IranArze.ir
@iranarze

کد محصول
ES2082

آخرین بروزرسانی
۱ آذر ۱۴۰۵

سوالات تستی

پرستاری کودکان

- ویژه آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری
- نسخه رایگان شامل ۵۰ سوال (تعداد کمتر و تنها برخی دارای پاسخ)
- برای تهیه نسخه اصلی، با ۱۰۳ سوال به همراه پاسخنامه تشریحی، به سایت ایران عرضه مراجعه نمایید.

انتشار یا استفاده غیر تجاری از این جزوه، بدون حذف لوگوی ایران عرضه "مجاز" می باشد
IRANARZE.IR

لینک های مفید آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری

خرید این محصول	**سوالات رایگان صلاحیت حرفه ای پرستاری با پاسخنامه تشریحی**
خرید سوالات صلاحیت حرفه ای پرستاری	**منابع آزمون**
اخبار آزمون	**شبکه های اجتماعی ایران عرضه** (فایل های رایگان + تخفیفات هفتگی + اخبار)

(برای مشاهده هر بخش روی آن بزنید)

آخرین بروزرسانی های محصول:

۱۴۰۵/۰۹/۰۱ تالیف مجدد محصول

۳ سوال ابتدایی این فایل، دارای پاسخنامه تشریحی می باشد. در صورت تمایل به دریافت سوالات بیشتر با جواب تشریحی می توانید این محصول را از سایت ایران عرضه خریداری نمایید.

خرید محصول

❖ سوالات پرستاری کودکان (وانگ) تالیف ایران عرضه با پاسخنامه تشریحی

۱- بیشترین خطر مرگ و میر برای کودکان سن ۹- ۵ سالگی و دومین علت مهم مرگ و میر در کودکان ۱-۱۴ سالگی کدام است؟ - طراحی شده توسط ایران عرضه -

۱) مسمومیت - سوختگی ها ۲) صدمه ناشی از دوچرخه- غرق شدگی

۳) خفگی- سقوط ۴) برق گرفتگی- غرق شدگی

☑ **پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۲** ⇦ صدمات ناشی از دوچرخه، علت مهّم مرگ و میرهای کودکان است. بیشترین خطر متوجه کودکان ۹-۵ سال است، که علت آن صدمات ناشی از سر میباشد. استفاده از کلاه ایمنی صدمات سر را تا ۸۵٪ کاهش می دهد، ولی متاسفانه تعداد کمی از کودکان از کلاه ایمنی استفاده میکنند. پرستاران می توانند به کودکان و خانواده ها در مورد ایمنی عابر پیاده و دوچرخه آموزش دهند.

غرق شدگی، دومین علت مهّم مرگ در هر دو جنس در کودکان ۱۴-۱ سال و سوختگی جز سه علت مهم مرگ در کودکان ۱-۱۴ سال می باشد. به علاوه استفاده نامناسب از اسلحه علت اصلی مرگ در جنس مذکر است. در دوره شیرخوارگی اکثر مرگ و میرها در جنس مذکر ناشی از آسپیراسیون و خفگی می باشد.

۲- مفهوم اساسی در "مراقبت خانواده محور" رابیان کنید.

۱) توانمند سازی ۲) قدرت دهی

۳) دسترسی به خدمات بهداشتی ۴) موارد ۱ و ۲

☑ **پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۴** ⇦ دو مفهوم اساسی در مراقبت خانواده محور شامل توانمند سازی و قدرت دهی است. Enabling به این معنی است که افراد حرفه ای با دادن فرصت به خانواده و یکایک اعضای آن سبب میشوند، که آنان توانایی ها و کفایت های موجود را نشان داده و دستاورد جدیدی را که برای برآوردن نیازهای کودک و خانواده ضروری میباشد، کسب کنند.

۳- کدام مورد از امتیازات درونی که فرد جوان باید از جامعه دریافت کند، نیست؟

۱) حمایت ۲) مسئولیت یادگیری ۳) ارزش های مثبت ۴) کفایت اجتماعی

☑ **پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۱** ⇦ امتیازات درونی که فرد جوان از جامعه باید دریافت کند، شامل موارد ذیل است،که اینها هدف و کانون تمرکز رابه وجود می آورند:

۱ - مسئولیت یادگیری: فرد جوان مستلزم توسعه تعهد برای کسب تحصیل و یادگیری مادام العمر است.

۲- ارزشهای مثبت: فرد جوان باید به طور جدی احساس ارزش کند که این احساس ارزش می تواند به طور مستقیم وی را به اهدافش رهنمون کند.

۳- کفایت اجتماعی: فرد جوان نیاز به مهارت هایی دارد که به وی در انتخاب گزینشها و برقراری ارتباطات کمک کند.

۴- هویت مثبت: فرد جوان به قدرت هدف ارزش و تعهد نیاز دارد.

۴- جریانی که از طریق آن پرستار در جستجوی فرصت هایی است که مستقیم و غیرمستقیم به تعاملات فرهنگی بپردازد، چه نام دارد؟ (متعلق به سایت ایران عرضه)

۱) آگاهی فرهنگی ۲) دانش فرهنگی ۳) آشنایی فرهنگی ۴) تمایل فرهنگی

۵- موضوع زیر مشخصه ی کدام مرحله است؟

"در شیرخوار، سیستم عصبی مرکزی خیلی سریعتر از سیستم عصبی محیطی، توسعه پیدا میکند"

۱) مشخصه اصل سفالوکودال ۲) مشخصه اصل پروکسیمودیستال

۳) اصل تمایز ۴) بلوغ یا رسش

۶- کدام مرحله مربوط به "سطح پس قراردادی" از نظریه تکامل اخلاقیِ کوهلبرگ، می باشد؟

۱) گرایش به تنبیه و اطاعت ۲) توافق بین شخصی

۳) گرایش به قانون و نظم ۴) تعهد اجتماعی، جهت یابی بسوی قانون

۷- از تست غربالگری"آدمک گودیناف" برای تکامل عقلانی چه گروه سنی استفاده می شود؟

۱) ۱تا ۶ سالگی ۲) ۳ تا۱۰ سالگی

۳) بدو تولد تا۶ سالگی ۴) ۲ تا ۶ سالگی

۸- ..... در دوره شیر خوارگی نسبت به اعضای دیگر کاملا نارس است.

۱) کبد ۲) کلیه ۳) روده ها ۴) پانکراس

۹- بر طبق نظریه تکامل روانی-اجتماعی "اریکسون" در چه صورت شیرخوارگان هرگز یاد نخواهند گرفت که توانایی خود را در کنترل محیط بدست آورند؟

۱) با ایجاد حالت خشنودی دیررس ۲) تامین نیازهای کودک قبل از اعلام آنها

۳) عدم تعدیل یاس متقابل والد و کودک ۴) عدم برآورده شدن حس رضایت بخشی

۱۰- "واکنش حلقوی ثانویه" مربوط به کدام مرحله از مراحل تکاملی پیاژه است؟ (متعلق به سایت ایران عرضه)

۱) مرحله چهارم ۲) مرحله دوم ۳) محله سوم ۴) مرحله اول

۱۱-کدامیک از رفتارهای زیر ممکن است با لوس شدن کودک اشتباه شود؟

۱) گریه کردن شیرخوارگی که توام با قولنج باشد، یا نباشد.

۲) کنکاش دائم وکج خلقی کودک نوپا

۳) کودکان ADHD

۴) همه موارد

۱۲- کدام مورد از ویژگیهای حرکتی عمده شیرخوارگی در ۱۱ ماهگی نیست؟

۱) توانایی نشستن دارد.

۲) با گرفتن یک دست راه می رود.

۳) در حالت نشسته به عقب برگشته و یک شیء را برمیدارد.

۴) با گرفتن مبل و یا با کمک هر دو دست راه میرود.

۱۳- کدام عامل مربوط به عوارض ناشی از مصرف زیاد آب در ۴ ماهگی نیست؟

۱) هیپوناترمی ۲) مسمومیت با آب ۳) خطرFluorosis ۴) نارسایی رشد

۱۴- توصیه میشود که چنانچه محتوای فلوراید آب کمتر از 0/3PPM (سهم در میلیون) است، از ..... تا ..... روزانه مقدار 0/25mg فلوراید مصرف شود. (تالیف سایت ایران عرضه)

۱) ۶ ماهگی تا ۳ سالگی ۲) ۴ ماهگی تا ۲ سالگی

۳) ۶ ماهگی تا۶ سالگی ۴) ۴ ماهگی تا ۵ سالگی

۱۵- بیماری کواشیورکور متعاقب شیوع کدام عوامل دیده میشود؟

۱) دیفتری- مشکلات روانی ۲) وبا- فیبروز کیستیک

۳) سرخک- دیسانتری ۴) سلیاک - حصبه

۱۶- در رابطه با "ماراسموس" کدام گزینه صحیح است؟

۱) در نواحی جغرافیایی با ذخایر غذایی محدود مشاهده میشود.

۲) نوعی تغییر رنگ پوست دراثر کمبود ویتامین ها است.

۳) نوعی مسمومیت غذایی در افراط از مصرف ویتامین هاست.

۴) سندرمی از محدودیت جسمی و عاطفی می باشد.

۱۷- در اثر مصرف بیش از حد ویتامین D، چه عارضه ای ایجاد می شود؟

۱) اسهال ۲) زیاد شدن اشتها ۳) کم شدن دفع ادرار ۴) تنگی نفس

۱۸- عامل پیش آگاهی ضعیف ناشی از ابتلا به FTT چیست؟

۱) تناوب کمتر تغذیه ۲) ناکافی بودن غذا

۳) مقاومت شدید تغذیه ای ۴) مادر مسن تر

۱۹- تغییر کدامیک از موارد زیر در مداخلات پرستاری مربوط به اختلال "درماتیت دیاپر" مهمترین عامل محسوب می شود؟

۱) محیط مرطوب ۲) نور شدید ۳) میزان PH ۴) مدفوع

۲۰- در رابطه با مشخصه "اتیولوژی SIDS " کدام مشخصه صحیح نیست؟ (تالیف سایت ایران عرضه)

۱) درصد بالایی از جنس مذکر را شامل میشود.

۲) شیوع زیادی در فصل زمستان دارد.

۳) شیوع زیاد آن در طبقه پایین اجتماعی- اقتصادی دیده میشود.

۴) اوج سنی در۴-۲ ماهگی و ۳۵٪ در ۹ ماهگی است.

۲۱- از نظر تکامل روانی- اجتماعی وظیفه اختصاصی نوپایان کدام است؟

۱) عدم تحمل جدایی والدین ۲) دسترسی به خشنودی زودرس

۳) کنترل اعمال بدنی ۴) عدم افتراق خود از دیگران

۲۲- بازگشت به سطح پایین تری از رفتار به چه معناست؟

۱) منفی نگری ۲) قهقرایی ۳) استرس ۴) کج خلقی

۲۳- ..... در بین پسران دومین و دختران سومین عامل مرگ و میر ناگهانی کودکان ۴-۱ ساله می باشد.

۱) غرق شدگی ۲) مسمومیت ۳) چوکینگ ۴) سوختگی

۲۴- کودکان ۴ الی ۷ ساله در مرحله Naive instrumental orientation چه ویژگی دارند؟

۱) درک طبقه بندی چیزها می باشد.

۲) توانایی در نظر گرفتن نقطه نظر دیگران را دارند.

۳) اعمال و رفتار در جهت ارضای نیازهای خودشان است، نه دیگران

۴) حیاتی بودن جریانات فکری آنها

۲۵- کدام عامل از عوامل شدت دهنده پرخاشگری نمی باشد؟ (طراحی توسط ایران عرضه)

۱) تقلید ۲) کنجکاوی ۳) تقویت ۴) یاس

۲۶- عامل کدام بیماری مربوط به دوران نوپایی و قبل از مدرسه، ویروس "هرپس انسانی تیپ ۶" است؟

۱) اوریون ۲) سرخجه ۳) تب مخملک ۴) رزوئولا

۲۷- پرستاران در رابطه با "مننژیت باکتریال" به والدین چه پروسیجرهایی را باید آموزش دهند؟

۱) درجه حرارت اتاق را بالا نگه دارند. ۲) اتاق تا حد امکان آرام شود.

۳) سر کودک به مقدار زیاد بالاتر باشد. ۴) اتاق دارای نور درخشان باشد .

۲۸- امر حیاتی در جلوگیری از بروز اَشکال مقاوم HIV در افراد مبتلا چیست؟

۱) رعایت برنامه منظم مصرف داروها ۲) افزایش وزن در کودکان با تاخیر رشد

۳) کاستن هپاتواسپلنومگالی ۴) بهبود علایم آنسفالوپاتی

۲۹- چرا پرستاران موقعیت خیلی خاصی جهت شناسایی سوء رفتار در خانواده دارند؟

۱) توانایی شناسایی احتمال وقوع آن را دارند.

۲) می توانند بطور مستقیم به درمان آن بپردازند.

۳) اولین فردی هستند که کودک و والد را می بینند.

۴) به دلیل آموزش هایی که در این باره دیده اند.

۳۰- مسئولیت پرستار در رابطه با عفونت های انگلی چیست؟ (منتشر کننده سوالات ایران عرضه)

۱) کمک به تشخیص انگل ۲) درمان عفونت

۳) پیشگیری از عفونت اولیه ۴) همه موارد

۳۱- منظور از"عملیات ملموس"از دیدگاه پیاژه چیست؟

۱) توانایی ارتباط دادن یک سری از رویدادها و اعمال به نمادهای ذهنی می باشد.

۲) کودک را به اشتغال در تجربیات وارتباطاتی بیش از حیطه خانواده ترغیب میکند.

۳) سازندگی به حس کفایت و غلبه کودک کمک میکند.

۴) تغییرات خیلی برجسته و آنچه پیشرفت تکامل رادرکودک نشان میدهد.

۳۲- مهارتهای فیزیکی کسب شده در بازی کودکان در بروز چه حسی کمک میکند؟

۱) غرور ۲) لیاقت ۳) تنفر ۴) استقلال

۳۳- کدامیک از دلایل زیر ممکن است دلیل دروغگویی در کودکان کوچکتر باشد؟

۱) فریب دادن دیگران ۲) سوءتفاهم

۳) به خاطر نیاوردن رویداد ۴) رهایی از تنبیه

۳۴- کدام نوع تغذیه در فهرست انجمن تغذیه آمریکا جهت کودکان سن مدرسه موجود نمی باشد؟

۱) انتخاب غذاهای کم نمک ۲) انتخاب غذاهای با قند متوسط

۳) مصرف مواد غذایی توام با فعالیت فیزیکی ۴) مصرف غذاهایی با چربی کمتر

۳۵- یکی از عوامل مهّم در رفتارهای خطر پذیر چیست؟

۱) جلب توجه ۲) فشار گروه همسال

۳) بالابودن اعتماد بنفس ۴) شکست رقیبان

۳۶- نقش پرستاران در ارتباط با بی اختیاری ادرار کودک چیست؟ (ناشر سایت ایران عرضه)

۱) استفاده از تشویق و گاه تنبیه ۲) مداخله ی مستقیم

۳) کمک به والدین و کودکان در درک آن ۴) همه موارد

۳۷- کدامیک از علایم زیر مربوط به معیار تشخیصی "بی توجهی" در کودکان بیش فعال نیست؟

۱) در کارهای نوبتی اغلب مشکل دارد.

۲) اغلب قادر به توجه طولانی مدت به فعالیت های بازی نیست.

۳) هنگام صحبت مستقیم با وی بنظر میرسد گوش نمیدهد.

۴) اغلب در سازماندهی وظایف و فعالیتها مشکل دارد.

۳۸- همزمان با تکامل در بُعد شناختی، چه توانایی در دوره نوجوانی افزایش می یابد؟

۱) تفکر ۲) نه گفتن به گروه همسال

۳) جذاب بودن ۴) تصمیم گیری

۳۹- ارتقای سلامتی در دوره نوجوانی دربرگیرنده ی کدام حیطه نیست؟

۱) فیزیکی ۲) روانی ۳) عاطفی ۴) اجتماعی

۴۰- کدامیک از مطالب زیر بیانگر "پاسخ به عواطف نوجوان" به عنوان عامل حیاتی جهت برقراری ارتباط، در جریان مصاحبه می باشد؟ {ا یر ا ن عر ضه}

۱) تمرکز روی چیزی که گفته می شود بدون آنکه قضاوت گردد.

۲) وجود تناقض بین ارتباط کلامی و غیرکلامی است.

۳) ابراز نگرانی در مورد ایما و اشاره غیر کلامی و ابراز حمایت است.

۴) پاسخ به عواطف بدون درنظر گرفتن ارزش های فرهنگی و مذهبی نوجوان.

۴۱- نوجوانانی که در معرض ..... فعال بوده اند باید تست توبرکولین شوند.

۱) حصبه ۲) سل ۳) آسم ۴) کزاز

۴۲- منظور از حالت (AGA) بر طبق طبقه بندی شیرخواران پر خطر چه می باشد؟

۱) شیرخواری که وزن وی در بدو تولد بین صدک ۱۰ و۹۰ در منحنی رشد درون رحمی است.

۲) شیرخواری که رشد درون رحمی اوکم بوده و وزن زمان تولد کمتر از صدک ۱۰ در منحنی رشد درون رحمی می باشد.

۳) شیرخواری که وزن زمان تولد بیش از صدک ۹۰ در منحنی رشد درون رحمی است.

۴) مربوط به شیرخواری که از نظر رشد درون رحمی تاخیر دارد.

۴۳- کدامیک از موارد زیر مربوط به بررسی دقیق پرستار در بررسی نوزاد پرخطر نیست؟

۱) تغذیه نامتعادل ۲) تراکم زیاد چربی زیرجلدی

۳) خطر کمبود حجم مایع ۴) اختلال سلامتی پوستی

۴۴- مطالعات نشان داده است که آن دسته از شیرخواران ..... که کمتر از 1500gm بوده و بطور انحصاری شیر انسان بدون تقویت شده دریافت کرده اند سرعت رشد .... نشان داده اند. (تهیه شده توسط ایران عرضه)

۱) شیرخواران ELBW – بیشتر ۲) شیرخواران VLBW - بیشتر

۳) شیرخواران SAGA – کمتر ۴) شیرخواران LBW - کمتر

۴۵- چه علایمی را پرستار با استفاده از مدل تکاملی مراقبت حمایتی، جهت تندرستی شیرخواران پرخطر، باید با دقت کنترل کند؟

۱) شنیداری و رفتاری ۲) بصری و شنیداری ۳) فیزیولوژی و رفتاری ۴) جسمی و شنیداری

۴۶- چه تدابیری را پرستار پیش از عمل جراحی شیرخوار مشکوک به هیدروسفالی باید اعمال کند؟

۱) روزانه سر را از بزرگترین محیط اندازه گیری کند.

۲) علایم برآمدگی ملاج را در هنگام خواب، یادداشت نماید.

۳) تعیین سطح هوشیاری شیرخوار را بررسی کند.

۴) همه موارد

۴۷- کودکان مبتلا به اسپینا بیفیدا و هیدروسفالی غالبا دچار چه نوع عوارضی می گردند؟

۱) رفتاری ۲) شنوایی ۳) حرکتی ۴) چشمی

۴۸- در دیسپلازی ران، جهت پیشگیری از شکنندگی پوست به چه موردی تاکید میگردد؟

۱) در فواصل منظم و هفته ای یکبار زیر زانوها از نظر قرمزی کنترل شود.

۲) همیشه از دیاپر در زیر زانوها استفاده شود.

۳) روزی ۲ بار پوست زیر زانوها را ماساژ داد.

۴) مورد۱ و۲

۴۹- انجام چه عملی، در اولین بررسی پرستاری جهت برطرف نمودن احتمال فیستول مری به نای در شیرخوار مفید است؟

۱) عبور دادن یک سوند کوچک از دهان بسوی معده در اولین بررسی

۲) قرار دادن نوزاد در دستگاه حاوی اکسیژن

۳) کنترل باز بودن مجاری تنفسی فوقانی بطور یکبار در ساعت

۴) کنترل و یادداشت تعداد دفعات تغذیه شیرخوار

۵۰- موقعیت نهان بیضگی شکمی چگونه است؟ (تالیف سایت ایران عرضه)

۱) مابین حلقه های داخلی و خارجی اینگوینال ۲) خارج از مسیر طبیعی نزول بیضه

۳) مابین حفره شکم و اسکروتوم ۴) نزدیک حلقه داخلی اینگوینال