

## عنوان فارسی مقاله :

بررسی بیماری IBD از لحاظ تاثیرات روانی، بهداشت جنسی و رضایت، تصویر بدن و عملکرد رابطه؛ تحقیقات اولیه با استفاده از مدل معادلات ساختاری

## عنوان انگلیسی مقاله :

Illness perceptions in IBD influence psychological status, sexual health and satisfaction, body image and relational functioning A preliminary exploration using Structural Equation Modeling



## توجه !

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

## 2. Materials and methods

### 2.1. Patients

Seventy-four adults in an ongoing romantic relationship (44 CD, 13 males, average age 38) with IBD completed an online survey. All were in a committed romantic relationship with the majority in a heterosexual relationship (95%). The average length of the relationship was 9.90 years (11.35). The majority of participants were American (54%), while 19% European, 11% were Australian, and 16% were from another country. Regarding employment, the majority (50%) worked full-time, 19% worked part-time or casual, 14% were homemakers, the remaining 17% included individuals who were students, retired, or unemployed. Patients' mean disease duration was 8.42 years, 3 (4%) participants reported currently having a stoma while another 3 participants currently had a fistula.

Inclusion criteria included: self-reported diagnosis of IBD, in a current committed romantic relationship and age over 18 years. Ethical approval to conduct this research was attained from Swinburne University of Technology Human Ethics Research Committees.

و 13 مرد با متوسط سنی 38 EECD بزرگسال شامل 75 در یک نظر سنجی مورد بررسی قرار گرفتند . IBD سال با هم در یک رابطه عاشقانه بوده اند و متعهد به ایجاد رابطه با جنس مخالف تا 95 درصد بوده اند . متوسط طول ارتباط 9/9 سال یعنی از 11 سالگی تا 35 سالگی بوده است . اکثریت شرکت کنندگان به مقدار 54 درصد آمریکایی و 19 درصد اروپایی و 11 درصد استرالیایی و 16 درصد از کشور های دیگر بوده اند . راجب اشتغال ، اکثریت یعنی 50 درصد آنها تمام وقت کار می کردند و 19 درصد آن پاره وقت بوده و 14 درصد آنها خانه دارد بوده اند و باقیمانده که 17 درصد بودند شامل کسانی بودند که یا بازنشسته بوده یا بیکار بوده اند . میانگین طول مدت بیماری 42درصد سال بوده است . 3 درصد از آنها گزارش دادند که در حال حاضر حامل کننده فستیول می باشد و معیار های ورود به مطالعه شاکل تشخیص خود بیماری التهابی روده می باشد که در یک رابطه متعهد عاشقانه بوده و سنی بیشتر از 18 سال را داشته است . تایید اخلاقی برای انجام این تحقیق از دانشگاه سوربون و کمیته تحقیقات اخلاق بدست آمده است .



توجه !

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد.

برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش)

همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

همچنین برای مشاهده سایر مقالات این رشته [اینجا](#) کلیک نمایید.