

عنوان فارسی مقاله :

زنده ماندن پس از سرطان پستان : تجارب زنان نسبت به تغییر بدن خود

عنوان انگلیسی مقاله :

Surviving breast cancer:

Women's experiences with their changed bodies



توجه !

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

روش

شرکت کنندگان

Method

Participants

In line with Smith et al.'s (2009) recommendation for homogeneous and purposeful sampling, women were invited to participate in the study if they were treated surgically for breast cancer and completed chemotherapy and/or radiation for the disease. Women who were treated for a first diagnosis of breast cancer, able to provide written informed consent and communicate in English, and willing to discuss their experiences with their bodies were invited to participate in this study. The criteria of a first diagnosis was important since women's thoughts, feelings, and experiences may be heightened following an initial diagnosis because of the novelty of treatment, which might not be the case following recurrence due to habituation or desensitization (i.e., decreased response to the physical side effects that result from the repeated exposure). Furthermore, it is common to have recurrences in secondary locations (e.g., lung, bone) that would present diverse treatment challenges, and we wanted to avoid this to ensure that women's accounts were focused on breast cancer.

در راستای تحقیقات اسمیت و همکارانش در سال 2009 برای همگن و هدفمندی، زنان جهت مشارکت در این مطالعه دعوت شده اند که مورد جراحی برای سرطان پستان قرار گرفته اند و یا شیمی درمانی یا پرتو درمانی برای بیماران به پایان رسیده است. زنان برای یک تشخیص، برای اولین بار در سرطان پستان تحت درمان قرار گرفته اند که قادر به ارائه رضایت نامه کتبی به زبان انگلیسی بوده و مایل به بحث در مورد تجارب خود بوده اند که به این مطالعه دعوت شده اند. معیار های تشخیص برای اولین بار از افکار، احساسات و تجارب زنان مهم است و ممکن است پس از تشخیص اولیه به دلیل افزایش درمان، ممکن است منجر به عادت یا حساسیت زدایی شود. به عنوان مثال کاهش پاسخ به عوارض جانبی فیزیکی که با قرار گرفتن در معرض تکرار به وجود آید. علاوه بر این معمولاً است که این بیماری در مکان های ثانویه به عنوان مثال ریه و استخوان منجر به چالش هایی برای درمان های متنوع بشود که ما می خواهیم برای این اجتناب از این اطمینان حاصل شود که زنان با سرطان سینه مورد تمرکز این مطالعه بوده است. 11 زن برای مطالعه انتخاب شده که بازه سنی بین 47 تا 70 سال داشته اند و نژاد آنها قفقازی بوده است. 45 درصد از این زنان دارای اضافه وزن بوده اند و 45 درصد آنها دچار پاستوز شده بودند. همه زنان یا ازدواج کرده یا به نوعی زندگی مشترک را داشته اند. براساس داده ها آنها، زنان مبتلا به سرطان پستان بین 1 تا 31 سال تحت درمان قبل از مطالعه قرار گرفته بودند که اکثر آنها یعنی 64 درصد از آنها درمانشان کمتر از 5 سال طول کشیده بود. درمان های متعددی برای سرطان پستان از جمله جراحی لامپکتومی به مقدار 7/66 درصد، ماستکتومی 3/32، شیمی درمانی 73 درصد، پرتو درمانی 75 درصد، هورمون درمانی 3/83 درصد و جراحی ترمیمی 27 درصد قرار گرفته اند. جدول 1 خلاصه ای از این ویژگی ها را در زنان ارائه نموده است.



توجه!

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد.

برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

همچنین برای مشاهده سایر مقالات این رشته [اینجا](#) کلیک نمایید.