



بخشی از ترجمه مقاله

عنوان فارسی مقاله :

دوره بالینی اختلال روانی ناشی از مصرف شیشه در یک دوره
درمانی سه ماهه

عنوان انگلیسی مقاله :

Clinical Course of Methamphetamine-Induced Psychotic
Disorder in a 3-Nonth Follow-Up



توجه !

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل
با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.



بخشی از ترجمه مقاله

CONCLUSION

More than half of the patients relapsed into methamphetamine use, did not adhere to treatment, and were functionally impaired. Although abstinent patients improved in most of the clinical scales (positive, negative, and manic symptoms) 3 months later, depressive symptoms did not improve. On the other hand, patients who reused methamphetamine, especially frequent users of methamphetamine, continued to experience symptoms or even significantly deteriorated in the follow-up assessment.

Severity of negative symptoms at initial assessment was the only clinical variable that could predict reuse of methamphetamine 3 months later in the patients with MIPD. The current study underscores the importance of depressive and negative symptoms in patients with MIPD. Depressive symptoms indicated a different clinical course from other symptom categories. Negative symptoms also turned out to have a possible role in relapse prediction in the patients with MIPD. Therefore, physicians should be advised to independently address all of the symptom categories of patients with MIPD, including depressive and negative psychotic symptoms, at each follow-up visit.

نتایج

بیش از نیمی از بیمارانی که دوباره شیشه مصرف کردند، درمان نشدند، و از نظر عملکردی آسیب دیدند. اگرچه بعد از سه ماه بیمارانی که از مصرف شیشه پرهیز کردند در بیشتر مقیاس‌های بالینی رشد کردند (علائم مثبت، منفی و شیدایی)، اما علائم افسردگی بهبود نیافت. به عبارت دیگر، بیمارانی که مجدداً شیشه مصرف کردند، مخصوصاً مصرف‌کنندگان دائمی شیشه، این علائم را به طور پیوسته تجربه کردند و یا حتی به طور قابل‌توجهی در دوره ارزیابی کاهش یافتند.

شدت علائم منفی در ارزیابی اولیه تنها متغیری بود که توانست پس از سه ماه مصرف مجدد شیشه را در بیماران مبتلا به MIPD پیش‌بینی کند. پژوهش حاضر بر اهمیت علائم منفی و افسردگی در بیماران مبتلا به MIPD تأکید کرد. علائم افسردگی دوره‌های بالینی متفاوتی را از علائم نشان داد. علائم منفی نقشی احتمالی در پیش‌بینی مصرف مجدد بیماران مبتلا به MIPD دارد. بنابراین، پزشکان باید به طور جداگانه همه علائم مربوط به بیماران MIPD شامل: علائم روانی مثبت و افسردگی را در هر دوره درمانی مدنظر قرار دهند.



توجه!

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

برای جستجوی جدیدترین مقالات ترجمه شده، [اینجا](#) کلیک نمایید.