



بخشی از ترجمه مقاله

عنوان فارسی مقاله :

پیش بینی کننده روند نتایج حاصل از مشاوره گروهی اعتیاد

عنوان انگلیسی مقاله :

Process Predictors of the Outcome of Group Drug Counseling



توجه !

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.



بخشی از ترجمه مقاله

Discussion

In this study, we failed to find evidence that certain process variables, central to the concepts of group therapy and found to predict outcome in studies of group therapy, were associated with the outcomes of treatment for cocaine dependence. In particular, measures of self-disclosure and participation in group sessions were unrelated to sustained abstinence, monthly days using cocaine, next session cocaine use, and change in endorsement of 12-step philosophy; more turns-at-talk was actually related to less improvement in dysfunctional substance use beliefs. However, a positive alliance with the group counselor was found to be associated with both longer-term (over 6 months) reductions in cocaine use and proximal (next session) cocaine use, and increases in the endorsement of 12-step philosophy. In addition, we found that giving advice to patients was a negative predictor: Patients who received more advice (from the counselor or other patients) had worse monthly, weekly, and long-term drug use outcomes and showed relatively less change on two important mediators of outcome (endorsement of 12-step philosophy and beliefs about substance abuse). Receiving non-positive learning statements from the counselor was also associated with less improvement in endorsement of 12-step philosophy (though this variable was highly correlated with advice statements from counselor: $r = .65$).

بحث

در این پژوهش شواهدی را از متغیرهای فرایندی مشخص، مرکز مفاهیم درمان گروهی پیدا نکردیم، و همچنین پیش‌بینی نتایج را در پژوهش‌های درمان گروهی فهمیدیم، که این‌ها با نتایج درمان اعتیاد به کوکائین همراه بود. به ویژه، اندازه‌گیری خود افشایی و مشارکت در جلسات گروهی به پرهیز از مصرف مواد، روزهای مصرف مواد به صورت ماهانه، جلسه بعدی مصرف کوکائین و تغییر در تأیید 12 مرحله درمان مرتبط نیست؛ نوبت‌های بیشتر صحبت کردن به طور واقعی به پیشرفت کمتر به عقاید سوءمصرف مواد مرتبط است. با این حال، اتحاد مثبت با مشاور گروهی با کاهش بلندمدت‌تر (بیش از 6 ماه) مصرف مواد مخدر و مصرف تقریبی کوکائین و افزایش تأیید روش 12 مرحله‌ای همراه است. علاوه بر این دریافتیم که نصیحت بیماران یک پیش‌بین منفی است: بیمارانی که نصیحت بیشتری دریافت می‌کنند (از مشاور یا سایر بیماران) نتایج مصرف مواد مخدر ماهانه، هفتگی و بلندمدت بدتری داشتند و تغییر نسبتاً کمی در دو واسطه مهم نتیجه نشان داد (تأیید روش 12 مرحله‌ای و عقایدی در مورد سوءمصرف مواد). دریافت اظهارات یادگیری غیرمثبت از مشاور، با پیشرفت کمتری از روش 12 مرحله همراه است (اگرچه این متغیرها بسیار زیاد با اظهارات نصیحتی مشاور مرتبط است: $r = .65$).



توجه!

این فایل تنها قسمتی از ترجمه می‌باشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

برای جستجوی جدیدترین مقالات ترجمه شده، [اینجا](#) کلیک نمایید.