



بخشی از ترجمه مقاله

عنوان فارسی مقاله :

اختلالات خواب تشخیص داده نشده در بیماران مبتلا به
مولتیپل اسکلروزیس (ام اس)

عنوان انگلیسی مقاله :

The Underdiagnosis of Sleep Disorders in Patients
with Multiple Sclerosis



توجه !

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل
با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

بخشی از ترجمه مقاله

discussion

This survey demonstrates there is a significant burden of sleep disorders that are likely undiagnosed and unrecognized in the MS population. Among our cohort, 70% of subjects screened positive for at least one sleep disorder based on the questionnaires, yet only a small fraction of the subjects reported being diagnosed by a physician with the respective sleep problem. Approximately 37.8% of our surveyed population screened at risk for obstructive sleep apnea by questionnaire; by contrast, 4.25% reported having been diagnosed by a physician with obstructive sleep apnea. Insomnia was noted to be present based on screening in 31.6% of subjects, yet only 10.6% reported being diagnosed by a physician with insomnia. Subjects met the restless legs syndrome criteria in 36.8% of our surveyed population based on the questionnaire, but only 12.1% reported being diagnosed with RLS by a health care provider.



بحث

این مطالعه بیانگر این بود که در اینجا یک فشار معنی دار از نظر اختلالات خواب بر روی جمعیت مبتلا به ام اس وجود دارد که احتمالاً ناشناخته و درمان نشده باقی مانده اند. از میان گروه ما، 70% از موارد بر اساس پرسشنامه ها، غربالگری مثبت برای حداقل یک اختلال خواب داشته اند با این حال تنها کسر کوچکی از این افراد گزارش کردند که مشکل شان در ارتباط با خواب توسط یک پزشک تشخیص داده شده است. بر اساس پرسشنامه تقریباً 37.8% از جمعیت مورد مطالعه ما در معرض خطر آپنه انسدادی خواب هستند؛ در مقابل 4.25% گزارش کردند که آپنه انسدادی خواب توسط پزشک برایشان تشخیص گذاشته شده است. بر اساس غربالگری، بی خوابی در 31.6% از موارد گزارش شد، با اینحال تنها 10.6% گزارش کردند که از نظر بی خوابی توسط پزشک مورد تشخیص واقع شده اند. بر اساس پرسشنامه، افرادی که معیارهای سندرم پاهای بی قرار را دارا بودند، در 36.8% از جمعیت مورد مطالعه ما را تشکیل می دادند، اما تنها 12.1% گزارش کردند که از نظر سندرم پاهای بی قرار توسط مراقبین سلامت مورد تشخیص واقع شده اند.

توجه!

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت

ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

برای جستجوی جدیدترین مقالات ترجمه شده، [اینجا](#) کلیک نمایید.