



بخشی از ترجمه مقاله

عنوان فارسی مقاله :

مقایسه بیماری زایی عفونت های پس از جراحی در بیماران تحت عمل
جراحی سزارین انتخابی با کاربرد آنتی بیوتیک قبل از برش پوست
و بعد از کلامپ (بستن) بند ناف

عنوان انگلیسی مقاله :

Comparison of Post-Operative Infectious Morbidity in Patients
Undergoing Elective Caesarean Section with Administration of
Antibiotic Before Skin Incision and After Cord Clamping



توجه !

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل
با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.



بخشی از ترجمه مقاله

Discussion

As CS rate is increasing worldwide, at the same time, infectious morbidity associated with it is also increasing.⁹ Many authors have worked over the measures to decrease infectious morbidity after CS including prophylactic antibiotics, surgical techniques, skin preparing solutions, hand washing techniques, drain placement in subcutaneous area and subcutaneous fat closure.¹⁰ Many controversies exist in the literature regarding antibiotics treatment for CS. Rouzi et al had suggested that antibiotics for CS are needed only in case of emergency CS.¹¹ While some other authors had suggested usage of antibiotic both for emergency and elective CS.¹² Similarly some authors have proposed the use of cefazolin for CS, while cephalotin, cefazolin plus metronidazole and ampicillin have also been proposed.¹²⁻¹⁵

بحث:

از آجایی که عمل جراحی سزارین به طور جهانی در حال افزایش است، بیماری عفونی همراه با آن نیز در حال افزایش است. بسیاری از مولفین در مورد ابزارهای کاهش بیماری عفونی بعد از جراحی سزارین کار کرده اند که شامل آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک یا پیشگیرانه، تکنیک های جراحی، محلول های آماده سازی پوست، تکنیک های دست شستن، قرار دادن درن در نواحی زیرجلد و بستن چربی زیر جلدی می باشد. تناقضات زیادی در منابع در ارتباط با درمان آنتی بیوتیکی برای جراحی سزارین وجود دارد. روزی و همکاران پیشنهاد کردند که آنتی بیوتیک برای برش سزارین، تنها در موارد اورژانسی سزارین لازم می باشد. در حالیکه برخی از سایر مولفین استفاده از آنتی بیوتیک را هم برای موارد اورژانسی و هم برای موارد انتخابی پیشنهاد می کنند. به طور مشابه برخی از مولفین، استفاده از سفازولین را برای برش سزارین پیشنهاد کردند در حالیکه پالس سفالوتین، سفازولین به اضافه مترونیدازول و آمپی سیلین هم پیشنهاد شده است.



توجه!

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

برای جستجوی جدیدترین مقالات ترجمه شده، [اینجا](#) کلیک نمایید.