



## بخشی از ترجمه مقاله

عنوان فارسی مقاله :

مدیریت بی هوشی ترمیم پارگی واژینال در طی مرحله نفاس اولیه در  
یک بیمار مبتلا به پورفیری حاد متناوب

عنوان انگلیسی مقاله :

Anesthetic management of vaginal tear repair during early  
puerperium in a patient with acute intermittent porphyria



توجه !

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل  
با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

## بخشی از ترجمه مقاله

### 3. Discussion

Porphyrias are a group of inborn errors of metabolism in which there is disturbance of heme biosynthesis, resulting in excessive production of heme pathway intermediates, the porphyrins and their precursors aminolevulinic acid (ALA) and porphobilinogen [1]. Acute intermittent porphyria is inherited as an autosomal dominant condition that can present with wide variety of clinical features. Clinical onset is usually during or after puberty and is more common in women [2]. The significance of porphyria to anesthesiologist is that some of hepatic porphyrias (acute intermittent and hereditary coproporphyria) are exacerbated by not only lipophilic drugs but also by perioperative factors such as fasting, dehydration, stress and infection. Acute symptoms are dramatic and involve central, peripheral and autonomic nervous system (Table 1) [3].

### 3. بحث

پورفیری ها یک گروهی از خطاهای موروثی از متابولیسم می باشند که در آنها، اختلال بیوسنتز هم (heme) وجود دارد که منجر به تولید بیش از اندازه‌ی واسطه‌های مسیر هم (heme)، پورفیرین‌ها و پیش‌سازهای آنها یعنی آمینولولولینیک اسید (aminolevulinic acid) (ALA) و پورفوبیلینوژن (porphobilinogen) می‌شود. پورفیری حاد متناوب، به صورت یک شرایط اتوزوم غالب به ارث می‌رسد که می‌تواند طیف وسیعی از ویژگی‌های بالینی را نمایش دهد. حملات بالینی معمولاً در طی یا بعد از رسیدن به سن بلوغ ظاهر می‌شوند و در زنان معمول‌تر می‌باشند. معنی داری پورفیری برای متخصص بی‌هوشی به این صورت است که برخی از پورفیری‌های کبدی (کوپروپورفیری (coproporphyria) حاد سلسله مراتبی و متناوب)، نه تنها به وسیله داروهای لیپوفیلیک (lipophilic) بلکه همچنین به وسیله فاکتورهای پیش از جراحی مانند گرسنگی، از دست دادن آب، اضطراب و عفونت، تشدید می‌شوند. نشانه‌های حاد، دراماتیک هستند و دستگاه عصبی اتونوم (خودمختار) و محیطی و مرکزی را در بر می‌گیرند.



## توجه!

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت

ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

برای جستجوی جدیدترین مقالات ترجمه شده، [اینجا](#) کلیک نمایید.