



بخشی از ترجمه مقاله

عنوان فارسی مقاله :

شیوع تریکومونیازیس در میان زنان 18 تا 48 ساله در شمال غرب ایران

عنوان انگلیسی مقاله :

Prevalence of Trichomoniasis among 18-48 Year-old
Women in Northwest of Iran



توجه !

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.



بخشی از ترجمه مقاله

Discussion

Based on the results of the research, of 914 women aged 18 to 48, 31 women (3.38 %) by wet mount and 41 women (4.48%) by parasites culture in Doreset medium were diagnosed with trichomoniasis infection. Sensitivity of direct method was 75.6% compared to culture method (standard). No significant relationships were found among age, level of education, economic situation of the household and clinical symptoms in women with trichomoniasis infection. 9.8% of people with trichomoniasis had a history of abortion.

بحث

بر اساس نتایج این تحقیق، از میان 914 زن در سنین 18 تا 48 سال، 31 زن (3.38%) با استفاده از لام مرطوب و 41 زن (4.48%) توسط کشت انگل در محیط دورسه با عفونت تریکومونیاژیس تشخیص داده شدند. حساسیت روش مستقیم در مقایسه با روش کشت (روش استاندارد)، 75.6% بود. هیچ رابطه معنی‌داری بین سن، سطح تحصیلات، وضعیت اقتصادی خانواده و علائم بالینی در زنان مبتلا به عفونت تریکومونیاژیس یافت نشد. 9.8% از افراد مبتلا به تریکومونیاژیس سابقه سقط جنین داشتند.



توجه!

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

برای جستجوی جدیدترین مقالات ترجمه شده، [اینجا](#) کلیک نمایید.