



بخشی از ترجمه مقاله

عنوان فارسی مقاله :

درمان ضایعات وریدی لب ها و ناحیه پریورال با استفاده از لیزر پالس بلند
Nd:YAG

عنوان انگلیسی مقاله :

Treatment of venous lesions of the lips and perioral area with a
long-pulsed Nd:YAG laser



توجه !

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل
با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.



بخشی از ترجمه مقاله

Discussion

Superficial venous ectatic lesions are relatively common on the face and around the mouth, and tend to present most commonly in middle age. Although the problem is often one of cosmesis (Figs. 1 and 2), some perioral and intraoral examples are so big that they affect function (Fig. 3).

Since they were first described,¹ treatment has been ablative and has included coagulation (infrared or electrocoagulation), cryotherapy, and sclerotherapy. They have had varying degrees of success, take a long time, and cause discomfort. Different lasers have also been used such as the carbon dioxide laser,⁸ the diode laser,⁹ or the pulsed dye laser.¹⁰

بحث

ضایعات وریدی ectatic سطحی در صورت و اطراف دهان نسبتاً رایج هستند و بیشتر در سنین میانسالی مشاهده می‌شوند. اگر چه این مشکل اغلب یکی از مشکلات زیبایی است (شکل 1 و 2)، برخی از نمونه‌های perioral و intraoral تاحدی بزرگ هستند که بر عملکرد نیز تاثیر می‌گذارند (شکل 3). از آنجا که برای اولین بار توصیف شده بودند (1)، درمان با عارضه همراه بوده و شامل انعقاد (مادون قرمز یا الکتروکواگولاسیون)، کریوتراپی و اسکروتراپی بود. درجات موفقیت مختلفی داشته، نیاز به زمان زیاد داشته و باعث ناراحتی می‌شوند. از لیزرهای مختلف از قبیل لیزر دی‌اکسیدکربن (8)، لیزر دیود (9)، یا لیزر رنگی پالس‌دار استفاده شده است.



توجه!

این فایل تنها قسمتی از ترجمه می‌باشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

برای جستجوی جدیدترین مقالات ترجمه شده، [اینجا](#) کلیک نمایید.