



بخشی از ترجمه مقاله

عنوان فارسی مقاله :

اختلالات استرسی و اضطرابی مادران و خطر شکستگی های استخوانی کودکان در گذر زمان

عنوان انگلیسی مقاله :

Maternal stress and anxiety disorders and the longitudinal risk of fractures in children



توجه !

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.



بخشی از ترجمه مقاله

4.1. Conclusions

Using a cohort of over 770,000 mother-child pairs, we found that maternal stress and anxiety disorders before delivery or postpartum may be risk factors for childhood fractures. Maternal stress and anxiety were more strongly associated with assault-related fractures before 6 months of age and fall-related fractures after 36 months, reflecting a potential shift in the nature of fractures due to maltreatment as children age. While the clinical significance of these findings is difficult to assess, this study suggests that serious maternal stress and anxiety disorders

increase the risk of having advanced childhood fractures. Future studies are merited to evaluate the clinical significance of the results and to assess the mediating or moderating role of parenting behaviour in relation to child fractures. Women who present with stress and anxiety disorders before or after delivery may benefit from continued mental health support, counselling, and social resources to reduce fracture risk in children.

۴,۱. نتیجه‌گیری

با بررسی گروهی بیش از ۷۷۰۰۰۰ جفت مادر-کودک دریافتیم که اختلالات استرسی و اضطرابی مادر قبل و بعد از زایمان می‌تواند فاکتورهای خطرآفرین برای بروز شکستگی در دوران کودکی نوزاد باشد. استرس و اضطراب مادر ارتباط بسیار تنگاتنگی با شکستگی‌های تهاجمی نوزادان زیر ۶ ماه، و شکستگی‌های ناشی از زمین خوردن در کودکان بالای ۳۶ ماه داشت؛ این مسئله نشان‌دهنده تغییر ماهیت شکستگی‌ها بخاطر بدرفتاری با آنان می‌باشد. گرچه ارزیابی بالین این یافته‌ها، بسیار دشوار است اما نتایج این مطالعه نشان می‌دهند که اختلالات جدی استرسی و اضطرابی مادران، خطر بروز شکستگی‌های وخیم در دروان کودکی را افزایش می‌دهند. مطالعات بعدی، در راستای نشان دادن اهمیت بالینی نتایج و ارزیابی نقش میانجیگری یا تعدیل‌کنندگی رفتار والدین بر میزان بروز شکستگی در کودکان، گام برخواهند داشت. زنان مبتلا به اختلالات استرسی و اضطرابی قبل یا بعد از زایمان می‌توانند از همچنان از منافع حمایت بهداشت روانی، مشاوره، و حمایت‌های اجتماعی در راستای کاهش خطر شکستگی استخوان در کودکان خود، بهره ببرند.



توجه!

این فایل تنها قسمتی از ترجمه می‌باشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

برای جستجوی جدیدترین مقالات ترجمه شده، [اینجا](#) کلیک نمایید.