



کمک‌های اولیه ویژه بهورزان

مجموعه کتب آموزش بهورزی

بهار ۱۳۹۷

مولفان : مریبان پرستاری مراکز آموزش بهورزی

باز نگری و اصلاح درس بر اساس محتوای اصلاح شده از وزارت :

- سکینه قرائی : مریبی مرکز آموزش بهورزی امام رضا (ع) مرکز بهداشت شماره یک مشهد
- مليکا شریفی نیا : مریبی مرکز آموزش بهورزی موعود مرکز بهداشت شماره دو مشهد

مقدمه

آسیب‌ها و صدمات بدنی همیشه در کمین انسان‌ها بوده و حیات آن‌ها را به خطر می‌اندازد. امروزه یکی از مشکلات اصلی جوامع بشری تصادفات، حوادث، صدمات، آسیب‌ها و بلایای طبیعی هستند. بسیاری از کودکان، جوانان و بالغین جان خود را در این گونه حوادث از دست می‌دهند یا برای تمام عمر ناتوان و فلچ می‌شوند.

در حال حاضر نیاز است هر کسی از کمک‌های اولیه آگاهی کافی را داشته باشد تا در محیط زندگی خود در صورت بروز حادث برای اشخاص دیگر بتواند به سرعت به آن‌ها امداد رسانی نماید و نجات بخش زندگی آن‌ها باشد.

کمک‌های اولیه در واقع رساندن مراقبت فوری به مصدوم یا بیمار می‌باشد. به مصدوم کمک می‌کند تا زودتر بهبود پیدا کند و یا این شانس را داشته باشد به مکانی منتقل شود که مراقبت‌های پزشکی کافی بعمل آید.

لازم به یادآوری است که کمک‌های اولیه هرگز جای درمان‌های پزشکی را نمی‌گیرد.

بدیهی است فراغیری مسایل فنی کمک‌های اولیه برای بهورزان که در واقع در محیطی ترین سطح خدمات بهداشتی ارائه خدمت می‌نمایند، بسیار لازم و گاه حیاتی است. مطالب این کتاب بر اساس نیاز بهورزان و از منابع علمی مختلف تهیه گردیده است و تلاش شده است بر مسایل کاربردی بیش از مسایل تئوری تاکید شود. ولی قطعاً نقاط ضعفی نیز دارد که در این رابطه خواستار آن هستیم که همکاران گرامی‌ما را از آن مطلع واز راهنمایی خود به منظور بهبود و ارتقاء کیفیت محتوای آموزشی دریغ نورزیده و در جهت خدمت مناسب‌تر مارا قرین لطف و عنایت قرار دهنند.

در رابطه با تهیه و تنظیم این کتاب وظیفه خود می‌دانیم از خدمات کارشناسان واحد آموزش بهورزی - مدیران و مربیان پرستاری مراکز آموزش بهورزی شهرستان‌های تربت‌حیدریه، قوچان، مشهد، سرخس، نیشابور و تربت جام تشكیر و قدردانی نماییم.

**مدیریت توسعه شبکه و ارتقاء سلامت
مرکز بهداشت استان خراسان رضوی**

فهرست مطالب

عنوان	شماره صفحه
بخش اول مقدمات کمک‌های اولیه	
تعریف کمک‌های اولیه	۱۴
اهداف کمک‌های اولیه	۱۴
تفاوت ارائه خدمات کمک‌های اولیه با ارائه خدمات درمانی	۱۴
صفات و خصوصیات کمک دهنده	۱۴
تریاژ	۱۶
معاینه مصدوم	۱۸
اقداماتی که در موارد پر خطر باید انجام داد	۱۹
نکاتی که پس از انجام اقدامات اولیه در فرم ارجاع باید ثبت شود	۲۰
کیف کمک‌های اولیه خانگی و وسائل آن	۲۱
بخش دوم کنترل علایم حیاتی	
علائم حیاتی	۲۴
تعریف تنفس	۲۴
بررسی تنفس	۲۴
عوامل موثر بر تعداد تنفس	۲۴
تعریف نبض	۲۵
محل‌هایی که نبض را می‌توان لمس نمود	۲۵
نبض کاروتید	۲۶
نبض فمورال	۲۶
نبض براکیال	۲۶
نبض رادیال	۲۶
عوامل موثر بر تعداد نبض	۲۶

فهرست مطالب

عنوان	صفحة
فشارخون	۲۶
طریقه اندازه‌گیری فشارخون	۲۷
فشارسیستول یا ماکزیم	۲۸
فشاردیاستول یا مینیم	۲۸
درجه حرارت	۲۹
طریقه اندازه‌گیری درجه حرارت ازراه زیرزان	۲۹
طریقه اندازه‌گیری درجه حرارت بدن ازراه زیربغل	۳۰
سطح هوشیاری	۳۲
مردمک چشم	۳۳
رنگ پوست	۳۳
معاینات سر و گردن	۳۴
معاینات قفسه سینه و شکم	۳۵
معاینه لگن	۳۵
معایننه ستون مهره ها	۳۶
معایننه اندام فوقانی	۳۶
معایننه اندام تحتانی	۳۶
بخش سوم : اصول و راهکارهای کنترل عفونت درخانه بهداشت	
آلودگی زدایی	۴۰
مراحل اصلی آماده سازی	۴۱
رفع آلودگی	۴۲
پاکسازی یا تمیز کردن	۴۳
سترون سازی (استریلیزاسیون)	۴۴
روشهای ضد عفونی کردن و سایل کار	۴۴

فهرست مطالب

عنوان		شماره صفحه
استفاده از اتو کلاو	۴۵	
استفاده از فور.	۴۵	
فلامبه کردن	۴۵	
طح بالا (H.L.D)	۴۵	
HLD به وسیل جوشاندن	۴۵	
توصیه هایی درمورد جوشاندن	۴۷	
شستشوی دست ها	۴۷	
استفاده از دستکش استریل	۴۹	
استفاده از ماسک	۵۳	
بخش چهارم : پانسمان، باندپیچی و اصول انجام آن		
اصول مراقبت از زخمهای	۵۶	
تقسیم بندی زخمهای	۵۶	
اشکال زخمهای	۵۶	
انواع زخمهای ازنظررنگ.	۵۸	
عوارض زخمهای	۵۸	
چگونه بدن نسبت به جراحت واکنش نشان می دهد.	۵۹	
پانسمان زخم	۶۰	
وسایل پانسمان.	۶۰	
آماده کردن بسته های استریل	۶۱	
باز کردن بسته های استریل.	۶۳	
پنس حمل و نقل (اسباب گیر) استریل.	۶۵	
پانسمان زخمهای تمیز.	۶۸	
پانسمان و بانداز فشاری	۷۱	
باندپیچی و اصول انجام آن	۷۵	

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
اهداف باندپیچی	۷۶
انواع باندار	۷۸
بخش پنجم : تزریقات و انواع آن	
تزریقات	۹۱
وسایل مورد نیاز برای تزریق	۹۱
تزریق عضلانی	۹۳
تزریق زیرپوستی (زیرجلدی)	۹۵
تزریق داخل پوستی (داخل جلدی)	۹۶
روش کار در تزریقات عضلانی، زیرجلدی، داخل جلدی	۱۰۰
ایمنی تزریقات	۱۰۳
بخش ششم : خونریزی و انواع آن	
مقدمه	۱۰۸
اعمال مهم خون	۱۰۸
اثرات خونریزی بربدن	۱۰۸
خونریزی خارجی	۱۰۹
عوارض و نشانه های ناشی از خونریزی	۱۰۹
راههای جلوگیری از خونریزی	۱۱۰
خونریزی ناشی از فرو رفتن جسم خارجی	۱۱۲
آسیب دیدگی قفسه سینه ناشی از فرو رفتن جسم خارجی	۱۱۳
وجود جسم خارجی در چشم	۱۱۵
خونریزی داخلی	۱۱۵
وضعیت بهبود بخش	۱۱۷
شكل های خاص خونریزی	۱۱۹

فهرست مطالب

عنوان		شماره صفحه
جراحت فرق سر.	۱۱۹.....	
خونریزی از گوش	۱۲۱.....	
جراحت ها و خونریزی ناحیه دهان	۱۲۵.....	
خونریزی ازینی	۱۲۳.....	
زخم های چشم	۱۲۴.....	
زخم های شکمی	۱۲۵.....	
بخش هفتم : احیای قلبی ریوی واکسیژن درمانی		
مقدمه	۱۲۸.....	
علی که باعث اختلال کاردستگاه تنفس و قلب می شوند.	۱۲۸.....	
تعاریف	۱۲۸.....	
احیای قلبی ریوی در بزرگسالان ۸ سال به بالا.	۱۲۹.....	
مراحل احیای قلبی شاهد در بزرگسالان (۸ سال به بالا).	۱۲۹.....	
مراحل احیای قلبی - ریوی	۱۳۴.....	
احیای قلبی ریوی (غیر شاهد) در بزرگسالان ۸ سال به بالا.	۱۳۹.....	
احیای قلبی - ریوی برای کودکان (۱ تا ۸ سال)	۱۴۱.....	
احیای قلبی - ریوی در شیرخواران (زیر یک سال)	۱۴۵.....	
آسیب سر، گردن، ستون فقرات	۱۴۹.....	
مانور باز کردن فک با فشار	۱۴۹.....	
وضعیت بهبود بخش	۱۵۰.....	
علائم تجدید حیات	۱۵۱.....	
انواع روش های تنفس مصنوعی	۱۵۱.....	
آکسیژن درمانی	۱۵۱.....	
انواع روش های دادن آکسیژن	۱۵۲.....	

فهرست مطالب

عنوان	شماره صفحه
طریقه استفاده از دستگاه اکسیژن	۱۵۳
بخش هشتم : اختلالات گردش خون (صرع، بیهوشی، شوک)	
تشنج	۱۵۷
صرع	۱۶۰
اقدامات لازم در برخورد با بیمار صرعی	۱۵۸
تعريف بیهوشی	۱۶۰
درجات مختلف بیهوشی	۱۶۰
شوک	۱۶۲
انواع شوک	۱۶۲
علائم و نشانه های شوک	۱۶۳
اصول کلی درمان شوک	۱۶۴
سکته مغزی	۱۶۵
عوارض و نشانه ها	۱۶۶
اقدامات درمانی اولیه	۱۶۷
بخش نهم : خفگی	
خفگی (CHOKING)	۱۶۹
اقدامات اولیه در خفگی با جسم خارجی در بالغین	۱۷۰
قدامات اولیه در خفگی با جسم خارجی در مصدوم بیهوش	۱۷۷
قدامات اولیه در خفگی با جسم خارجی در کودکان ۱ تا ۸ سال	۱۷۲
اقدامات اولیه در خفگی با جسم خارجی در شیرخواران زیر یک سال	۱۷۳
اقدامات اولیه در خفگی با جسم خارجی در افراد باردار و چاق	۱۷۴
مسدود شدن راه تنفس در اثر کمبود هوا	۱۷۹

فهرست مطالب

عنوان.....	عنوان
شماره صفحه.....	
۱۷۵.....	تشخیص علائم اختناق راههای هوایی.....
۱۷۷.....	غرق شدگی در آب.....
۱۷۹.....	خفگی بر اثر مسمومیت با گازها
۱۸۰.....	خفگی بر اثر برق گرفتگی
بخش دهم: شکستگی ها، درفتگی ها، آسیب های عضلانی مفصلی.....	بخش دهم: شکستگی ها، درفتگی ها، آسیب های عضلانی مفصلی
۱۸۵.....	شکستگی.....
۱۸۵.....	تعريف شکستگی.....
۱۸۵.....	أنواع شکستگی.....
۱۸۴.....	شکستگی باز.....
۱۸۴.....	شکستگی بسته.....
۱۸۵.....	درفتگی ها.....
۱۸۷.....	عوارض مخاطره آمیز درفتگی ها و شکستگی ها.....
۱۸۷.....	اصول انجام کمک های اولیه در شکستگی ها و درفتگی ها.....
۱۸۷.....	شکستگی ستون فقرات.....
۱۸۹.....	شکستگی دندنه ها و قفسه سینه
۱۹۱.....	شکستگی ترقوه
۱۹۲.....	درفتگی شانه
۱۹۲.....	شکستگی بازو
۱۹۴.....	شکستگی های اطراف آرنج.....
۱۹۴.....	آسیب های ساعد و مج دست
۱۹۵.....	شکستگی های اندام تحتانی
۱۹۵.....	شکستگی ران و ساق.....
۱۹۶.....	شکستگی کاسه زانو.....

فهرست مطالب

عنوان	شماره صفحه
شکستگی لگن خاصره	۱۹۹
شکستگی جمجمه	۲۰۰
گرفتگی ماهیچه	۲۰۲
کوفتگی	۲۰۳
پیچ خوردهگی	۲۰۳
اثرات درمانی موضعی گرما	۲۰۶
استفاده از کیف آب گرم	۲۰۶
استفاده از کیف آب سرد	۲۰۷
کمپرس سرد	۲۰۸
کمپرس گرم	۲۰۸
..... بخش یازدهم : سوختگی ها	
تعريف سوختگی	۲۱۰
عارض سوختگی ها	۲۱۰
عوامل تعیین کننده اهمیت سوختگی	۲۱۰
درجه سوختگی	۲۱۱
وسعت سوختگی	۲۱۲
محل سوختگی	۲۱۲
بیماری های همراه یا عوامل زمینه ای	۲۱۳
کمک های اولیه در سوختگی ها	۲۱۳
سوختگی های شیمیایی	۲۱۴
سوختگی چشم با مواد شیمیایی	۲۱۴
سوختگی تابشی	۲۱۶
جدول کمک های اولیه در انواع سوختگی	۲۱۷
تقسیم بندی سوختگی در بزرگسالان	۲۱۷

فهرست مطالب

عنوان.....	شماره صفحه
تقسیم بندی سوختگی در کودکان و نوزادان.....	۲۱۸
بخش دوازدهم : اثرات تغییرات بیش از حد دما بر روی فعالیت های بدنی	
تغییرات شدید دما.....	۲۲۰
حمله گرمایی(heat stroke).....	۲۲۱
فرسودگی ناشی از گرما(heat exhaustion).....	۲۲۳
افت درجه حرارت مرکزی بدن (hypothermia).....	۲۲۴
سرمازدگی در سالمندان.....	۲۲۵
یخ زدگی(frost bite).....	۲۲۷
بخش سیزدهم مسمومیت ها، گزیدگی ها	
خصوصیات ماده سمی.....	۲۳۱
انواع مسمومیت ها.....	۲۳۱
درمان عمومی در مسمومیت ها.....	۲۳۲
مار گزیدگی.....	۲۳۴
عقرب گزیدگی.....	۲۳۷
پیشگیری از عقرب گزیدگی.....	۲۳۸
زنبور گزیدگی.....	۲۳۹
گزش عنکبوت و رطیل.....	۲۳۹
مسمومیت با مواد مخدر.....	۲۴۰
مسمومیت با مواد اسیدی و قلیایی.....	۲۴۱
مسمومیت با نفت و ترکیبات آن.....	۲۴۲
مسمومیت با دارو.....	۲۴۳

فهرست مطالب

عنوان	شماره صفحه
بخش چهاردهم : انواع روش‌های حمل مصدوم	
طريقه صحیح حمل بیمار و یا مصدوم و نحوه انتقال او به مرکز درمانی و بیمارستان ۲۴۷	۲۴۷
انواع حمل‌ها ۲۴۷	۲۴۷
حمل‌های یک نفره ۲۴۸	۲۴۸
حمل‌های دونفره ۲۴۹	۲۴۹
حمل‌های سه نفره و بیشتر ۲۵۱	۲۵۱
حمل با برانکارد ۲۵۲	۲۵۲
طرز تهیه برانکارد ۲۵۳	۲۵۳
بخش پانزدهم : تصادفات جاده‌ای	
تصادفات جاده‌ای ۲۵۵	۲۵۵
روش کار در سوانح عمد ۲۵۶	۲۵۶
حرکت دادن مصدوم ۲۵۸	۲۵۸
سوانحی که در آنها مواد خطر آفرین در کار است ۲۵۹	۲۵۹
كمکهای اولیه در مصدوم غیر هوشیار ۲۶۰	۲۶۰
صدمات سر ۲۶۱	۲۶۱
منابع فارسی ۲۶۴	۲۶۴

بخش اول مقدمات کمک های اولیه

اهداف آموزشی

انتظار است پس از یادگیری محتوای این مبحث فراغیر بتواند:

- ۱- کمک های اولیه و اهداف آن را توضیح دهد.
- ۲- خصوصیات یک کمک کننده را لیست کند.
- ۳- نحوه برخورد با مصدوم را شرح دهد.
- ۴- اهمیت مکتوب سازی و نکات ضروری در ارجاع بیمار را شرح دهد.

تعريف کمک‌های اولیه

به اقدامات اولیه‌ای که بلافضله پس از بروز حادثه و قبل از رسیدن به مرکز درمانی برای مصدوم انجام می‌شود و سبب کاهش چشمگیر مرگ و میر، پیشگیری از عوارض، تخفیف بیماری و آسیب‌های بعدی مصدوم می‌گردد کمک‌های اولیه گفته می‌شود.

اهداف کمک‌های اولیه

- نجات و زنده نگه داشتن شخص مصدوم یا بیمار
- جلوگیری از شدت یافتن عارضه یا بیماری
- کمک به بهبود حال بیمار تا رسیدن به مرکز درمانی و یا رسیدن پزشک
- کاهش و تسکین درد

تفاوت ارائه خدمات کمک‌های اولیه با ارائه خدمات درمانی :

کمک‌های اولیه : شامل اقداماتی است که در محل وقوع حادثه و با هدف حفظ جان بیمار و کاهش عوارض درد و رنج مصدوم تا زمان رسیدن به مرکز بهداشتی درمانی انجام می‌گیرد.

درمان : اقدامات پیشرفت‌هایی است که با هدف تشخیص و رفع مشکل بیمار انجام می‌گیرد و طی آن معمولاً اقدامات درمانی مانند تجویز دارو صورت می‌گیرد.

صفات و خصوصیات کمک دهنده

فرد کمک‌دهنده جهت ارائه بهتر کمک‌های اولیه به بیماران و مصدومین باید ویژگی‌هایی داشته باشد که عبارتند از:

- حفظ خونسردی و تسلط بر خویشتن در برخورد با هرگونه مصدوم یا بیمار
- داشتن اطلاعات کافی و مهارت‌های لازم جهت انجام کمک‌های اولیه و اولویت‌بندی آن‌ها

- داشتن سرعت عمل در تشخیص و انجام اقدامات لازم برای مصدوم که این امر برای رسیدگی به عوامل تهدیدکننده زندگی بسیار با اهمیت است.
- داشتن خلاقیت، ابتکار عمل و حداکثر استفاده از امکانات موجود
- تسلي بخشیدن به مصدومین و حمایت روحی و روانی آنها و برخورداری از روحیهای بالا که به بیمار و اطرافیان نیز امیدواری دهد.
- رعایت فرهنگ غالب منطقه و پای بندی به تعالیم مذهبی و ارزش‌ها
- شناخت محدوده فعالیت خود و پرهیز از اقداماتی که در حیطه وظایف بهورز نیست.
- برخورد مناسب و احترام به بیمار یا مصدوم، داشتن حسن سلوک و توانایی ایجاد رابطه عاطفی مناسب با بیمار، صداقت در کار و جلب اعتماد بیمار یا مصدوم
- رازداری
- داشتن ظاهری آراسته

توجه: قانون کمک های اولیه این است که صدمه بیشتر به مصدوم وارد نکنیم.
برای عمل به این قانون نیاز به آشنایی با روش های صحیح کمک های اولیه
است و هیچ جایگزینی برای آموزش مهارتی کمک های اولیه نیست .

در کمک های اولیه دو اصل زیر را باید همواره در نظر داشت :

۱- ارزیابی صحنه حادثه ۲- گرفتن شرح حال کامل

*** ارزیابی صحنه حادثه :** اولین وظیفه شما به عنوان امدا دگر درهنگام ورود به محل

حادثه ، ارزیابی صحنه حادثه به شرح ذیل است :

۱- خونسردی خود را حفظ کنید.

۲- خود را به مصدوم و حاضران نزدیک کرده با رفتار و برخورد مناسب و حفظ خونسردی کامل با دقت و سرعت عمل زیاد کار کمک رسانی را آغاز کنید.

۳- به منظور کمک رسانی از مصدوم و حاضران در صحنه زمان و چگونگی وقوع حادثه ، نوع صدمه و شدت آن ، تعداد مصدومان و خطرات در محل را جویا شوید.

۴- اصول ایمنی در مورد عدم تماس با خون و ترشحات بدن مصدوم را در نظر داشته و اجرا کنید.

۵- به یاد داشته باشید که حفظ سلامت خود شما از مهمترین وظایف است .

۶- مصدوم را معاینه کرده و وضعیت اورا ارزیابی نماید.

تریاژ :

امروزه بحث تریاژ (یعنی دسته بندی و کلاسه کردن بیماران پذیرش شونده به گروه های مختلف) نیز مطرح است . در تریاژ بیماران براساس و خامت حال بالینی یا شدت درد به گروه های چندگانه تقسیم شده و اولویت بندی می شوند اینکارزمانی انجام می گیرد که تعداد بیماران و مصدومین زیاد باشد و این دسته بندی به شرح ذیل است :

۱- بیمارانی که وضعیت آنها وخیم و بیمار روبه مرگ است .

۲- بیماران با حال وخیم که طول کشیدن دخالت های پزشکی برایشان خطر مرگ بدنیال دارد و با برچسب قرمز مشخص می شود.

۳- بیماران با وضعیت نسبتاً وخیم که بنا به شرایط می توانند در حالت انتظار قرار گیرند و با برچسب زرد مشخص می شود.

۴- بیماران با وضعیت قابل تحمل که نیاز به درمان فوری ندارند اما باید زیر درمان اورژانسی قرار گیرند و با برچسب سبز مشخص می شود.

۵- بیمار فوت شده که قابل احیاء نبوده و باید به سرداخانه منتقل شود و با برچسب مشکی مشخص می شود.

۶- اگر مصدوم آلودگی شیمیایی و میکروبی و..... داشته باشد برچسب آبی نیز به او اضافه می شود.

لذا درهنگام مراجعه مصدومین امداد گر باید سریع عمل کرده و بیماران را با توجه به وضعیت آنها دسته بندی و اولویت بندی کند و اقدام لازم را برای مصدومین انجام دهد.

** گرفتن شرح حال: شرح حال درواقع نحوه وقوع حادثه یا بیماری است.

برای گرفتن شرح حال از مصدوم و اطرافیان او (که شاهد خدثه بوده اند) اقدامات

ذیل را انجام دهید:

الف) سؤالاتی مانند سؤالات ذیل پرسیده شود:

۱- آخرین باری که مصدوم چیزی خورده است کی بوده است ؟

۲- آیا مصدوم سابقه بیماری خاص ، آرژی و یا مصرف دارو دارد ؟

۳- حادثه درچه شرایطی رخ داده است ؟ (در اتاق گرم یا سرد - درعرض باد یا باران)

۴- زمان وقوع حادثه کی بوده است ؟

۵- اگر مصدوم هوشیار است چه شکایتی دارد؟ (درجه ناحیه ای دچار درد است).

توجه: اگر مصدوم قادر به همکاری نیست یا بی هوش است به شواهد موجود در صحنه حادثه توجه کنید. (مانند دارو ، سمه و)

ب) علائم و نشانه های که درهنگام معاینه باید مورد توجه قرار گرفته و یادداشت شوند بدین شرح است:

۱- Sign : آنچه مصدوم می گوید (درد ، اضطراب ، احساس گرما و سرما ، تشنجی ، تهوع و)

۲- Symptom : آنچه درموقع معاینه مشاهده می شود. (تعزیق ، سوختگی ، شکستگی ، خونریزی ، کبودی و)

۳- آنچه در لمس مشاهده می شود. (درجه حرارت طبیعی بدن ، تورم و)

۴- تنفس غیرطبیعی ، ناله و که به گوش می رسد.

۵- بوی الكل ، گاز ، بخار ، ادرار، مدفوع و مواد مخدر (که به مشام معاینه کننده می رسد).

معاینه مصدوم

۱- معاینه اولیه مصدوم : هدف از این مرحله پی بردن به صدمات تهدید کننده حیات مانند عدم هوشیاری ، خونریزی شدید ، زخم باز و بزرگ قفسه سینه و است . این صدمات به حدی خطیرناک است که می تواند به سرعت سبب مرگ مصدوم شوند. لذا این کار باید به سرعت زیاد انجام گیرد و درصورت مشاهده علائم فوق بلا فاصله باید به انجام کمک های اولیه به شرح ذیل اقدام نمود:

- تعیین سطح هوشیاری (آیا مصدوم صحبت می کند؟ به سؤالات پاسخ می دهد؟ درصورت فشردن خودکار بین دو انگشت اشاره و میانی و یا بستر ناخن عکس العمل نشان می دهد؟ بی هوش است؟ و)

- بررسی و کنترل علائم حیاتی (راه هوایی ، تنفس ، نیص ، فشارخون و....)

- درصورت لزوم انجام عملیات احیاء (درفصل بعد شرح داده خواهد شد).

توجه: درصورتی که با بیش از یک مصدوم مواجه هستید ، اولویت مصدومین از نظر کمک های اولیه و انتقال به مرکز بهداشتی درمانی را تعیین نموده و سپس اقدام نمائید.

۲- معاینه مرحله دوم مصدوم : در این مرحله باید مصدوم را به سرعت ، ولی با دقت بیشتری از فرق سرتا نوک پا معاینه کنید. هدف از انجام این کار پی بردن به صدماتی است که تهدیدی برای حیات مصدوم به شمار می روند ولی شدت آنها کمتر است ، یا

در مرحله اول متوجه آنها نشده اید واز دید شما پنهان مانده است . (مانند خونریزی از نقاط پنهان بدن مثل کشاله ران و)

توجه: آگاهی از وضعیت مصدوم قبل از بروز سانحه و همچنین چگونگی ، شدت و زمان وقوع سانحه به شما کمک می کند تا مراقبت های لازم را از مصدوم با دقت و سرعت بیشتری انجام دهید . بنابراین گرفتن شرح حال دقیق قبل از انجام معاینات مصدوم بسیار کمک کننده است .

اقداماتی که در موارد پر خطر باید انجام داد:

- ۱- نحوه برخورد باید سریع همراه با آرامش باشد.
- ۲- جهت درک موقعیت، باید بررسی دقیقی از وضعیت سانحه انجام داد و در مورد اولویت کارها تصمیم گرفت.
- ۳- رعایت موارد ایمنی به این منظور که خود، مصدوم و سایرین را به خطر نیندازید.
- ۴- کمک خواستن از دیگران که بعضی از حاضرین می توانند مفید واقع شوند و در درمان مصدومین (مثلًا در جلوگیری از خونریزی) کمک نمایند.
- ۵- تعیین اولویت های درمانی:
 - الف- بلافاصله آزمایش کرد که آیا راه تنفس مصدوم باز است و مصدوم نفس می کشد و یا خیر، اگر نفس نمی کشید فورا تنفس مصنوعی را شروع کنید.
 - ب- بیهوشی: علائم حیاتی مصدوم بیهوش را بررسی و راههای تنفسی او را باز نمایید
 - ج- خونریزی: مصدوم را از نظر خونریزی کنترل نمایید و در صورت وجود، سعی کنید جلوی آن را بگیرید.
- ۶- معاینه: مصدوم چه بیهوش باشد چه نباشد، باید یک معاینه کلی از او به عمل آورد. تا آنجا که می توانید مصدوم را کمتر حرکت دهید. معاینه را از سر او شروع کرده و به طور منظم تا پاهای او ادامه دهید، در هنگام معاینه بررسی پوست صورت از نظر رنگ پریدگی، کبودی، تعریق، بررسی چشمها، دهان و بینی از نظر وجود خونریزی و یا

کبودی،ستون فقرات گردنی و پشتی از نظر احتمال ضربه و تغییر شکل،حرکات قفسه سینه،تعداد و عمق تنفس،و بررسی اندامها از نظر احتمال شکستگی،کبودی و خونریزی ضرورت دارد.

۷-تشخیص صحیح:برای اینکه در مورد اولویت‌ها بتوانید تصمیم بگیرید باید تشخیص کامل داشته باشید و می‌بایست روی این موارد جهت تشخیص تاکید نمایید(چگونگی وقوع حادثه،وضع محروم،نشانه‌ها و سطح هوشیاری)

۸-درمان و مراقبت: بنا به وسعت عارضه و جراحات،اقدامات لازم را انجام دهید.(به عنوان مثال در مواردی مانند شکستگی،اولین گام،ثبت کردن محل شکسته می‌باشد.)

نکاتی که پس از انجام اقدامات اولیه در فرم ارجاع باید ثبت شود

هنگامی که انجام اقدامات و مراقبت‌های لازم (در خانه بهداشت یا در محل حادثه) پایان یافت. مشاهدات کمک دهنده به عنوان اولین فرد مطلع از وضعیت اولیه مصدوم و تغییرات علائم حیاتی پس از انجام اقدامات اولیه بسیار حائز اهمیت است. این مشاهدات به پزشک و پرسنل درمانی امکان می‌دهد که بتوانند وضعیت بیمار یا مصدوم را بهتر و سریع‌تر در جهت بهبودی هدایت کنند. اطلاعات ثبت شده در فرم ارجاع باید شفاف، خلاصه،مشخص و شامل موارد زیر است:

- ۱-شرایط اولیه بیمار در مراجعه به خانه بهداشت یا در محل حادثه
- ۲-تشریح بیماری،آسیب‌ها و علائم موردمشاهده توسط بهورز
- ۳-علائم حیاتی هنگام مراجعه به خانه بهداشت یا در محل حادثه
- ۴-درمان و کمک‌های اولیه ارائه شده
- ۵-هر گونه توضیح دیگری بر حسب نیاز.
- ۶-ارسال نمونه لازم با توجه به نوع بیماری یا مسمومیت و.... .

کیف کمک های اولیه خانگی و وسائل آن

داشتن وسائل مناسب برای استفاده در موارد اورژانسی (در منازل) بسیار کمک کننده خواهد بود و می توان به مراجعین برای تهیه و نگهداری آن توصیه نمود. آنها می توانند این وسائل را در یک کیف کمک های اولیه یا در جعبه ای بدون منفذ (کوچک قابل حمل) در جای خشک نگهداری کنند. باید توصیه کرد که این کیف باید در یک وضعیت اورژانس به آسانی در دسترس باشد اما از دسترس اطفال دور نگهداشته شود و بطور مرتب محتویات آن (از نظر تاریخ مصرف و موجود بودن) کنترل شود.

وسائل کیف کمک های اولیه به شرح ذیل می باشند:

- سنجاق محافظ
- باند لوله ای
- گاز پاسیمان
- کیف آبرسید
- دستکش یکبار مصرف
- کیف آبگرم
- کرم ضد حساسیت (مثل کالامین دی، پماد اکسید دوزنگ)
- محلول ضد عفونی کننده (مثل بتادین)
- چسب زخم

تمرین نظری

- ۱- منظور از کمک های اولیه و اهداف آن چیست؟
- ۲- چه اقداماتی در هنگام مواجه شدن با حوادث و مصدومین باید انجام گیرد؟
- ۳- چه معایناتی از مصدومین باید به عمل آید؟
- ۴- محتویات کمک های اولیه چیست؟

تمرین عملی

- ۱- با هدایت مربی و همکاری سایر فراغیران گرفتن شرح حال از مصدوم را تمرین کیند.
- ۲- با هدایت مربی و همکاری سایر فراغیران انجام معاینات از مصدوم را تمرین کنید.

بخش دوم

کنترل علایم حیاتی

اهداف آموزشی

انتظار است پس از یادگیری محتوای این مبحث فرآگیر بتواند:

- ۱- وضعیت طبیعی علایم حیاتی را شرح دهد.
- ۲- سطوح مختلف هوشیاری و نحوه ارزیابی آن را توضیح دهد.
- ۳- علایم حیاتی را در حداقل زمان ممکن بخوبی کنترل نماید.
- ۴- اقدام اولیه مناسب را در موارد غیر طبیعی بودن هر کدام از علائم حیاتی انجام دهد.
- ۵- عوامل مؤثر بر تغییرات هر کدام از علایم حیاتی را فهرست نماید.
- ۶- نحوه معاینات سروگردان را شرح دهد.

علائم حیاتی

علائم حیاتی عبارت از علائمی هستند که ما را از نحوه کارکرد دستگاه های بدن (دستگاه عصبی ، تنفسی و گردش خون) آگاه می سازد. این علائم عبارتند از: تنفس، نبض، فشار خون، درجه حرارت ، سطح هوشیاری ، مردمک چشم ، رنگ پوست که پیدایش هر گونه تغییر در علائم حیاتی دلیل پیدایش اختلال در وضع طبیعی بدن است به همین جهت کمکدهنده باید کلیه علائم حیاتی مصدوم یا بیمار را بتواند بررسی نموده و مرتبا زیر نظر و تحت کنترل داشته باشد.

تعريف تنفس

به تبادل هوا بین حبایچه های ریوی و محیط خارج بوسیله حرکات منظم قفسه سینه که شامل دو مرحله دم و بازدم است که در مرحله دم هوا اکسیژن دار وارد ریه ها شده و در مرحله بازدم دی اکسید کربن خارج می شود تنفس گویند.

بررسی تنفس

در بررسی تنفس باید به نظم حرکات تنفس، عمق تنفس و تعداد آن توجه نمود. در حال سلامت عمل تنفس بدون صدا و درد انجام می گیرد و چون با متابولیسم بدن ارتباط دارد در سنین مختلف متفاوت است تعداد تنفس در حالت طبیعی در نوزادان ۴۰-۳۰ بار در دقیقه، در کودکان ۲-۱ ساله ۳۰-۲۰ بار در دقیقه، در ۵ تا ۵ سالگی ۲۳ بار در دقیقه است و در بالغین و بزرگسالان ۱۶-۲۰ بار در دقیقه طبیعی است.

عوامل موثر بر تعداد تنفس

سن، درد، سیگار کشیدن، وضعیت بدن، داروها، ضایعات مغزی، تب، فعالیت، استراحت، تغییر دمای محیط، بیماری های ریوی، فشار هوا و.....

برای شمارش تعداد تنفس از ساعت ثانیه شماردار استفاده می‌کنیم. هر بار بالا و پائین رفتن قفسه سینه یک تنفس محسوب می‌شود.

تعريف نبض

نبض عبارت است از لمس موج خون در سرخرگ‌ها، در محلهایی که سرخرگ از روی استخوان یا عضله و زیر پوست می‌گذرد می‌توان نبض را لمس کرد. در بررسی نبض نیز منظم بودن نبض، قوی یا ضعیف بودن و تعداد آن باید مورد توجه قرار گیرد.

نبض را با استفاده از سه انگشت میانی لمس می‌کنیم و از لمس نبض توسط انگشت شست باشد اجتناب کرد زیرا خود شست نبض قابل لمس دارد. تعداد طبیعی نبض در سنین مختلف متفاوت است. در نوزادان ۱۰۰-۱۲۰ بار در دقیقه - در کودکان ۱۱۰-۱۰۰ بار در دقیقه - در کودکان ۲ تا ۵ سال حدود ۶۰-۸۰ بار در دقیقه در افراد بالغ و بزرگسال ۱۰۰ بار در دقیقه طبیعی است.

محل‌هایی که نبض را می‌توان لمس نمود

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ۱- مج دست | ۲- آرنج |
| ۴- گردنی | ۳- گیجگاهی |
| ۵- زیر ترقوه‌ای | ۶- زیر بغل |
| ۸- زندزیرین | ۷- بازویی |
| ۹- رانی | ۱۰- پشت زانو |
| | ۱۱- پشت پاوه... |

محل‌هایی که در موقع اورژانس جهت بررسی نبض مورد استفاده قرار می‌گیرد عبارتند از:



- ۱- کاروتید یا گردنی
- ۲- برآکیال یا بازویی
- ۳- فمورال یا رانی
- ۴- رادیال یا مج دست

نبض کاروتید:


در حد فاصل بین سیب آدم و عضله جناغی چنبری پستانی در هر دو طرف گردن لمس می‌شود.

نبض فمورال:

در ناحیه کشاله ران احساس می‌شود.

نبض برآکیال:

در قسمت داخلی استخوان بازو قابل لمس است در شیرخواران ترجیحاً از این محل برای بررسی نبض استفاده می‌شود.



نبض رادیال:

در انتهای استخوان زند زیرین در مج دست در امتداد شست قابل بررسی است.

عوامل مؤثر بر تعداد نبض

سن، فعالیت، عملکرد قلب، تب، جنس، وضعیت بدن، حالات عاطفی و

فشار خون

فشارخون عبارت است از نیرویی که در اثر رانش خون در طول شریان‌ها و فشاری که جدار شریان‌ها بر خون وارد می‌کند. نیرویی که در یک دوره ضربان قلب بوجود می‌آید یکسان نیست و از مقادیر زیاد تا مقادیر کم متغیر است این تغییر سبب ایجاد نبض می‌گردد.

گوشی پزشکی

گوشی پزشکی از قسمت‌های زیر تشکیل شده است:

۱- دیافراگم

۲- لوله رابط

۳- قسمت گوشی که در ابتدای مجرای گوش خارجی قرار می‌گیرد.

طریقه اندازه‌گیری فشارخون

فشارخون را می‌توان به دو روش لمسی و سمعی اندازه‌گیری نمود. در روش لمسی فقط میزان فشار خون ماکزیمم را می‌توان اندازه‌گیری کرد. ولی در روش سمعی میزان



فشارخون ماکزیمم و مینیمم به طریقه زیر اندازه می‌گیریم، به این ترتیب که بازو بند را حدود ۲/۵ سانتیمتر بالاتر از چین آرنج به بازوی بیمار می‌بندیم، نبض را در چین آرنج پیدا کرده و گوشی را روی آن قرار می‌دهیم. با بستن پیچ تنظیم به وسیله پمپ لاستیکی هوا را درون کیسه بازو بند وارد می‌کنیم به حدی که سرخرگ بازویی تحت فشار قرار گرفته و جریان خون متوقف شود.

سپس پیچ تخلیه را به آرامی باز می‌کنیم تا از میزان فشار هوای وارد بر سرخرگ توسط بازو بند کاسته شود با عبور اولین موج نبض از شریان زیر گوشی صدایی در گوشی ایجاد می‌شود.

در این زمان میزان فشاری را که عقریه فشارسنج نشان می‌دهد می‌خوانیم. این همان حداکثر فشار یا فشار سیستولی است. در ادامه کار به صدای گوشی توجه نموده و هم چنان پیچ تخلیه باز است و به آرامی از میزان فشار بازو بند کاسته می‌شود و رفته رفته

شريان بازوبي که تحت فشار قرار گرفته به حالت اوليه باز می‌گردد که در اين هنگام صدا قطع خواهد شد. مجددا ميزان فشاری را که عقریه فشارسنج در زمان قطع صدا نشان می‌دهد می‌خوانیم اين فشار حداقل فشار يا فشار دیاستولی نام دارد.

فشار سیستول یا ماکزیمم

حداکثر فشاری را که در زمان انقباض بطن چپ توسط خون بر دیواره رگها وارد می‌شود فشار سیستول گویند.

فشار دیاستول یا مینیمم

حداقل فشاری که همیشه رگهای بدن با آن مواجه هستند فشار دیاستول گویند. یعنی زمانی که بطن چپ در حال استراحت است یا جهت خون‌گیری مجدد منبسط می‌شود نیز اين ميزان فشار بر رگها وارد می‌شود. واحد اندازه‌گیری فشار خون میلی متر جیوه است. ميزان طبیعی فشار خون در سنین مختلف متفاوت و به شرح زیر است:


خردسالان ۷۰ روی ۵۰ تا ۹۰ روی ۵۰ میلی متر جیوه
کودکان ۸۰ روی ۶۰ تا ۱۰۰ روی ۶۰ میلی متر جیوه
افراد بالغ و بزرگسالان ۱۱۰ روی ۶۰ تا ۱۲۵ روی ۸۰ میلی متر جیوه

نکات قابل توجه در اندازه‌گیری فشار خون

عرض بازو بند باید متناسب با بازوی بیمار انتخاب شود (حدود دو سوم طول بازو) بازو بند باید روی بازوی بیمار بسته شود ولباس یا پوششی روی بازو وجود نداشته باشد. در صورتی که بیمار آستینش را بالا زده، بر بازوی بیمار فشار وارد نیاورد. وسط کیسه هوای داخل بازو بند روی شريان بازویی قرار گیرد. در هنگام اندازه‌گیری فشار خون بازوی بیمار و عقریه فشارسنج باید در محاذات قلب قرار داشته باشد.

قبل از اندازه‌گیری فشارخون بیمار اضطراب و استرس یا فعالیت نداشته باشد. در هنگام اندازه‌گیری فشار خون، بیمار باید نشسته یا خوابیده باشد. در افرادی که داروی کاهش دهنده فشار خون استفاده می‌کنند بهتر است فشار خون در حالت خوابیده و یا ایستاده اندازه‌گیری شود. بطور طبیعی بین فشارخون دست راست و چپ ۱۰ تا ۲۰ میلی متر جیوه اختلاف وجود دارد.

درجه حرارت



در اثر سوخت و ساز مواد غذایی، حرارت بطور مداوم و متناسب در بدن ایجاد می‌گردد و از طرق مختلفی حرارت از بدن خارج می‌شود. زمانی که حرارت تولید شده با حرارت دفع شده برابر باشد تعادل حرارتی برقرار می‌شود. درجه حرارت بدن از $\frac{36}{5}$ تا $\frac{37}{5}$ درجه سانتی گراد متفاوت است. تعادل درجه حرارت بدن، توسط مرکز تنظیم حرارت درمغز و در هیپوთالاموس صورت می‌گیرد.


برای اندازه‌گیری درجه حرارت بدن ازترموتر (حرارت سنج) استفاده می‌شود. از راههای مختلفی می‌توان درجه حرارت بدن را اندازه‌گیری نمود. زیرزبان، زیرغل

طریقه اندازه‌گیری درجه حرارت از راه زیر زبان




ابتدا جهت جلب همکاری بیمار روش کار را به بیمار توضیح دهید. سپس دستها را با آب و صابون شسته و خشک نمائید. وسایل کار شامل درجه حرارت دهانی تمیز، ظرف محتوی محلول پاک‌کننده، ظرف محتوی پنبه گلوله شده (سواب شده) خشک، ظرفی جهت پنبه‌های کثیف، ساعت ثانیه شماردار، سینی جهت چیدن وسایل را آماده نمایید.

بیمار را در وضعیت مناسب و راحتی قرار دهید. دماسنجد را از ظرف محلول ضد عفونی درآورده و آن را زیر جریان آب سرد بشویید و سپس از طرف مخزن جیوه به طرف انتهای با حرکت دورانی به وسیله پنبه خشک نمایید و پنبه را در ظرف مخصوص پنبه کشیف بیندازید. دماسنجد را بین انگشتان خود در حالی که مخزن جیوه به طرف



پائین باشد بگیرید و آن را با حرکت مج دست به شدت تکان دهید تا جیوه در ستون خود پائین آمده و زیر عدد ۳۵ قرار گیرد. در حالی که پشت به نور ایستاده‌اید، دماسنجد را به طور افقی هم سطح چشمان خود نگه دارید، سپس آن را بین انگشتان خود بچرخانید تا سطح جیوه را در زیر عدد ۳۵ درجه مشاهده نمائید.



از بیمار بخواهید دهانش را باز کند سپس به آرامی مخزن جیوه را از سمت راست یا چپ حفره دهان زیر زبان قرار دهید، از بیمار بخواهید تا دهان را طوری بیندد که دندان‌هایش روی دماسنجد فشار نیاورد بلکه لب‌ها روی هم

گذاشته شود و از باز کردن دهان در این فاصله خودداری کند. دماسنجد را به مدت ۳ تا ۵ دقیقه زیر زبان نگه دارید پس از آن دماسنجد را از دهان بیمار خارج نموده و آن را با استفاده از پنبه از طرف انتهای با حرکت دورانی خشک نمایید و پنبه را در ظرف مخصوص پنبه کشیف بیندازید. میزان درجه را مطابق آنچه در بالا، قبل از قراردادن در دهان بیمار گفته شد خوانده و یاد داشت کنید.

دماسنجد را با آب و صابون شسته و در محلول الکل ۷۰ درجه به مدت ده دقیقه قرار دهید. سپس شسته و خشک نگهداری شود.

طریقه اندازه‌گیری درجه حرارت بدن از راه زیر بغل

برای اندازه‌گیری درجه حرارت بدن از راه زیر بغل همانند روش دهانی عمل نمائید. بازوی بیمار را بالا برده و مخزن جیوه دماسنجد را در وسط گودی زیر بغل قرار

دهید. در صورتی که گودی زیر بغل بیمار عرق نموده قبل از قراردادن دماسنجه آن را با گاز یا پنبه خشک کنید، بازوی بیمار را پائین و به تنہ بچسبانید. دماسنجه را به مدت ۵ دقیقه زیر بغل بیمار نگه دارید. سپس درجه حرارت را برداشته و به روش ذکر شده در اندازه گیری درجه حرارت از طریق دهان خشک نمائید و بخوانید سپس در ظرف محتوی محلول پاک کننده قرار دهید. دماسنجه را با آب و صابون شسته و در محلول الكل ۷۰ درجه به مدت ۱۰ دقیقه قرار دهید سپس شسته و خشک نگهداری شود.

مواردی که نمی‌توان درجه حرارت بدن را از طریق زیر زبان یا زیر بغل اندازه گیری نمود:

در بیماران بیهوش یا کودکان و بیمارانی که از نظر روحی روانی دچار مشکل هستند یا بیمارانی که در دهانشان زخم یا عفونت وجود دارد یا قبل از آن، از راه دهان غذا یا مایعات گرم یا سرد میل نموده یا سیگار کشیده‌اند و همچنین بیمارانی دچار مشکل تنفسی هستند نمی‌توان از راه دهان درجه حرارت را اندازه گیری نمود. در بیمارانی که دچار عفونت یا زخم زیر بغل هستند نمی‌توان از راه زیر بغل، درجه حرارت را اندازه گیری نمود.

در مواردی که درجه حرارات بدن را نمی‌توان از راه زیر زیان یا زیر بغل اندازه گیری کرد و یا بیمار در حالت اغماء و بیهوشی است باید درجه حرارت بدن از راه مقعد به طریق زیر اندازه گیری شود:

توجه: بهورز مجاز به گرفتن درجه حرارت بدن نوزاد از راه مقعد نمی‌باشد.

۱- درجه حرارت باید تمیز و ضد عفونی شده باشد.

۲- مطمئن شوید که جیوه پایین تر از ۳۵ درجه قرار دارد.

۳- نوک درجه حرارت را با واژلین چرب کنید که به راحتی داخل مقعد شود.

۴- کودکان را روی شکم یا به پهلو خوابانده و نوک درجه حرارت را به آهستگی تقریباً به اندازه ۲ سانتی متر و در بزرگسالان حدود ۳-۴ سانتی منر به درون مقعد وارد کنید. درجه حرارت باید برای مدت ۱ تا ۲ دقیقه درون مقعد باشد.

۵- پس از بیرون آوردن درجه حرارت آن را به آهستگی و به سرعت از بالا به طرف مخزن جیوه با پنبه تمیز کرده و سپس اندازه درجه حرارت را روی صفحه مدرج خوانده و یادداشت نمایید.

۶- درجه حرارت را با آب و صابون شسته و در محلول ضد عفونی کننده قرار دهید.

۷- پس از ضد عفونی شدن درجه حرارت، آنرا از محلول خارج کرده و در محلی خشک و تمیز نگهداری نمایید.

سطح هوشیاری

اهمیت ویژه ای دارد و بیانگر نحوه عملکرد قسمت اصلی دستگاه عصبی یعنی مغز است . سطوح مختلف هوشیاری با توجه به چگونگی پاسخ فرد به محرک های محیطی ارزیابی می گردد. این سطوح عبارتند از : AVPU
Alert : (فرد کاملاً هوشیار)

به طور خود به خود صحبت می کند و بطور مثال با سروصدا توجه شما را به سمت خود جلب کرده و درخواست کمک می کند . یک فرد هوشیار می تواند خود و اطرافیان را شناسایی کند به علاوه می تواند تاریخ یا روز هفته و همچنین نام محل حادثه را به شما بگوید. به بیان دیگر یک فرد هوشیار به شخص ، زمان و مکان آگاهی دارد و به طور طبیعی به سؤالات و تقاضاهای شما پاسخ می دهد.

Verbal : (نیمه هوشیار ، حساس به محرک های شفاهی)

به علت کاهش سطح هوشیاری ، فرد به طور خود به خود واکنش ندارد و صحبت نمی کند . اما اگر او را صدا کنید برای مدتی چشمان خود را باز می کند و کوشش می کند تا به سؤالات شما پاسخ دهد . لذا باید درخواست خود را با فریاد بیان کنید تا پاسخی دریافت کنید.

Painful : (حساس به محرک های دردناک)

تنها در صورت اعمال محرک های دردناک (مثل فشار دادن لاله گوش یا قسمت خارجی بازو) عکس العمل نشان می دهد و محرک های خفیف تر مثل محرک های شفاهی را بدون پاسخ می گذارد.

Unresponsive : (بدون پاسخ یا بی هوش)

حتی نسبت به محرک های دردناک نیز بدون پاسخ هستندو نسبت به تکان دادن یا فریاد هم پاسخی نمی دهند.

توجه: شایعترین علت انسداد راه هوایی دریک فرد بی هوش زبان خود فرداست و این مساله می تواند باعث توقف تنفس و مرگ گردد بنابراین در صورت بی هوش بودن فرد لازم است تا با استفاده از روش های مناسب اقدام به باز کردن راه هوایی وی نمائید.

مردمک چشم

قطر، تقارن و واکنش مردمک چشم ها به نور نیز جزء علائم حیاتی است و به ویژه اطلاعات مفیدی را درباره نحوه عملکرد ستگاه عصبی مرکزی در اختیار ما قرار می دهد. عدم واکنش مردمک ها به نور، اندازه غیر طبیعی مردمک ها (مردمک های بسیار تنگ یا گشاد) یا عدم تقارن آنها می تواند نشانه بروز اشکال در نحوه عملکرد چشم یا دستگاه عصبی مرکزی باشد . از این بین می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

از دست دادن دید چشم در اثر ضایعات مختلف ، کوری مادرزادی ، اشکال در عملکرد عصب بینایی خونریزی یا سکته مغزی ، مسمومیت با مواد مخدر (مردمک های ته سوزنی) و اشاره کرد.

رنگ پوست

رنگ پوست مصودم علاوه بر بیان چگونگی خونرسانی پوست می تواند اطلاعاتی درباره عملکرد دستگاه گردش خون ، تنفس ، مصودم و همچنین برخی بیماری ها را در اختیار ما قرار دهد. (بطور مثال در موارد خونریزی یا کاهش مایعات بدن ، میزان

خونرسانی پوست کاهش می یابد و پوست رنگ پریده به نظرمی رسد ، بر عکس در موارد گرمایشی پوست فرد قرمز برا فروخته می شود . رنگ پوست مصدوم را با پوست خود مقایسه کنید و تغییرات آن را گزارش نمائید. البته به خاطر داشته باشد که رنگ پوست در نژادهای مختلف با هم تفاوت دارد .
رنگ پوست را می توان به صورت های زیر توصیف کرد :

- طبیعی : سفید، سرخ و زرد در نژادهای مختلف
- رنگ پریده (متمایل به سفید) ، می تواند بیانگر کاهش جریان خون پوست یا کم خونی باشد.
- برا فروخته : (متمایل به قرمز) ، رنگ پوست قرمز شده و می تواند نشانه افزایش جریان خون پوست باشد.
- کبود : (سیانوزیا متمایل به آبی) ، بیانگر کاهش اکسیژن خون است . این حالت می تواند نشانه کاهش خونرسانی عضو بطور موضعی اختلال در عملکرد دستگاه گردش خون مرکزی یا اختلال در عملکرد دستگاه تنفس باشد.
- زرد : ممکن است نشانه اشکال در کار کرد کبد و کیسه صفراء ، شکسته شدن غیرعادی و بیش از حد گلبلول های قرمز خون و باشد.

معایینات سروگردان

معایینه سر:

- در صورت لزوم دهان را باز و تمیز کنید و سپس در صورت نیاز با استفاده از روش های مناسب اقدام به باز کردن راه هوایی مصدوم بنمایید.
- سررا از نظر وجود زخم های باز و بسته ، خونریزی ، برجستگی یا فرورفتگی غیرعادی ، شکستگی جمجمه و صورت ، درد ، حساسیت و لمس و مورد توجه قرار دهید.

- مردمک ها را معاينه کنید و به تقارن ، اندازه و واکنش آنها نسبت به نور توجه کنید.

- بینی و گوش ها را از نظر وجود خدمات مختلف وجود یا عدم وجود خونریزی یا ترشخات بررسی کنید.

توجه : امکان خروج خون یا مایع مغزی نخاعی از گوش یا بینی به دنبال خدمات شدید سرو جمجمه وجود دارد.

معاینه گردن :

بدون حرکت دادن سرو گردن و با استفاده از دو دست خود قسمت های مختلف گردن را با ملایمت و دقق بطور کامل معاينه کنید در صورت امکان برای ثابت نگهداشتن سرو گردن مصدوم می توانید از فرد دیگری کمک بگیرید. دست خود را باحتیاط کامل و با ملایمت به زیر گردن مصدوم بلغزانید و این ناحیه را از نظر درد، تورم ، حساسیت به لمس ، خونریزی و مورد توجه قرار دهید. به باز بودن راه هوایی و همچنین وضعیت عروق گردانی توجه کنید.

معاینه قفسه سینه و شکم :

معاینه قفسه سینه از نظر وجود یا عدم وجود زخم بازیابسته ، خونریزی ، شکستگی دندنه ها و ترقوه ، تقارن حرکات تنفسی ، دردیا حساسیت به لمس ضرورت دارد. در معاینه شکم به وضعیت ظاهری شکم ، تورم ، زخم باز یا بسته ، خونریزی ، خروج احشاء از داخل شکم ، درد ، حساسیت به لمس و همچنین انقباض غیرعادی شکم باید توجه کرد.

معاینه لگن :

با توجه به نوع و شدت صدمه (در صورت لزوم) ناحیه لگن را بطور کامل و با دققت معاينه کنید و به وجود یا عدم وجود کبودی ، تورم ، زخم باز و بسته ، خونریزی ، درد و حساسیت به لمس باید توجه شود.

معاینه ستون مهره ها :

درصورت شک به صدمه ستون مهره ها به ویژه مهره های گردنی ، درابتدا باید سروگردن و ستون فقرات مصدوم را ثابت کرد. درحین ثابت کردن سروگردن و ستون فقرات باید از هرگونه حرکت غیرضروری مصدوم جلوگیری شود. (درصورت امکان می توان از فرد دیگری برای ثابت کردن گردن و ستون مهره ها کمک گرفت) . ستون مهره ها را از نظرتorm ، کبودی ، خونریزی ، درد ، حساسیت باید بررسی نمود.

توجه: درصورت شک به وجود صدمات سروگردن یا ستون مهره ها باید ابتدا ستون مهره ها و سروگردن مصدوم را ثابت کنید و سپس با احتیاط کامل و بدون حرکت دادن معاینات مصدوم را انجام دهید.

معاینه اندام فوقانی :

درمعاینه اندام فوقانی بایدشانه ها ، زیربغل ، بازوها ، ساعد، مج دست ها و انگشتان را از نظر وجود یا عدم وجود خونریزی ، زخم باز یا بسته ، شکستگی ، دررفتگی ، درد و حساسیت به لمس مورد توجه قرارداد . نیض ، رنگ ، حس و حرکت اندام فوقانی را باید ارزیابی کرد و درصورت وجود کمترین شک به وجود آسیب های اسکلتی مثل شکستگی یا دررفتگی حتماً عضو آسیب دیده را ثابت کرده و از جایجا کردن غیرضروری مصدوم پرهیز شود.

معاینه اندام تحتانی :

معاینه اندام تحتانی (کشاله ران ، ران ، زانو، ساق پا ، مج و کف انگشتان پا) بطور کامل از نظر وجود یا عدم وجود خونریزی ، زخم باز یا بسته ، شکستگی ، دررفتگی ، کبودی ، درد و حساسیت به لمس انجام می گیرد.

باید نبض، رنگ، حس و حرکت عضو صدمه دیده مورد توجه قرار گیرد و در صورت لزوم اقدام به ثابت نمودن عضوآسیب دیده شود. از هرگونه جایگایی غیر ضروری مصدوم نیز پرهیز شود.

توجه: به هنگام معاینه اندام فوقانی و تحتانی مقایسه عضو آسیب دیده با عضو مقابل بسیار کمک کننده است. بنابراین اندام فوقانی و تحتانی را باید همیشه به صورت قرینه و بطور همزمان مورد معاینه قرارداد. باید بخاطر داشت که معاینه مصدوم یک روند اصولی و علمی دارد که باید جزء به جزء و بطور منظم و دقیق اجرا گردد.

تمرین نظری

- ۱- منظور از علائم حیاتی چیست ؟
- ۲- در هنگام شمارش نبض، به چه خصوصیات آن توجه می کنیم؟
- ۳- عواملی که باعث افزایش درجه حرارت بدن می شوند کدامند؟
- ۴- عواملی که باعث کاهش درجه حرارت بدن می شوند کدامند؟
- ۵- تغییرات درجه حرارت بدن چه رابطه‌ای با تعداد نبض و تنفس دارد؟
- ۶- سطوح مختلف هوشیاری چیست ؟ ارزیابی آن چگونه انجام می گیرد؟
- ۷- عواملی که باعث کاهش و یا افزایش فشار خون می شوند کدامند؟
- ۸- مراحل ضد عفونی درجه حرارت چگونه است ؟

تمرین عملی

- ۱- با هدایت مربی و همکاری سایر فراغیران بطور عملی شمارش نبض در یک دقیقه را تمرین کنید.
- ۲- با هدایت مربی و همکاری سایر فراغیران بطور عملی شمارش تنفس در یک دقیقه را تمرین کنید.
- ۳- با هدایت مربی و همکاری سایر فراغیران بطور عملیاندازه گیری فشارخون را تمرین کنید.
- ۴- با هدایت مربی و همکاری سایر فراغیران بطور اندازه گیری درجه حرارت را تمرین کنید.
- ۵- با هدایت مربی و همکاری سایر فراغیران بطور عملی معاینات سرو گردن تمرین کنید.

بخش سوم اصول و راهکارهای کنترل عفونت در خانه بهداشت

اهداف آموزشی

انتظار است پس از یادگیری محتوای این مبحث فراگیر بتواند:

- ۱- عوامل مساعد کننده ایجاد عفونت را فهرست نماید.
- ۲- راهکارهای کاهش مخازن عفونت را بیان نماید.
- ۳- طریقه شیوه شیوه دستها را برای جلوگیری از انتشار آلودگی و ایجاد عفونت توضیح دهد.
- ۴- طریقه استفاده از ماسک و دستکش را برای جلوگیری از انتشار آلودگی و ایجاد عفونت توضیح دهد.

اصول و راهکارهای کنترل عفونت در خانه‌های بهداشت

مقدمه

سال‌هاست که کشف شده است میکروارگانیسم‌ها مسئول بروز عفونت هستند و زمانی از بروز عفونت پیشگیری می‌شود که آن‌ها از بین بروند و یا رشدشان متوقف شود. میکروارگانیسم‌ها همانطور که در محیط هستند در بدن انسان نیز می‌توانند رشد کنند و باعث بروز عفونت و علائم مربوط به آن شوند. بسیاری از آن‌ها غیر بیماری‌زا هستند ولی بعضی از آن‌ها برای سلامت انسان مضر هستند.

کنترل عفونت شامل اجرای سیاست‌ها و انجام فرایندهایی در بیمارستان و یا مرکز بهداشتی درمانی و خانه بهداشت است که از گسترش و انتقال عفونت به بیماران و افراد دیگر جلوگیری می‌کند.

کنترل عفونت بخش مهمی از فعالیت کارکنان بهداشتی درمانی در کلیه سطوح ارائه‌دهنده خدمت به شمار می‌رود. که در این رابطه آلودگی زدایی دارای نقش بسیار مهمی می‌باشد.

آلودگی زدایی

اصطلاح (آلودگی زدایی) به ۲ دسته تقسیم می‌شود.

۱- تکنیک‌هایی که از رشد میکروب‌ها جلوگیری می‌کند و شامل شستن دست‌ها و تمیز نگاه داشتن محیط است.

۲- تکنیک‌هایی که میکروارگانیسم‌ها و اسپورهای آنان را نابود می‌سازدو به عنوان تکنیک استریل شناخته می‌شود مانند مراقبت از زخم‌های جراحی

کنترل عفونت برای کاهش مخازن عفونت در خانه‌های بهداشت از راههای زیر امکان‌پذیر است:

- شستن دست‌ها به عنوان اولین قدم در انجام آلودگی زدایی می‌باشد.

- استفاده از لوازم و ابزار استریل.
- کاربرد وسایل محافظتی شامل دستکش و ماسک و روپوش.
- تعویض به موقع پانسمان‌ها.
- جلوگیری از آلوده شدن سوزن و سرنگ: سوزن و سرنگ در محل دور از رطوبت و در ظروف نفوذ ناپذیر نگاهداری شوند.
- دفع به موقع لوازم آلوده: وسایل آلوده در هر زمان بلا فاصله حمل شوند و به دور ریخته شوند.

توجه: شستن دست‌ها اساسی‌ترین تکنیک برای در هم کوبیدن روند ایجاد و یا پیشرفت عفونت است.

دست‌ها باید قبل و بعد از تما س با هر بیمار و بعد از تماس با خون، ترشحات و مایعات بدن، مدفوع، ادرار و نقاط کثیف شسته شود. حتی در زمانی که از دستکش استفاده می‌شود. شستن دست‌ها باید بلا فاصله بعد از در آوردن دستکش انجام شود و همچنین گاهی اوقات لازم می‌شود که در طی فعالیت و انجام کار برای یک بیمار، دست‌ها چند مرتبه شسته شوند.

در پاره‌ای موارد نیز لازم می‌شود که از ماسک برای جلوگیری از آلوده شدن به خون و ترشحات استفاده شود.

در این میان، استفاده از روپوش مناسب و تمیز نیز برای جلوگیری از عفونت پوست لازم است.

مراحل اصلی آماده سازی

۱. رفع آلودگی
۲. پاکسازی (تمیز کردن)
۳. سترون سازی (استریلیزاسیون) یا گندزدایی سطح بالا (H.L.D) [High level Disinfection]

رفع آلودگی

رفع آلودگی اولین قدم جهت آماده‌سازی ابزار و وسایل آلوده است. آن‌چه حائز اهمیت است، این است که از وسایل و ابزاری که احتمالاً با خون یا دیگر مایعات و ترشحات بدن تماس داشته‌اند، رفع آلودگی شود. بلافاصله پس از استفاده، ابزار و وسایل را به مدت ۱۰ دقیقه در محلول کلر $\frac{۱}{۵}$ ٪ (نیم درصد) قرار دهید. سازمان جهانی بهداشت (W.H.O) محلول کلر $\frac{۱}{۵}$ ٪ را برای رفع آلودگی وسایل قبل از تمیز کردن و یا هنگامی که آب آشامیدنی جهت ساخت محلول در اختیار نمی‌باشد، توصیه می‌کند. برای گندزدایی سطح بالا (H.L.D)، محلول $\frac{۱}{۰۰}$ ٪ رضایت‌بخش می‌باشد به شرطی که آب جوشیده جهت رقیق‌سازی بکار رود:

فرمول کلی ساخت محلول رقیق شده با هر غلظت

$$1 - \text{ضریب سهمی آب} = \frac{\text{غلظت درصد فرآورده}}{\text{درصد رقت مورد نیاز}}$$

مثال: محلولی با رقت $\frac{۱}{۵}$ ٪ بسازید

$$\frac{۵}{\cdot ۵} = 1 - 1 \cdot ۰ = ۹$$

یعنی باید یک قسمت از محلول غلیظ را به ۹ قسمت آب اضافه کرد
یا از فرمول زیر استفاده شود:

$$\text{حجم محلول لازم} \times \frac{\text{درصد غلظت مورد لزوم}}{\text{درصد غلظت محلول غلیظ اولیه}} = \text{مقدار لازم از محلول غلیظ اولیه}$$

مثال: می‌خواهیم ۵۰۰ میلی‌لیتر محلول ۳ درصد تهیه کنیم. غلظت محلول تحويل شده به ما ۲۰٪ است

$$\frac{۳}{۲۰} \times ۵۰۰ = ۷۵ \text{ مقدار محلول غلیظ مورد نیاز}$$

مقدار آب جوشیده مورد نیاز $= 425 - 75 = 500$

فرمول ساخت محلول رقیق از پودرهای دارای درصد کلر مختلف:

$$\frac{\text{درصد رقت مورد نیاز}}{\text{درصد غلظت ترکیب}} \times 1000 = \text{مقدار پودر (گرم)} \text{ مورد نیاز به ازای هر لیتر آب}$$

مثال: محلول کلری با رقت ۵٪ از یک پودر با غلظت ۳۵٪ بسازید:

$$\frac{5}{35} \times 1000 = 14/2 = \text{مقدار پودری که باید به یک لیتر آب افزود}$$

اگر وسایل را نتوان بلا فاصله بعد از رفع آلودگی شستشو داد، پیش از آن که به طور کامل پاکسازی (تمیز) شود، باید آن‌ها را به منظور جلوگیری از تغییر رنگ و خوردگی و نیز زدودن مواد ارگانیک قابل رویت با آب سرد شست. پرسنل برای شستن از دستکش باید استفاده کنند. کلر ۵٪ درصد یک راه ساده و ارزان برای رفع آلودگی سطوح بزرگ است.

پاکسازی یا تمیز کردن

پاکسازی مرحله‌ای بسیار مهم در آماده‌سازی وسایل مطمئن و فاقد آلودگی است. پاکسازی کامل با آب و صابون مایع یا مواد پاک‌کننده (دترجنت) به طور فیزیکی، مواد ارگانیکی مثل خون و مایعات بدن و ترشحات را می‌زداید. حین تمیز کردن و پاکسازی وسایل باید دستکش کار پوشیده شود. دستکش‌ها اگر پاره یا فرسوده باشد باید دور انداخته شود و در غیر این صورت در پایان روز آن‌ها را تمیز کرده و بگذارید برای استفاده روز بعد خشک شود. علاوه بر پوشیدن دستکش، منتهای دقت باید اعمال شود تا از فرو رفتن سوزن یا بریدگی اجتناب شود.

اگر عینک یا محافظه‌های پلاستیکی چشم و صورت در دسترس باشد، باید حین پاکسازی وسایل و دیگر چیزها از آن استفاده شود. این عمل باعث جلوگیری از پاشیده شدن آب آلوده به چشم‌ها می‌شود. پس از تمیز کردن، وسایل را کاملاً با آب بشوئید تا بقایای مواد پاک‌کننده که می‌تواند در گندزدایی شیمیایی، تداخل ایجاد کند زدوده شود.

سترون‌سازی (استریلیزاسیون)

پس از این‌که از ابزار آلات رفع آلودگی شد و کاملاً تمیز، شسته و خشک شدند، باید استریل شوند.

فرآیند استریلیزاسیون تمامی میکرووارگانیسم‌ها منجمله هاگ درونی باکتری‌ها را نابود می‌کند استریلیزاسیون را می‌توان با اتوکلاو (بخار پرفشار)، گرمای خشک یا با استفاده از مواد شیمیایی (استریلیزاسیون سرد) انجام داد. با خاطر داشته باشید هنگامی که ابزار و تجهیزات به وسیله بخار استریل می‌شوند، ضروری است که بخار به تمام سطح آن‌ها برسد. اتوکلاو کردن ظرف دربسته تنها قسمت خارجی آن‌ها را استریل خواهد کرد. ابزار استریل شده را باید بلافصله به کار برد مگر این‌که قبل از استریلیزاسیون با بخار، آن‌ها را در دو لایه کتان - کاغذ با دیگر لفاف‌های مناسب پیچیده باشیم تا بتوان آن‌ها را در یک ظرف استریل و خشک که در آن کاملاً چفت می‌شود، نگهداری کرد.

لفاف‌های مورد استفاده برای پوشاندن ابزار و وسایل باید به اندازه کافی متخلخل باشد که اجازه عبور به بخار را بدهد و از سوی دیگر به حد کافی الیاف در هم تنیده‌ای داشته باشد که از ورود ذرات و گرد و غبار جلوگیری کند. وسایل استریل پیچیده در لفاف را حداقل ۱۰ روز می‌توان استفاده کرد، البته فقط در صورتی که دست نخورده و در محیط خشک نگهداری شود.

قرار دادن بسته لفافه پیچ (پک) در یک کیسه پلاستیکی و بسته‌بندی نمودن آن، عمر استفاده از آن را تا یک ماه افزایش می‌دهد، روی تمامی پک‌ها و ظروف استریل باید برچسب تاریخ انقضاء زده شود.

روش استریل کردن لوازم کار:

برای ضدعفونی کردن لوازم کارد خانه بهداشت می‌توانید روش‌های زیرا به کار بگیرید:

الف) استفاده از اتوکلاو:

در این روش ابتدا لوازم فلزی و شیشه‌ای را با آب و صابون تمیزبشوئید (به طوری که از خون و یا کثافات دیگری که به آن آلوده شده اند پاک شوند). مقدار کافی گاز را به قطعات مورد نظر بریده تا بزنید (در صورتی که گاز آماده نباشد). همچنین مقدار کافی پنبه را به شکل گلوله‌های کوچک درآورید. کلیه لوازم کار فلزی و غیرفلزی را داخل بیکس گذاشته و در آن را کامل ببندید و سوراخ‌های آن را باز بگذارید . نام خانه بهداشت را روی برچسب نوشته بروی در بیکس بچسبانید. برای ضد عفونی نمودن به وسیله اتوکلاو بیکس گازرا به مرکز بهداشتی درمانی ارسال دارید. توجه کنید که بیکس استریل هرگز نباید سوراخ‌هایش باز باشد و یا در آن را برای مدتی باز نگهداشت به محض برداشتن گازیا پنبه (با پنس بلند استریل) فوراً در آن را ببندید.

ب) استفاده از فور (حرارت خشک) :

فور معمولاً در مراکز بهداشتی درمانی وجود دارد . در بعضی از موارد که بیماری‌های عفونی مثل زردی یا یرقان شایع بوده و سرنگ یک بار مصرف در اختیار نباشد برای ضد عفونی کردن سرنگ و سوزن از حرارت خشک استفاده می‌شود.

ج) فلامبیه کردن :

در مواقع فوری می‌توان از این روش استفاده کرد:

برای فلامبیه کردن اشیاء فلزی ، آنها را مدتی روی شعله چراغ الکلی بگذارید یا وسایل فلزی را داخل ظرف قلوه ای گذاشته و روی آن الکل ریخته و الکل را شعله ور نمایید تا رنگ آنها سرخ شود. سپس آنها را در محلول ضد عفونی کننده قرار دهید تا سرد شده و برای استفاده آماده گردد.

د) گندزدایی سطح بالا (H.L.D)

هنگامی که تجهیزات استریلیزاسیون یا در دسترس نبوده و یا مناسب نیست، H.L.D تنها روش جایگزین قابل پذیرش است. H.L.D باعث نابودی تمامی

میکروارگانیسم‌ها منجمله ویروس‌های مولد ایدز و هپاتیت B می‌شود. اما تمامی آندوسپورهای باکتری را به طرز مطمئنی از بین نمی‌برد. H.L.D را می‌توان با جوشاندن در آب، بخار دادن، یا غوطه‌ورسازی در گندزداهای شیمیایی مثل کلر ۱٪ - گلوتارآلدئید ۲٪ - فرمالدئید ۸٪ انجام داد. توجه: H.L.D فقط هنگامی مؤثر است که ابتدا از وسایل و ابزار رفع آلودگی شده و سپس کاملاً پاکسازی (تمیز) شده و قبل از H.L.D شسته شوند.

۵) HLD بوسیله جوشاندن

تمامی وسایل و ابزار باز یا از هم جدا و در آب غوطه‌ور ساخته و روی ظرف را بپوشانید و به مدت ۲۰ دقیقه بجوشانید. زمان باید از هنگامی محاسبه شود که آب به طور چرخشی و با تولید حباب بجوشد و تمامی وسایل و اشیا باید کاملاً زیر آب باشند. پس از این‌که شروع به جوشیدن کرد هیچ چیز نباید به ظرف اضافه شود. پس از ۲۰ دقیقه جوشیدن با استفاده از فورسیپسی که به روش HLD گندزدایی شده، اشیا جوشانده شده را برداشت و در ظرفی که به روش HLD گندزدایی شده، قرار داده و اجازه دهید تا خنک شده و خشک شود.

وسایل و دیگر اشیاء را یا باید بلافصله مورد استفاده قرار داد و یا در یک ظرف پوشش‌دار خشک که به روش HLD گندزدایی شده، اشیا جوشانده شده را برداشت و در ظرفی که به روش HLD گندزدایی شده، قرار داده و اجازه دهید تا خنک شده و خشکشود.

وسایل و دیگر اشیاء را یا باید بلافصله مورد استفاده قرار داد و یا در یک ظرف پوشش‌دار خشک که به روش HLD گندزدایی شده قرار داد (ظرفی که برای خشک شدن ابزار و وسایل استفاده می‌شود، می‌تواند برای نگهداری وسایل استفاده شود به شرط آن‌که در کف آن آب نباشد مدت نگهداری تا یک هفته می‌باشد.

توصیه‌هایی در مورد جوشاندن

- همیشه بخار دادن و جوشاندن را به مدت ۲۰ دقیقه و با استفاده از یک قابل‌مهم دردار انجام دهید
- زمان را از هنگامی که آب شروع به جوشیدن می‌کند، محاسبه نمایید
- روی اشیا باید کاملاً با آب پوشیده شود
- پس از این که آب شروع به جوشیدن کرد، هیچ چیز به ظرف اضافه نکنید

شستشوی دست‌ها

هدف: فرآگیر پس از یاد گرفتن روش کار باید بتواند: به منظور پیشگیری از انتقال عفونت دست خود را به‌طور صحیح شستشو دهد.

وسایل لازم:

- ۱- صابون مایع یا جامد
- ۲- حوله

۲- برس ناخن

توجیه روش	روش کار
با این عمل از تجمع میکروبها جلوگیری می‌شود و نیز دسترسی کامل به انگشتان و مج دست حاصل می‌شود.	ساعت مچی و حلقه انگشتتری را از دست خارج کنید و آستین لباس را بالاتر از مج بیاورید.
با این عمل از خیس و آلوده شدن لباس پیشگیری می‌شود.	مقابل دستشویی ایستاده و اندکی به طرف جلو خم شوید. دست‌ها و لباس را دور تر از سطح دستشویی نگاه دارید به طوری که دسترسی به شیر آب راحت باشد.
آب گرم منفذ پوست را باز کرده و نیز بهتر از آب سرد آلودگی را بر طرف می‌کند.	شیر آب را باز کرده و دمای آب را به طوری تنظیم نمایید که به نحو مطلوب گرم باشد.



توجیه روش	روش کار
با این عمل از آلودگی لباس جلوگیری می شود.	جریان آب را چنان تنظیم کنید که آب به اطراف نپاشد.
پایین نگاه داشتن دستها موجب می شود آب از محل های تمیز تر به قسمت های آلوده جریان داشته باشد. قرار دادن جا صابونی در خارج از محل شستن دست موجب خشک ماندن صابون و پیشگیری از رشد میکروب ها می شود.	دستها را پایین تر از آرنج نگاه دارید و آن را خیس کنید. به طور کامل دستها را با صابون آغشته کنیدو اگر از صابون جامد استفاده می کنید آن را پس از مصرف آب کشیده و در خارج از محل شستن دست در داخل جا صابونی قرار دهید.
با مالیدن دست ها با حرکات دورانی، میکروب ها از سطوح آلوده پوست جدا می شوند.	پشت و کف دستها-انگشتان-بین انگشتان و بند انگشتان را به خوبی و با حرکات دورانی حداقل ۵ بار بمالید. این کار را به مدت ۱۰-۳۰ ثانیه ادامه دهید.
این کار موجب کاهش میکروب هامی شود.	در صورتی که زیر ناخنها کثیف باشد با برس آن ها را تمیز کنید.
آب کشی دست ها میکروب ها را از دستها جدا می کند.	مج دستها و دستها را به طور کامل آب بکشید.
این عمل موجب پیشگیری از انتقال میکروب هامی شود.	در صورت آلودگی بیشتر دستها، شستن دستها به مدت ۱-۳ دقیقه ادامه پیدا کند.
خشک کردن دستها از قسمت تمیز تر (نوك انگشتان) به قسمت آلوده تر (مچ) از انتشار آلودگی جلوگیری می کند. خشک کردن دستها از ایجاد ترک و تحریک پوست جلو گیری می کند.	دستها را به طور کامل با حوله و یا دستمال کاغذی از قسمت انگشتان به طرف مج دست و ساعد خشک کنید.


استفاده از دستکش استریل

هدف: پس از اتمام تدریس و یادگیری روش کارفراگیر بتواند دستکش استریل را به طور صحیح بپوشد و پس از اتمام کار آن را در آورد.

وسایل لازم:

دستکش استریل به اندازه مناسب

توجیه روش	روش کار
روش پوشیدن دستکش	
شستن دستها از پخش میکروب جلوگیری می‌کند و باعث راحت پوشیدن دستکش می‌شود.	دستها را شسته و خشک کنید.
روبوت موجب آسوده شدن شدن دستکش می‌شود.	بسته دستکش استریل را روی سطح تمیز و خشک بگذارید.
دست نزدن به قسمت داخلی بسته موجب استریل ماندن دستکش می‌شود. 	لایه رویی بسته دستکش را باز کنید. بسته داخلی آن را بدون تماس دست با آن خارج کنید.
این عمل موجب استریل ماندن دستکش و دستری راحت به آن می‌شود. 	در حالی که قسمت تا شده ساق دستکش به طرف خودتان است بسته داخلی را به دقت باز کنید.

توجیه روش	روش کار
<p>با این عمل فقط قسمت داخل دستکش لمس می شود. لذا</p>  <p>قسمت بیرون دستکش استریل باقی می ماند.</p>	<p>با انگشت شست و چهار انگشت دیگر یک دست، لبه قسمت تا خورده دستکش دست دیگر را گرفته و آن را بر دارید.</p>
	<p>در حالی که انگشتان دستکش به طرف پایین است دستکش را بلند کنید. دقت کنید تا دستکش با سطح غیر استریل تماس پیدا نکند.</p>
 <p>باز کردن لبه تا خورده دستکش با دست غیر استریل، موجب غیر استریل شدن دستکش می شود.</p>	<p>دست دیگر را به دقیق وارد دستکش نموده و بدون باز کردن لبه تا خورده، آن را پوشید.</p>
	<p>انگشت شست دستی را که دستکش پوشیده اید به طرف بیرون باز کنید. چهار انگشت دیگر همان دست را زیر قسمت تا خورده دستکش وارد کرده و آن را بلند کنید.</p>
	<p>به دقیق دست را وارد دستکش نمایید. توجه کنید که با دست دستکش دار فقط نواحی استریل را لمس نمایید.</p>

روش کار	توجیه روش
روش در آوردن دستکش	
با یکی از دستها لبه بیرونی ساق دستکش دیگر را گرفته و آن را تا لبه انگشتان پایین بشیبد طوری که قسمت آلوده دستکش در داخل باقی بماند.	قرار دادن قسمت آلوده دستکش در داخل از پخش میکروبها جلوگیری می کند.
انگشتان خود را از داخل دستکش خارج کرده و دستکش را در داخل دست دستکش دار جمع کنید.	با این عمل قسمت آلوده دستکش با دست تماس پیدا نمی کند.
با دست بدون دستکش لبه داخلی ساق دستکش را گرفته و آن را به طرف پایین بشیبد به طوری که لنگه دستکش قبلی در داخل آن قرار گیرد و دست را از دستکش خارج کنید.	استفاده از کیسه پلاستیکی از پخش میکروبها جلوگیری می کند شستن دستها از پخش میکروب جلوگیری می کند.
دستکش را در داخل کیسه پلاستیکی گذاشته و آن را دور بیندازید دستها را بشویید	



نکات قابل توجه

- ۱- به هنگام بر داشتن وسایل تیزوسنجاق و غیره دقت کنید که دستکش پاره نشود.
- ۲- اندازه‌های معمولی دستکش از شماره‌های ۶/۵-۸/۵-۷/۵ می‌باشد.
- ۳- از دستکش خیس و پاره به لحاظ آلوده بودن نباید استفاده شود.
- ۴- همیشه باید نسبت به خرید دستکش مرغوب اقدام کرد و برای این کار بودجه کافی در نظر گرفت.
- ۵- همواره در تماس با مواد عفونی باید دستکش داشته باشید.
- ۶- در صورت آلودگی احتمالی دستکش به مواد آلوده آن را دور بیندازید و دست خود را بشویید.
- ۷- هنگام کار با دستکش به چشم و بینی و یا دهان خود دست نزنید.
- ۸- هیچگاه با دستکش محل کار را ترک نکنید و به تلفن دست نزنید.
- ۹- دستکش‌های غیر استریل از جنس لاتکس برای کار با ترشحات خوب است این دستکش‌ها یک بار مصرف است.
- ۱۰- دستکش‌هایی که برای کارهای عمومی و تمیز کردن از کائوچو ساخته می‌شود می‌توان مجدداً مورد استفاده قرار داد.
- ۱۱- دستکش‌های جراحی صرفاً برای یک بار مصرف ساخته می‌شوند و نمی‌توان آن‌ها را مجدداً مورد استفاده قرار داد.
- ۱۲- دستکش‌های تمیزی را که قصد بسته بندی آن را جهت استریل نمودن دارید قبل از استفاده با آب پر کنید (۳۵۰ سی سی) تا از عدم وجود سوراخ در آن مطمئن شوید، سپس آن‌ها را در محل مناسبی قرار داده تا خشک شود و داخل آن‌ها را پودر تالک بپاشید و بسته بندی نموده و برای استریل شدن ارسال نمایید.

استفاده از ماسک


پس از یادگیری روش کار، باید فراگیر بتواند:

به منظور پیشگیری از انتقال عفونت ماسک را به طور صحیح بپوشد و پس از اتمام کار آن را در آورد.

وسایل لازم: ماسک یک بار مصرف یا پارچه‌ای

روش کار	تجوییه روش
روش پوشیدن ماسک	
دستها را بشویید.	شستن دست‌ها از پخش میکروب جلوگیری می‌کند.
حاشیه بالایی ماسک را پیدا کنید. دو بند بالایی ماسک را به دست گرفته و حاشیه بالایی آن را روی بینی قرار دهید.	گرفتن بند از تماس دست با ماسک جلوگیری می‌کند.
دو بند بالایی را از بالای گوش‌ها عبور داده و در قسمت بالا و پشت سر گره بزنید.	گره زدن بند در قسمت بالا و پشت سر، ماسک را محکم نگاه می‌دارد.
دوبند پایین را در پشت گردن محکم کنید به طوری که حاشیه پایینی ماسک در زیر چانه قرار بگیرد.	این عمل از انتقال میکروب‌ها به هنگام صحبت کردن و نفس کشیدن پیشگیری می‌کند.
روش در آوردن ماسک	
دستها را بشویید.	شستن دست‌ها از انتقال میکروب‌ها جلوگیری می‌کند.
بندهای پایینی ماسک را باز کنید.	با این عمل از افتادن ماسک روی لباس و آلودگی آن پیشگیری می‌شود.
بندهای بالای ماسک را باز کنید و با گرفتن بندها ماسک را از روی صورت بردارید.	این کار از تماس دست‌ها با قسمت آلوده ماسک پیشگیری می‌کند.
بندهای بالا و پایین را با دست بگیرید و ماسک را به طرف داخل تا کنید.	با این عمل دست با قسمت آلوده ماسک تماس پیدا نمی‌کند.
ماسک را در داخل کیسه پلاستیکی بگذارید.	این کار از انتقال آلودگی جلوگیری می‌کند.
دستها را بشویید.	با این کار از انتقال آلودگی جلوگیری می‌شود.

نکات قابل توجه



- ۱- به بیمار و خانواده وی تذکر دهید که بستن ماسک، بیمار و کارکنان را از عوامل عفونت زا محافظت می‌کند.
- ۲- در صورت خیس شدن ماسک آن را عوض کنید.
- ۳- هر ماسک را فقط برای یک بار استفاده کنید.
- ۴- ضمن استفاده از ماسک از صحبت کردن زیاد خودداری کنید
- ۵- به هنگام ابتلاء به سرماخوردگی حتما از ماسک استفاده کنید.

تمرین نظری

- ۱- اساسی ترین تکنیک برای در هم کوبیدن روند ایجاد عفونت کدام است؟
۲- علائم ایجاد عفونت در زخم را فهرست نمایید.
۳- چه نکاتی را در انجام پانسمان باید رعایت کرد تا از انتقال آلودگی پیشگیری شود؟
۴- به چه علت اشیاء آلوده را در ابتدا باید تمیز نموده و سپس در محلول های شیمیایی جهت گند زدایی قرار داد؟

تمرین عملی

- ۱- با کمک دوستان خود نحوه استفاده از دستکش و ماسک را در جهت کنترل عفونت، تمرین نمایید.
- ۲- مراحل آماده سازی وسایل جهت بسته بندی و استریل نمودن تمرین نمایید؟

بخش چهارم

پانسمان - باندپیچی و اصول انجام آن

اهداف آموزشی

انتظار است پس از یادگیری محتوای این مبحث فراغیر بتواند:

- ۱- مشخصات زخم‌ها را تعریف و آن‌ها بر حسب عامل ایجاد کننده دسته‌بندی نماید.
- ۲- عوارض مهم زخم‌ها را لیست نماید.
- ۳- پانسمان را تعریف و دلایل انجام آن را فهرست نماید.
- ۴- طریقه استفاده از بسته‌های پانسمان را توضیح دهد.
- ۵- لوازم کار جهت انجام پانسمان را فهرست کند.
- ۶- طریقه استفاده از پنس حمل و نقل اسباب را توضیح دهد.
- ۷- روش‌های جلوگیری از آسودگی میدان استریل را فهرست نماید.
- ۸- دلایل استفاده از باندپیچی را بیان نماید.
- ۹- انواع باندها را بر حسب جنس و شکل طبقه‌بندی کند.
- ۱۰- موارد استفاده از باندها را فهرست کند.
- ۱۱- روش کار را در انواع بانداژها بطور عملی نشان دهد.
- ۱۲- نکات مهم که هنگام باندپیچی باید رعایت گردد لیست نماید.

اصول مراقبت از زخم‌ها

جراحت یا زخم عبارت است از پارگی غیر طبیعی پوست یا سایر بافت‌ها که باعث می‌شود خون از بدن خارج شود. زخمهای روی سطح بدن، (جراحت‌های خارجی) از این نظر مشکل آفرین هستند که میکروب‌ها می‌توانند از راه آن‌ها وارد بدن شده، در محل رشد و نمو کرده و باعث ایجاد عفونت و ظهور علائمی مانند گرمایی، تورم محل، بدی حال عمومی، تب و لرز و... شوند.

تقسیم‌بندی زخمهای

در یک تقسیم‌بندی، زخمهای باز و بسته طبقه‌بندی می‌شوند
زخمهای باز باعث می‌شود که خون از بدن خارج شود و خود دارای انواع مختلف است: بریدگی، پارگی، خراش، زخم گلوله
زخمهای بسته باعث می‌شوند که خون از مسیر گردش، ولی نه از بدن خارج شود. زخمهای بسته را می‌توان به صورت ضرب دیدگی (ناحیه کبود شده) یا خون مردگی در زیر پوست مشاهده کرد.

اشکال زخمهای


بریدگی: چاقو، قیچی و لبه کاغذ باعث زخم ناشی از بریدگی می‌شوند. این نوع جراحت ممکن است با خونریزی فراوان همراه باشد.

پارگی (ریش شدن): پوست ممکن است به صورت غیر منظم بر اثر تماس با سیم خاردار، ماشین آلات و یا چنگال حیوانات باز شود. شدت خونریزی در این نوع جراحت کمتر از بریدگی است ولی این جراحت‌ها معمولاً آلوده هستند.

زخمهای نفوذی یا سوراخ شدگی: ناخن، سوزن، تیزی نرده، خار گیاه می‌تواند سبب ایجاد چنین جراحتی شود. در این نوع جراحت‌ها ممکن است صدمه داخلی شدید باشد. اگر زخم عمیق باشد به علت نفوذ ذرات ریز آلوده، احتمال عفونت بسیار است.

خراشیدگی: معمولاً خراش بر اثر ساییده شدن و یا سر خوردن روی سطح زبر به وجود می‌آید. لایه سطحی پوست خراشیده می‌شود و یک ناحیه پوست رفته باقی می‌ماند. این گونه زخم‌ها اغلب آلوده به غبار و کثافت هستند و به آسانی عفونی می‌شوند.

زخم گلوله: زخم‌های ناشی از اصابت گلوله می‌توانند سبب جراحت‌های عمیق داخلی شوندو ممکن است اندام‌های داخلی و بافت‌ها و رگ‌های خونی در مسیر گذر گلوله به شدت مجروح شده باشند و علاوه بر خونریزی بیرونی، خونریزی داخلی وجود داشته باشد.



انواع زخم بر حسب شکل ظاهری آنها

زخم‌های فشاری (BED SORE): زمانی اتفاق می‌افتد که یک قسمت از بدن با سطح دیگر مانند تخت و یا صندلی به مدت زمان طولانی وارد کرده و پوست ایجاد ساییدگی و شکاف نماید. محل‌هایی که بیشتر در معرض خطر هستند کتف، برجستگی بزرگ استخوان ران، زانو، آرنج، پاشنه و قسمت خاصره می‌باشند. این زخم‌ها درجه‌اتی دارد:

درجه ۱: پوست سالم ولی به رنگ قرمز است که محل با فشار به رنگ سفید در نمی‌آید.

درجه ۲: ساییدگی و خراش در پوست ایجاد شده و ضخامت آن به وسیله یک حفره کم عمق از بین می‌رود.

درجه ۳: علاوه بر پوست، بافت زیر جلدی نیز آسیب دیده و یک حفره عمیق در محل بوجود می‌آید.

درجه ۴: ضخامت پوست به طور کامل از بین رفته و بافت به طور وسیعیدچار مردگی شده و عضلات و استخوان‌ها نیز صدمه می‌بینند.

انواع زخمهای از نظر رنگ

زخمهای قرمز رنگ: این زخمهای تمیز بوده و هیچ گونه ترشحی ندارند.

زخمهای زرد رنگ: این زخمهای یک لایه از ترشح زرد رنگ دارند که نسج مرده باعث ترشح می‌شود.

زخمهای سیاه رنگ: شامل بافت‌های مرده و سیاه می‌باشند.

عوارض زخمهای

در هنگام پیدایش زخم اثرات مختلفی ایجاد می‌شود که شامل از بین رفتن فوری تمام و یا قسمتی از کار عضو، خونریزی، آلودگی توسط باکتری‌ها و مرگ سلول می‌باشد. خونریزی و عفونت دو عارضه مهم زخمهای است. خطر خونریزی در زخمهای بریدگی بیشتر از سایر زخمهای است. علاوه بر خونریزی زخم مستعد عفونت نیز می‌باشد. در زخمهای آلوده و کثیف که بیشتر در اثر خدمات ایجاد می‌شوند. علاوه بر خطر خونریزی و عفونت ممکن است زخم با میکروب کزار نیز آلوده شود.

عوارض و نشانه‌های در زخمهای عفونی

۱- زیاد شدن درد و سوزش زخم

- ۲- زیاد شدن ورم و قرمزی زخم و ازدیاد حرارت بافت‌های اطراف زخم
- ۳- ممکن است چرک از زخم تراوش کند
- ۴- اگر عفونت حاد باشد فرد دچار تب، عرق کردن، لرز و بیحالی می‌شود
- ۵- ورم و حساسیت در غده‌های لنفاوی، که به صورت یک دنباله قرمز رنگ در سطح داخلی بازوها و یا ساق پا خود را نشان می‌دهند.

چگونه بدن نسبت به جراحت واکنش نشان می‌دهد

واکنش طبیعی بدن عبارت است از محدود کردن جریان خون که از دست رفتن خون را به حد اقل می‌رساند. تقریباً بلافصله انتهای رگ‌های خونی آسیب دیده منقبض می‌شوندو خون در محل شروع به انعقاد کرده و تشکیل لخته را می‌دهد. لخته باعث بسته شدن رگ خونی و پوشاندن زخم می‌شود و سپس بدن شروع به ترمیم آسیب می‌کند. التیام زخم عبارت است از باز گشتن التیام سلول‌ها از بین رفتن شکاف و گسیختگی پوست و مخاط داخلی بدن می‌باشد.

بدن برای بهبودی زخم توانایی چشمگیر دارد ولی بر اثر بعضی از عوامل روند بهبودی زخم دچار اشکال می‌شود که عبارت است از:

علت	عوامل
تشکیل آنتی بادی و گلbul‌های سفید کاهش می‌باید، همچنین بافت به جا مانده از بهبود زخم سفت تر بوده و خاصیت ارتجاعی کمتری دارد.	سن بالا
بافت چربی گردش خون کمتری دارد و بنابراین افراد جاک را بیشتر باید از نظر علائم عفونت پوستی کنترل کرد.	چاقی
زخم‌های سوختگی و یا ناشی از ضربه نیازهای تنذیه‌ای را افزایش می‌دهد از طرفی سوء تنذیه بهبود زخم را به تأخیر می‌اندازد.	سوء تنذیه
باعث اکسیژن رسانی ناکافی به محل زخم می‌شود و بهبود زخم دچار اشکال می‌شود.	کم خونی
باعث انقباض عروقی و کاهش اکسیژن رسانی و در نتیجه تأخیر در بهبود زخم می‌شود.	سیگار کشیدن
داروهای شیمی درمانی که مغز استخوان را دچار اختلال کرده، تعداد گلbul‌های سفید را کاهش داده و پاسخ‌های ایمنی را محدود می‌سازد.	داروها

پانسمان زخم

پانسمان یک پوشش محافظتی استریل است که به منظور ایجاد یک محیط مناسب جهت ترمیم زخم، جذب ترشحات، جلوگیری از انتقال میکروب‌ها، حفاظت زخم از صدمات، اعمال فشار برای بند آوردن خونریزی، نگهداری و بی‌حرکت کردن زخم و حفظ آسایش جسمی و روحی بیمار روی زخم قرار داده می‌شود.

استفاده از پانسمان بستگی به نوع زخم و میزان ترشحات آن دارد که به صورت‌های مختلف پانسمان تمیز، پانسمان زخم‌های ترشح‌دار، پانسمان فشاری در موقع بروز خونریزی مورداً استفاده قرار می‌گیرد.

وسایل پانسمان

تعدادی از وسایل پانسمان از جمله گاز، پنبه سواب، پنس، پنست، کاسه و یا ظرف قلوه‌ای شکل در داخل بسته استریل قرار دارد که از واحد استریلیزاسیون تحويل گرفته می‌شود. پس از باز کردن بسته به روش صحیح و ریختن محلول‌های شستشو، پانسمان انجام می‌گیرد. در صورت نیاز می‌توان وسایل استریل آماده را به وسایل فوق اضافه نمود. همچنین می‌توان گاز و پنبه استریل را در داخل بیکسه‌های جداگانه قرار داد و پس از استریل شدن آن‌ها در اتو کلاو، آن‌ها را تا پایان تاریخ انقضاء استریل بودن (حداکثر ۱۰ روز پس از تاریخ استریل نمودن) مورد استفاده قرار داد. باید توجه داشت که دریچه‌های بیکس برای گردش بخار آب در دستگاه باز باشد و بعد از اتمام عملیات استریل کردن و قبل از بیرون آوردن از دستگاه اتو کلاو، دریچه‌هایش بسته شود تا در تماس با محیط خارج دچار آلودگی نگردد.

گاز استریل

پارچه پنبه‌ای تور مانندی است که برای پوشاندن زخم و جذب ترشحات استفاده می‌شود و در اندازه‌های (5×5 و 10×10) موجود است. تعداد گازهای استفاده شده به موقعیت زخم و

میزان ترشحات آن بستگی دارد. برای جذب ترشحات بیشتر از گازهای به ابعاد 10×10 سانتی متر که در وسط پنبه دارند و به آنها پد گفته می شود استفاده می کنند.

پنبه سواب

پنبه های گرد شده در اندازه های مختلف است که برای تمیز کردن زخم از آنها استفاده می شود. گاهی این پنبه ها با یک لایه گاز پوشانده می شوند تا از چسبیدن پنبه به زخم جلوگیری شود.


اپلیکاتور





اپلیکاتورها، چوب کوچک استوانه ای شکل هستند که مقداری پنبه در انتهای آنها پیچیده شده است. از اپلیکاتور برای برداشتن کشت از ترشحات زخم و تمیز کردن محل هایی که با پنبه سواب دسترسی به آنها مشکل است استفاده می کنند.

نوار چسب

انواع مختلفی از چسب ها وجود دارد که به صورت نوار برای ثابت کردن پانسمان استفاده می کنند. نوار چسب ممکن است از نوع کاغذی، ضد حساسیت و یا پلاستیک باشد. پهناهی نوار چسب از ۲ تا ۳ سانتیمتر و به صورت لوله شده می باشد.

آماده کردن بسته های استریل




تجوییه روش	روش اجرا
آماده کردن وسایل باعث صرفه جویی در وقت می شود. 	وسایل لازم را آماده کنید (شامل ظرف قلوه ای شکل، پنس، پنست، قیچی، چند تکه گاز و چند گلوله پنبه).


توجیه روش	روش اجرا
با این کار از آلوده شدن وسایل داخل بسته پس از استریل کردن جلوگیری می‌شود.	پارچه شان سالم به ابعاد 70×70 سانتی متر برای گذاشتن وسایل انتخاب کنید.
با این کار به هنگام باز کردن بسته استریل از تماس دست با درون آن جلوگیری می‌شود. 	وسایل را در داخل پارچه‌شان گذاشته، گوشه‌شان سمت خودتان را محکم روی وسیله‌ای که در وسط آن قرار دارد بکشید و دوباره انتهای گوشه مذکور را به طرف خود برگردانید.
توجیه روش	روش اجرا
	گوشه طرف راستشان را محکم به طرف وسط بسته بکشید و دوباره انتهای گوشه را بر گردانید.
	گوشه طرف چپ را مانند گوشه راست محکم بکشید و بر روی گوشه راست قرار دهید. سپس انتهای گوشه آن را بر گردانید.
	گوشه مقابل خود را پس از تا نمودن دو طرف آن محکم روی بسته بکشید و انتهای گوشه را پس از برگرداندن در زیر دو گوشه چپ و راست که بر روی هم قرار دارند بگذارید.
با این عمل محتوای بسته مشخص می‌شود.	چسب را با ذکر تاریخ، نام بسته و واحد بسته‌بندی کنند، بر روی بسته بچسبانید.

باز کردن بسته‌های استریل

هدف: پس از یادگیری روش کار باید بتوانید: بسته‌های وسایل استریل را بدون آلوده کردن محیط داخلی آن‌ها باز کنید.

وسایل لازم: بسته‌های استریل مورد لزوم

توجیه روش	روش کار
شستن دست‌ها از انتقال میکروب‌ها جلوگیری می‌کند.	دست‌ها را مطابق دستور العمل بشویید.
این عمل موجب سازمان دهی در کارها می‌شود.	وسایل را آماده کنید.
این کارها خطر آلوده شدن وسایل استریل را کمتر می‌کند.	در و پنجه را بیندید. بسته‌های استریل را در قسمت مرکزی یک سطح صاف و تمیز که بالاتر از کمر باشد قرار دهید.
کنترل نوار شاهد موجب اطمینان از استریل بودن بسته و محتويات آن می‌شود.	تاریخ مصرف، نام بسته و تغییر رنگ نوار شاهد را کنترل کرده و بر چسب را از روی بسته جدا کنید.
	با استفاده از نوک انگشتان شست و اشاره قسمت خارجی لایه رویی بسته را گرفته و آن را بدون عبور دادن دست خود از بالای میدان استریل روی سطح دورتر از خودتان باز کنید.
	لایه‌های کناری را به ترتیب با گرفتن از قسمت خارجی گوشه به اطراف باز کنید.
	برای باز کردن لایه داخلی بسته به اندازه ۳۰ تا ۱۵ سانتی متر از میز فاصله بگیرید. سپس با استفاده از نوک انگشتان شست و اشاره قسمت تا خورده لایه داخلی را بدون تماس با محتويات بسته گرفته و آن را به طرف خودتان باز کنید و گوشه را تا جایی که به آن دست زده اید تا کنید.

توجیه روش	روش کار
	با استفاده از فور سپس حمل و نقل، وسایل داخل بسته را برای انجام کارمرتب کنید.
	در صورت نیاز محلول‌های لازم را در ظروف داخل بسته بریزید.

نکات مورد توجه:

- ۲/۵ سانتی‌متر از لبه‌های میدان استریل آلوده حساب می‌شوند. بنا بر این وسایل نباید در لبه‌های میدان استریل قرار بگیرند.

- در بعضی از موقعیت ممکن است که لازم باشد که دوباره پوشش استریل را به صورت شل ببندند. برای مثال: پس از ریختن محلول‌ها داخل بسته پانسمان ممکن است که آن را ببندند. البته این کار هنگامی امکان‌پذیر است که به قسمت داخلی پوشش دست نزدیک باشند. که برای بستن آن اول گوشه نزدیک به خودمان، سپس گوشه‌های طرفی و پس از آن گوشه خارجی بسته می‌شود.

- در صورتی که به استریل بودن بسته‌ای شک داشتید باید آن را غیر استریل محسوب کنید.

- اگر بسته استریل در بالین بیمار باز شود. باید قبل از توضیحات لازم در مورد لزوم حفظ میدان استریل به بیمار داده شود تا از آلوده شدن میدان استریل توسط وی جلوگیری گردد.



پنس حمل و نقل (اسباب‌گیر) استریل


پنس استریل برای بیرون آوردن اشیاء استریل از داخل فور، برداشتن وسیله استریل از داخل ظرف و یا بسته استریل، و یا منتقل کردن لوازم استریل از جایی به جای دیگر به کار می‌رود.

استفاده از پنس حمل و نقل استریل

هدف: پس از یادگیری روش کار باید بتوانید از فورسپس استریل به منظور جا به جا نمودن وسایل استریل بدون آلووده کردن آن‌ها استفاده کنید

وسایل لازم: پنس اسباب‌گیر استریل در داخل محلول استریل و بسته‌های استریل مورد لزوم

تجوییه روش	روش کار
شستن دست‌ها از انتقال میکروب‌ها جلوگیری می‌کند.	دست‌ها را بشویید.
این عمل از پخش میکروب‌ها جلوگیری می‌کند.	ماسک را پوشید.
	آرنج خود را به بدن نزدیک کرده، سپس پنس استریل را قفل کرده و آن را به طور عمودی در حالی که نوک آن رو به پایین است بدون تماس با لبه و دیواره داخلی، از داخل محلول ظرف بیرون بیاورید.
	پس از خارج کردن پنس از محلول آن را به مدت چند ثانیه به طور عمودی، در با لایی ظرف بدون تماس با لبه‌های آن نگاه دارید تا محلول باقی مانده روی فورسپس به داخل ظرف بریزد.

	<p>با استفاده از پنس اسباب گیر استریل از قسمت کناری وسیله گرفته و آن را داخل میدان استریل جا بجا و یا اضافه کنید.</p>
<p>این عمل موجب استریل ماندن پنس می‌شود.</p>	<p>پس از اتمام کار پنس اسباب گیر را دوباره بدون تماس آن با لبه‌های ظرف، داخل محلول قرار دهید.</p>

نکات مورد توجه

از نگاهداری دو پنس در داخل ظرف محلول خودداری کنید. زیرا ممکن است شاخه یک پنس در هنگام بیرون آوردن با دسته پنس دیگر آلوده شود. هنگامی که پنس را از داخل محلول بیرون می‌آورید دو شاخه آن را باز نکنید و نگذارید که با دیواره و لبه ظرف تماس یابد. همیشه نوک پنس را به طرف پایین نگاه دارید تا از جاری شدن محلول از یک شاخه به طرف دسته غیر استریل و بازگشت مجدد آن به طرف نوک پنس خودداری شود. مادامی که از پنس اسباب گیر استفاده می‌کنید شاخه‌های آن را در حوزه دید خود نگاه دارید.

اگر شک دارید که پنس یا فورسپس استریل است آن را استریل سازید. در ظرف و یا بیکس استریل را فقط به هنگام ضرورت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن بردارید زیرا جریان هوا ممکن است میکروب‌ها را به داخل ظرف انتقال دهد. در ظرف را طوری نگاه دارید که سطح زیرین آن رو به پایین باشد نگاه داشتن در این وضعیت، احتمال آلودگی سطح زیرین را در تماس با میکروب‌های موجود در هوا و اشیاء غیر استریل کمتر می‌کند. در ظرف را تنها در موقع ضروری به صورت وارونه روی سطح قرار دهید زیرا تماس قسمت استریل در ظرف با سطح غیر استریل، آن را آلوده می‌سازد.

در صورت مصرف نشدن وسایل استریل که از داخل بیکس برداشته اید آنها را دوباره به داخل بیکس بر نگردانید.

بیشتر از نصف ظرف پنس اسباب گیر باید پر از محلول ضد عفونی کننده باشد.

(قسمت‌های خارج از محلول ظرف غیر استریل حساب می‌شود)

اگر پنس به صورت استریل بسته‌بندی شده باشد باید به هنگام خارج کردن دقت شود که نوک آن با قسمت خارجی پوشش تماس نداشته باشد.

به هنگام کار کردن با پنس استریل هرگز نباید نوک آن را رو به بالا گرفت. زیرا این کار موجب جریان یافتن محلول به طرف دسته‌های غیر استریل و بازگشت آن به طرف محل استریل می‌شود.

ریختن مایعات استریل از ظرفی به ظرف دیگر

هدف: پس از یادگیری روش کار باید بتوانید:

مایعات استریل را بدون آلوده کردن آنها و میدان استریل داخل ظرف استریل بریزید.

توجیه روش	روش کار
شستن دست‌ها از انتقال میکروب‌ها جلوگیری می‌کند.	دست‌ها را بشویید.
مرتب کردن وسایل داخل بسته موجب تسهیل در انجام کار می‌شود.	بسته استریل را باز کرده، وسایل داخل آن را با استفاده از پنس حمل و نقل مرتب نمایید و ظرف استریل شستشو را برای ریختن محلول در دسترس قرار دهید.
با کنترل بر چسب از صحت محلول مورد نظر و استریل بودن آن اطمینان حاصل می‌گردد.	بطری محلول استریل را که در خارج از میدان استریل روی تراالی قرار داده اید بردارید و برچسب آن را بخوانید. (کنترل بار اول)
	در بطري محلول را برداشته، بدون لمس کردن قسمت داخلی، آن را طوری روی سطح تمیز قرار دهید که سطح داخلی آن رو به بالا باشد وارونه نگاه داشتن در بطري و عدم لمس قسمت داخل آن از غیر استريل شدن در بطري جلوگيری می‌کند.

توجیه روش	روش کار
بالا نگاه داشتن بر چسب، از آلوده شدن آن به هنگام ریختن محلول پیشگیری می‌کند.	سپس بطری را طوری در دست نگاه دارید که بر چسب آن رو به بالا و به طرف کف دست باشد تا پیش از ریختن محلول داخل ظرف استریل بار دیگر بر چسب را باخوانید(کترل بار دوم) ۱ تا ۲ میلی لیتر از محلول را در داخل ظرف قلوهای شکل خالی کنید. سپس بطری محلول را حدود ۱۵ تا ۱۵ سانتی متراز کاسه یا ظرف استریل نگاه دارید. طوری که فقط دهانه آن در بالای میدان استریل قرار گیرد.
خالی نمودن ۱ تا ۲ میلی لیتر از محلول موجب تمیز شدن دهانه بطری می‌شود. حفظ ارتفاع باعث می‌شود که دست با میدان استریل تماس پیدا نکند.	مابع را به آرامی بدون پاشیده شدن به اطراف، به داخل ظرف بریزید.
این عمل باعث می‌شود که در اثر رطوبت میکروب‌های سطح تمیز زیر بسته استریل به داخل میدان استریل نفوذ نکند.	دور دهانه بطری را در صورت آغشته شدن محلول بوسیله گاز استریل تمیز کنید و در آن را محکم بندید.



پانسمان زخم‌های تمیز


هدف: پس از یادگیری روش کار باید بتوانید: محل زخم را با رعایت اصول صحیح پانسمان نمایید.

وسایل لازم: بسته پانسمان استریل شامل: ظرف قلوهای شکل، کاسه استریل، دو عدد پنس، یک عدد پنس، مقداری گاز شستشو، ظروف محتوی محلول ضد عفونی کننده، دستکش استریل در صورت لزوم، دستکش یک بار مصرف تمیز، قیچی استریل در صورت لزوم، محلول‌های شستشو طبق دستور، چسب و قیچی و باند در صورت نیاز، کیسه پلاستیکی، مشمع و رویه آن، پاراوان، تراالی و یا سینی برای حمل وسایل.

توجیه روش	روش کار
این عمل نوع پانسمان را مشخص می‌سازد.	در صورت وجود داشتن، دستور پزشک را برای انجام پانسمان کترل کنید.
روش کار را برای بیمار توضیح دهید و در مورد داشتن	

روش کار	توجیه روش
حساسیت نسبت به محلول‌های ضد عفونی کننده و نوار چسب سوال کنید.	با پرسیدن سابقه حساسیت، از بروز عوارض احتمالی پیشگیری می‌شود.
دست‌ها را بشویید.	شستن دست‌ها از انتقال میکروب‌ها جلوگیری می‌کند.
وسایل را آماده کنید.	این عمل موجب سازمان دهی در کارها می‌شود.
در و پنجره را بسته و با استفاده از پاراوان برای بیمار محیط خلوت ایجاد کنید.	این کار موجب حفظ حرمت بیمار شده و حرکت میکروب‌های موجود در هوا را می‌کاهد.
بیمار را در وضعیت راحت قرار داده سپس او را طوری پوشانید که فقط محل زخم باز باشد.	این عمل از باز بودن غیر ضروری جاهای دیگر جلوگیری می‌کند.
مشمع و رویه را زیر بیمار پهن کنید.	این کار از آلوده شدن ملحفه و لباس جلوگیری می‌کند.
کیسه پلاستیکی یک بار مصرف را در دسترس قرار دهید و لبه‌های آن را به بیرون تا کنید.	این عمل از آلوده شدن سطح بیرونی کیسه به هنگام ریختن پانسمان‌های کنیف در داخل آن جلوگیری می‌کند.
ماسک را به طور صحیح پوشید.	این کار از انتشار میکروب‌ها به داخل زخم جلوگیری می‌کند.
چسبهای اطراف پانسمان را شل کنید. برای این کار با یک دست پوست را به طرف خود و با دست دیگر چسب را در جهت مخالف کشیده سپس آن را روی خود تا کنید. چنانچه پانسمان خشک و به پوست چسبیده است توسط مقداری نرمال سالین آن را مرطوب کرده و سپس بردارید. طرف کثیف پانسمان را از دید بیمار دور نگاه دارید.	با این کار چسبها به راحتی از روی پوست جدا می‌شوند. نرمال سالین برداشتن پانسمان را راحت‌تر می‌سازد.
با استفاده از پنس و گاز آغشته به ماده ضد عفونی زخم را از بالا به پایین و یا از مرکز به طرف خارج تمیز کنید. به هنگام شستشو تمام سطح گاز را بچرخانید.	این کار باعث به حداقل رساندن آلودگی می‌شود.



توجیه روش	روش کار
با این عمل از آلوده شدن پنس جلوگیری می‌شود.	گاز کهیف را بدون تماس پنس با کناره‌های کیسه داخل آن بیندازید و از هر گاز فقط یک بار استفاده کنید.
با این عمل از انتقال آلوگی اطراف زخم به داخل آن جلوگیری می‌شود.	در صورت داشتن بخیه، اطراف خط بخیه را تا قسمتی که توسط پانسمان پوشیده می‌شود تمیز کنید.
زیرا رطوبت، محیط مناسبی برای رشد میکروب‌ها آمده می‌شارد.	محل شستشو داده شده را مجدداً با گاز خشک کنید.
با این کار از انتقال آلوگی پیشگیری می‌شود.	با استفاده از پنس استریل چند لایه گاز روی زخم گذاشته سپس وسایل استفاده شده را داخل لگن حاوی محلول ضد عفونی کننده قرار دهید.
این عمل از جایه‌جا شدن پانسمان جلوگیری می‌کند. 	چسب را به شکل نوار به عرض حدود ۲/۵ سانتی متر بریده و سپس آن را روی قسمت مرکزی پانسمان قرار دهید و با فشار مساوی در دو طرف خط وسط به پوست بچسبانید و پانسمان را ثابت کنید.
	مشمع و رویه را بردارید و پس از مرتب کردن لباس بیمار، اتاق را ترک کنید.
شستن دست‌ها از انتقال میکروب جلوگیری می‌کند.	دست‌ها را بشویید.
این عمل موجب سازمان دهی در کارها می‌شود.	وسایل را جمع کرده و تراالی پانسمان را برای استفاده مجدد آماده سازید.
کامل بودن ثبت اقدامات انجام شده در صحیح انجام شدن پیگیری و اقدامات بعدی تاثیر فراوان دارد.	انجام پانسمان، وضعیت زخم، وجود هر گونه التهاب، نوع و میزان ترشحات را در صورت وجود در دفتر ثبت نام بیماران یادداشت کنید.

پانسمان و بانداز فشاری

زمانی به کار برده می‌شود که در محل زخم، خونریزی فراوان جریان داشته باشد.
وسایل لازم: ۱- مژر همراه با فورسپس حمل و نقل، ۲- بیکس محتوی گاز استریل، ۳- بسته پانسمان، ۴- دستکش استریل، ۵- باند کشی و معمولی در اندازه مناسب ۶- قیچی و چسب

توجیه روش	روش کار
این عمل موجب رفع ترس و نگرانی می‌شود.	محل خونریزی را تعیین کنید و به مصدوم و یا اطرافیان اطمینان دهید که با اقدامات فوری خونریزی متوقف خواهد شد. وسایل را آماده کرده و بر بالین مصدوم بیاورید.
این عمل جریان خون را به محل خونریزی کاهش می‌دهد.	اندام خونریزی دهنده را بالاتر از سطح قلب قرار دهید.
باین کاراز انتقال آسودگی به زخم جلوگیری می‌شود.	بسته پانسمان را باز کرده، با استفاده از پنس حمل و نقل از داخل بیکس، گاز اضافی استریل را در بسته قرار دهید.
فشار مستقیم اولین قدم در بند آوردن خونریزی است.	دستکش استریل بپوشید. با یک دست و با گاز مستقیماً به محل خونریزی فشار وارد کنید.
این امر موجب کنترل خونریزی می‌شود.	اگر خونریزی ادامه داشت چند عدد گاز استریل دیگر در محل خونریزی بگذارید.
باند کشی سبب ایجاد فشار و حفظ پانسمان در محل می‌ردد.	از فردی کمک بخواهید تا فشار بر روی زخم را ادامه دهد تا شما محل پانسمان را با وارد کردن فشار مناسب باند پیچی کنید. با استفاده از نوار چسب تمام سطح باند پیچی شده را چسب بزنید.
	در صورتی که از باند کشی استفاده می‌کنید آن را به شکل ۸ لاتین روی پانسمان بپیچید (بانداز را به صورت ضربه‌ای انجام دهید)

توجیه روش	روش کار
<p>این کار موجب کاهش انتقال آلودگی می‌شود.</p> <p>این کار موجب تشخیص شوک ناشی از کم شدن حجم خون می‌شود.</p> <p>بستن زخم در عین محکم بودن، باید چنان باشد که جریان خون شریانی مسدود شود.</p>	<p>دستکش‌ها را در آورده، وسایل را جمع کرده و دست‌ها را بشویید.</p> <p>علائم حیاتی فرد را کنترل کنید.</p> <p>در قسمت‌های پایینی زخم، نیض‌های انتهایی بدن را کنترل کنید.</p> <p>فرم ارجاع فوری را تکمیل کرده و ترتیب انتقال فوری مصدوم را به مراکز بالاتر بدهید.</p>

نکات قابل توجه در انواع پانسمان‌ها

- به هنگام کار کردن با وسایل استریل، برای جلوگیری از آلوده شدن، آنها را باید از لباس خود و یا سایر وسایل آلوده دور نگاه داشت.
- به هنگام کار، باید دست را از روی میدان استریل و یا زخم عبور داد.
- از حوزه و مکان استریل دور نشوید و به آن پشت نکنید زیرا ممکن است دور از چشم شما مکان و یا وسیله آلوده شود.
- از صحبت کردن، سرفه و عطسه بر روی حوزه و یا وسیله استریل خودداری کنید. زیرا ممکن است محل و ابزار با ذرات موجود در ترشحات دهان و بینی آلوده شوند.
- اشیاء استریل را بالاتر از کمر خود نگاه دارید تا در معرض دید بوده و از آلودگی اتفاقی آن جلوگیری شود.
- برای باز کردن بسته‌های استریل، نخست لبه خارجی بسته را که دور از بدن قرار دارد باز کنید تا از تماس سطح استریل با روپوش جلوگیری شود و نیازی به دراز کردن دست روی بسته استریل نباشد.
- از ریختن محلول بر روی پارچه و یا کاغذ خودداری کنید زیرا رطوبت به درون میدان استریل نفوذ کرده و میکروب‌ها را به همراه می‌آورد.
- هرگز از ابزاری که در استریل بودن آن شک دارید استفاده نکنید زیرا ممکن است بیمار دچار عفونت شود.

-دستها را نمی‌توان استریل کرد. بنابر این برای دست زدن به ابزار استریل از پنس و یا دستکش استفاده کنید.

-اولین پانسمان بعد از عمل جراحی توسط پزشک انجام می‌شود. در صورتی که تعویض پانسمان همراه با درد باشد باید طبق دستورالعمل به بیمار مسکن داده شود.

-برداشتن سریع و ناگهانی پانسمانی که به زخم چسبیده، موجب ناراحتی بیمار و خونریزی می‌شود.

-به هنگام انجام پانسمان فشاری باید به نوع خونریزی توجه کرد. در خونریزی شریانی خون قرمز روشن، جهش دار و موج دار است و در خونریزی وریدی، خون قرمز تیره و با جریان آرام است. در خونریزی مویرگی، خون به شکل تراوش خون قرمز تیره است که خود به خود کنترل می‌شود.

-در صورت دستور پزشک برای شستشوی زخم به منظور خارج نمودن ترشحات و بافت مرده از آن باید به روش زیر عمل نمود:

الف- پس از کشیدن محلول شستشو در داخل سرنگ در سمتی که شستشو داده می‌شود، یک عدد ظرف قلوهای شکل در زیر زخم گذاشته می‌شود.

ب- در حالی که انتهای سرنگ را با فاصله ۳ تا ۵ سانتی متر از زخم نگاه داشته، محلول را به تدریج روی زخم می‌ریزند تا بافت مرده و ترشحات به همراه محلول شستشو از زخم خارج شود

-در صدمات چشم از جمله ضربه‌های وارد بر آن، باید پانسمان بدون فشار انجام گیرد و در جهت محافظت پانسمان از بانداز مناسب استفاده شود.

-در پانسمان زخم‌های ترشح دار، زخم را باید همواره از نظر وجود التهاب، عفونت، وضعیت بخیه‌های احتمالی، میزان ترشحات و تعداد گازهای آغشته به ترشحات باید کنترل نمود.

-پانسمان را چنان باید انجام داد که ترشحات به طرف ضخیم‌ترین قسمت پانسمان سرازیر شوند. ترتیب قرار گرفتن قسمت کلفت پانسمان بستگی به وضعیت خوابیدن و یا نشستن بیمار و راه رفتن او دارد.

-دفعات تمویض پانسمان طوری باید باشد که محل پانسمان از ترشحات خیس نشود زیرا که خشک و تمیز نگاه داشتن پوست از تحریکات و تخریب بافت جلوگیری می‌کند.

-در صورتی که زخم ترشحات زیادی داشته باشد پوست اطراف زخم را از داخل به خارج با آب و صابون بشویید و خشک کنید.

-به هنگام تمیز کردن زخم، گاز و یا گلوله پنبه آغشته به محلول ضد عفونی کننده را به طور دورانی از وسط زخم به خارج حرکت دهید و هر قطعه پنبه را فقط یک بار استفاده کنید. این عمل مانع انتقال میکروب‌ها از پوست به زخم می‌شود.

-پانسمان نباید خیلی محکم بسته شده و باند پیچی شود و باید نسبتاً شل بسته شود تا هوا بهتر جریان پیدا کند و در نتیجه از تحریک پوست پیشگیری شود و مقداری از رطوبت و حرارت زیر پانسمان تبخیر شود.

-گازها، باندهای زخم بندی قبلی و پنبه‌هایی را که برای تمیز کردن زخم به کار رفته‌اند را یک کیسه رطوبت‌ناپذیر جمع کنید تا با سایر مواد آلوده دفع شوند (بهتر است که سوزانده شوند) باید دقیق کرد که سطح خارجی کیسه رطوبت‌ناپذیر آلوده نشود.

-بعضی از افراد به نوار چسب حساسیت دارند که باید به هر گونه ناراحتی و یا علامتی که مربوط به استفاده از نوار چسب است توجه نمود: مانند قرمزی پوست، ورم و تشکیل تاول که در این موارد می‌باشد از چسب ضد حساسیت استفاده کرد و یا پانسمان را با باند ثابت نمود.

-اگر باید از نوار چسب در قسمتی از بدن که مو دارد استفاده شود، توصیه می‌شود که موهای آن ناحیه را قبیل از به کار بردن چسب کاملاً کوتاه نمایید. در غیر این صورت برداشتن نوار چسب برای بیمار دردناک می‌شود.

در بچه‌های کم سن و سال جهت نگهداری پانسمان و یا جلوگیری از آلودگی زخم‌ها باید دست‌های آن‌ها با استفاده از جوراب بسته شود. به بیمار باید آموزش داد که در هنگام فعالیت و تغییر وضعیت (عطسه، سرفه، حرکات ناگهانی) محل زخم را با دست حمایت کند.

موارد نیاز به انجام واکسیناسیون و یا تزریق سرم ضد کزاز در افراد مجروح و دچار آسیب دیدگی

هر زخمی خطر عفونی شدن را دارد اما خطر عفونت کزاز در زخم‌های کثیف، بویژه زخم‌هایی که در محل‌های آلوده (باغچه، طویله و.....) همچنین در زخم‌های عمیق که دارای بافت‌های مرده است و یا زخم‌هایی که در آن شیء خارجی فرو رفته است بیشتر است. که در اینصورت باید واکسن تواأم را به بیمار تزریق کنید. یک نوبت تزریق در همان روز (در صورتی که قبلًا واکسن تواأم بطور کامل دریافت کرده باشد) کافی است. اگر اطمینان به سابقه واکسیناسیون کامل در مصدوم ندارید پس از تمیزکردن و پانسمان زخم اورا بلا فاصله برای تزریق سرم ضد کزاز به مرکز بهداشتی درمانی ارجاع فوری دهید.

باندپیچی و اصول انجام آن

باند تنزیب و یا پارچه‌ای است که برای پیچیدن به دور قسمتی از بدن به کار می‌رود. باند معمولاً از پارچه کرکی و یا الیاف مصنوعی ساخته می‌شودو باندهایی که از الیاف مصنوعی ساخته می‌شوند معمولاً کشی هستند. باندهای کشی برای ایجاد فشار در محل، ثابت و محکم نگاه داشتن پانسمان و بی حرکت کردن عضو یا اندام به کار می‌روند. این نوع باندها به علت خاصیت ارتجاعی که دارند بسیار محکم هستندو به آسانی مناسب عضو یا اندام شکل می‌گیرند. این باندها قابل شستشو هستند و می‌توان بارها از آن استفاده کرد.

اهداف باند پیچی

- ۱- ثابت نگاه داشتن پانسمان و آتل در جای خود
- ۲- ایجاد فشار مستقیم روی پانسمان زخم برای کنترل خونریزی
- ۳- محدود کردن حرکت و یا بی حرکت کردن عضو آسیب دیده
- ۴- محافظت و یا پوشاندن عضو و اندام مجروح و در نتیجه تسريع در التیام عضو آسیب دیده

نکاتی که در هنگام باند پیچی عضو می باشد که رعایت شود:

- ۱- محلی که باید باند پیچی شود لازم است تمیز و خشک شود.
- ۲- در صورت امکان از باندی که منافذ درشت داشته باشد استفاده کنید تا هوا در زیر پانسمان جریان پیدا کند و حرارت و رطوبت راه خروج داشته باشد.
- ۳- باند پیچی را چنان انجام دهید که در زیر پانسمان، دو سطح پوست با هم تماس نداشته باشند به این منظور می توان از موادی که قابلیت جذب دارندمانند یک قطعه گاز استفاده کرد. برای مثال به هنگام باند پیچی انگشتان دست و پا باید قبل از باند پیچی، یک قطعه گاز را بین انگشتان قرار داد تا از ساییدگی پوست دو انگشت بر هم جلوگیری شود. قسمت های دیگری که به این نوع مراقبت نیاز دارند زیر بغل، زیر پستان، چین خوردگی کشاله ران و شکم هستند.
- ۴- بر جستگی های استخوانی که در زیر باند پیچی قرار می گیرند باید با پنبه و یا گاز پوشیده شوند. همچنین قسمت های گود و تو خالی قبل از باند پیچی بهتر است با پنبه و یا گاز پر شوند تا هم بیمار راحت تر باشد و هم به قسمت باند پیچی فشار یکنواخت وارد شود.
- ۵- اگر باند پیچی به منظور کم کردن حرکت عضو و یا ثابت نگاه داشتن عضو به کار می رود باید عضو و یا اندام مورد نظر، قبل از باند پیچی در وضعیت راحت و مناسب قرار بگیرد تا پس از باند پیچی از تغییر شکل آن عضو جلوگیری شود. به عنوان مثال

- در باند پیچی مفصل باید مفصل در وضعیت کمی خمیده نگاه داشته شود و از کشیده شدن مفصل به هنگام باند پیچی اجتناب شود.
- ۶- باند باید با فشار کافی به عضو پیچیده شود تا باعث محافظت اندام شود ولی باید در نظر داشت که فشار ناشی از باند جریان طبیعی خون را مختل نکند.
- ۷- در صورتی که دست و پا را باند پیچی می کنید حتی امکان انگشتان دست و پارا آزاد و خارج از باند قرار دهید تا بتوانید به آسانی علائم اختلال در جریان خون را تشخیص دهید. علائم مختل شدن جریان خون در یک ناحیه از بدن عبارتند از سردی، بی حسی، کرختی، تورم، کبود شدن پوست انگشتان و سوزن سوزن شدن آن.
- ۸- باند پیچی دست و پا از قسمت پایین شروع شود و به طرف بالا ادامه یابد تا از تجمع خون و یا اختلال در گردش خون در قسمت های انتهایی دست و پا جلوگیری شود.
- ۹- باند به اندازه کافی در محل ثابت و محکم شود تا از باز شدن باند و ساییدگی پوست بیمار جلوگیری شود.
- ۱۰- باند پیچی کردن روی پانسمان مرطوب و یا زخمی که دارای ترشح است نباید زیاد محکم باشد زیرا چنانچه باند خیس شود ممکن است آب رفتگی پیدا کرده و تنگتر شود.
- ۱۱- گره، گیره و یا سنجاقی را که برای اتصال انتهای باند به کار می رود باید در محلی دورتر از زخم و یا ناحیه دچار التهاب قرار داده شود.
- ۱۲- قسمت باند پیچی شده در دفعات معین باید از نظر وضعیت زخم، ترشحات، فشار احتمالی بر عضو بررسی گردد.
- ۱۳- اگر بانداز به کشاله ران یا زیر بغل می رسد همیشه محافظتی در این محل ها بگذارد تا مانع بریدگی پوست بوسیله لبه باند شود.
- ۱۴- هیچگاه روی برجستگی های استخوانی گره نزنید و باند را برنگردانید.


انواع بانداز

- ۱-بانداز با باند نواری
- ۲-بانداز با باند سه گوش
- ۳-بانداز با باند چهار سر

حلقه باند نواری: عبارت است از باریکه پارچه‌ای که به دور خود پیچیده شده باشد. باندهای حلقه‌ای در اندازه‌های مختلف در دسترس هستند و نوع باند مورد استفاده بسته به عضوی که باید باند پیچی شود و چاق و یا لاغر بودن، فرق می‌کند.

قبل از به کار بردن باند حلقه‌ای از محکم پیچیده بودن آن مطمئن شوید و به عرض باند توجه نمایید که آیا برای کار شما مناسب هست و یا خیر، جلوی عضوی که می‌خواهد آن را باند پیچی کنید بایستید و آن عضو را با دست در موقعیتی که پس از باند پیچی باید قرار بگیرد نگهدارید. سر باند را کاملاً بالا بگیرید و در هر لحظه فقط چند سانتی متر از باند را باز کنید. برای باند پیچی دست و یا پای چپ باند را در دست راست و برای باند پیچی دست و یا پای راست باند را در دست چپ خود نگهدارید. همیشه از داخل به بیرون و از پایین به بالای محل جراحت باند پیچی کنید.

اندازه متوسط باند حلقه‌ای برای باند پیچی اعضاء مختلف مصدوم بالغ	
عرض باند	عضوی که باید باند پیچی شود
۲/۵ سانتی متر	انگشت
۵ سانتی متر	دست
۵-۶ سانتی متر	بازو
۷/۵-۹ سانتی متر	پا
۱۰-۱۵ سانتی متر	بالاتنه



کار برد باند حلقه‌ای: از بانداز حلقه‌ای یا مدور برای باند پیچی قسمت‌های مختلف بدن مثل انتهایها و یا مج که دارای قطر یکسان هستند استفاده می‌شود. در این روش باند به صورت

حلقه به دور عضو پیچیده می‌شود. نوار درست به نقطه‌ای که دور اول شروع شده بود، بر می‌گردد، دور دوم کاملاً روی دور اول و دور سوم روی دور دوم قرار می‌گیرد و به همین نحو باند پیچی ادامه پیدا می‌کند.


روش کار

۱- اندامی که بانداز می‌کنید بالاتر از سطح قلب نگاه دارد (این کار از رکود خون در اندام و در نتیجه تورم آن جلو گیری می‌کند).



۲- حلقه باند را در دست مسلط گرفته و انتهای آن را به اندازه ۸ سانتی متر باز کنید.


۳- بانداز را از قسمت پایین اندام شروع کرده و ابتدای باند را که باز کرده‌اید با انگشت شست دست غیر مسلط در قسمت جلوی محل بگیرید و برای ثابت کردن ابتدای باند در محل آن را به حالت کشش دو بار دور اندام پیچید و انگشت شست را بردارید.



۴- باند پیچی را ادامه داده و هر لایه را روی لایه قبلی بپیچید. باند پیچی به صورت صاف نگاه دارد.

۵- انتهای باند را ثابت کنید.

بانداز مارپیچی



۱- سه بند اول باند پیچی مدور را تکرار کنید

۲- چند بار به صورت مارپیچ رو به بالا، باند را به دور عضو آسیب دیده ببندید. به طوری که هر پیچش دو سوم از پیچش قبلی را بپوشاند و لبه‌های بیرونی تقریباً به موازات یکدیگر قرار بگیرند. (این عمل فشار مناسب روی اندام اعمال می‌کند)

۳- آخرین دور را نه اریب، بلکه مستقیم پیچ بزنید و انتهای باند را محکم کنید.

۴- گردش خون را کنترل کنید. در مورد سفت و شل بودن باند از فرد سوال کنید اگر خیلی سفت بود فوراً آن را شل کنید.

توجه: هرگز ابتدای باند را به طور مستقیم روی زخم و یا نقاط استخوانی قرار ندهید.

طریقه محکم کردن انتهای باند


- ۱- انتهای باند را فراتر از پانسمان زیرین تا بزنید
 - ۲- آن را با سنجاق قفلی، نوار چسب و یا کلیسیس‌های مخصوص باند، در سر جای خود محکم کنید
- اگر سنجاق، نوار چسب و یا کلیسیس در اختیار نداشتید می‌توانید انتهای باند را گره پاپیونی بزنید تا بتوان براحتی این گره را باز کرد.
- در ضمن اطمینان حاصل نمایید که گره روی استخوان و یا پوست فشار وارد نمی‌کند.

بانداز به شکل ۸ لاتین

بانداز به شکل ۸ لاتین برای بی‌حرکت کردن مفاصل مج دست، آرنج، زانو و مج پا استفاده می‌شود.


- ۱- سه بند اول بانداز مدور را تکرار کنید
- ۲- در صورتی که باند پیچی روی مفصل انجام می‌شود پس از ثابت کردن ابتدای آن در محل، باند را به طرف بالای مفصل حرکت داده و به سمت پشت اندام عبور دهید (با این عمل به طور کامل مفصل محافظت می‌شود)
- ۳- باند پیچی را در قسمت بالا و پایین مفصل مورد نظر به شکل هشت لاتین ادامه دهید تا به طور کامل تمام سطح مفصل پوشانده شود.

۴- پس از اتمام باند پیچی در قسمت بالای مفصل، باند را دو بار به صورت مدور پیچید.




بانداز یک انگشت :

با استفاده از باند نواری مناسب چند سانتی متر ابتدای باند را بطور ازاد خارج از دست در انتهای شست نزدیک مج قرار داده و باند را از روی دست و دور مج عبور داده، سپساز روی باند گذرانده به سمت انگشت مورد نظر ببرید .
بقیه مراحل را مطابق شکل عمل نمایید.




بانداز انگشت شست :

ابتدا باند نواری را در انتهای انگشت شست نزدیک مج قرار می دهیم. باند پس از یک بار گردش دور مج دست ان را طوری از محل بین انگشت شست و نشانه عبور می دهیم که ابتدای باند را گرفته و ان را ثابت نماییدو سپس باند را دور انگشت می پیچیم و از روی شست به پشت دست می آوریم . بقیه مراحل را مطابق شکل عمل نمایید.



بانداز مخصوص سر و انتهای اندام(به صورت برگردان)

- ۱-باند را در دست مسلط نگاه داشته و باند پیچی را با ثابت کردن ابتدای باند در قسمت بالای محل مورد نظر شروع کنید(در بانداز سر،باند را دو بار روی پیشانی به صورت مدور بپیچید).
- ۲-انگشت شست دست غیر مسلط خود را در قسمت جلو و وسط بانداز مدور قرار داده و لوله باند را به طرف پایین و عقب عضو حرکت دهید و در قسمت پشت،آن را با انگشت اشاره دست غیر مسلط نگاه دارید.
- ۳-دوباره باند را از قسمت پشت عضو به طرف جلو بیاورید تا عضو را دور بزند و لایه جدید در سمت راست لایه قبلی قرار گرفته، $\frac{2}{3}$ آن را بپوشاند.
- ۴-یک بار دیگر باند را از سمت چپ لایه مرکزی عبور دهید تا عضو را دور بزند.
- ۵-باند پیچی را به طور متناوب در سمت راست و چپ ادامه دهید به نحوی که هر لایه جدید روی $\frac{2}{3}$ لایه قبلی را گرفته و به طور کامل محل را بپوشاند.
- ۶-بانداز را با دو بار پیچیدن مدور روی لایه های باند خاتمه دهیدو قسمت انتهایی باند را حدود $\frac{2}{5}$ سانتی متر به زیر تا کرده و یا با استفاده از گیره و یا نوار چسب آن را ثابت کنید.(با این عمل بانداز ثابت خواهد شد).



باند سه گوش(مثلثی شکل)

باند سه گوش از پارچه کتان در ابعاد مختلف تهیه می‌شود برای بزرگسالان یک پارچه چهار گوش به ابعاد ۱ متر در یک متر را به دو قسمت مساوی تقسیم می‌کنند تا باند سه گوش بدست بیاید.

باند مثلثی برای شکستگی قسمت بالای دست و گاهی موارد برای جراحات‌های سینه به کار می‌رود. با این باند می‌توان ساعد را روی سینه محکم کرد.

روش کار

۱- از مصدوم بخواهید که بنشیند و ساعد دست آسیب دیده را طوری نگاه دارد که مچ و انگشتان کمی بالاتر قرار گیرند.


۲- یک سر باند مثلثی را از بین دست و سینه مصدوم عبور دهید. به طوری که راس باند کاملاً فراتر از آرنج قرار گیرد.

۳- انتهای باند را از روی شانه دست سالم عبور دهید و آن را تا جلوی شانه قسمت آسیب دیده بکشید.

۴- در حالی که هنوز مصدوم دست خود رانگاه داشته انتهای پایینی را از کنار دست و ساعد بالا بکشید و در حفره ترقوه شانه قسمت آسیب دیده، دو سر باند را گره بزنید.

۵- راس باند را در قسمت آرنج برگردانید و آن را به قسمت جلوی باند سنjac کنید


۶- گردش خون را کنترل کنید اگر اختلالی در آن به وجود آمده بود بانداز یا وضعیت باند شکسته بندی را مجدداً تنظیم کنید.




از باند سه گوش، همچنین برای باند پیچی فرق سر هم استفاده می شود که برای نگاه داشتن پانسمان در جراحت های فرق سربه کار می رود.

روش کار



- ۱- باند مثلثی شکل را از لبه قاعده تا کنید قاعده باند را روی پیشانی قرار دهید به طوری که مرکز قاعده کمی بالاتر از ابروها قرار گیرد و راس باند را پشت سر آویزان کنید.
- ۲- دو انتهای باند را پشت سر محکم بکشید به طوری که لبه های باند کمی بالاتر از گوش ها قرار گیرد.
- ۳- دو انتهای آن را از بالای راس باند که در پشت گردن قرار دارد رد کنید و آن ها را به طرف جلو بیاورید
- ۴- دنباله را روی پیشانی نزدیک قاعده گره بزنید و راس را روی سر بر گردانید و آن را به باند در قسمت بالای سر محکم کنید



باندهای سه گوش را می توان به صورت کیسه در آورد و برای پوشاندن پانسمان دست و پا استفاده کرد.




همچنین از باند سه گوش می‌توان برای بستن سینه و پشت، شانه‌ها، ناحیه باسن و کشاله ران استفاده کرد.




باند کراواتی: همان باند سه گوش است که آن را از راس روی هم تا کنند تا باندی با پهناهی مورد نظر بدست آید. از این باند برای باند پیچی سر، دست و پا می‌توان استفاده کرد.

همچنین از این باند می‌توان برای محکم کردن پانسمان در سر جای خود در ناحیه مفصل (مانند دور قوزک و یا مج) استفاده کرد. نیز برای باند پیچی به شکل لاتین دور پا و قوزک برای حرکت نگاه داشتن پای شکسته استفاده نمود.




نحوه درست کردن آن به قرار زیر است.




باند مثلثی برای بالا نگاه داشتن دست

در مواردی که دست دچار خونریزی شده و یا سینه جراحت برداشته یا شانه آسیب دیده است برای خوب بالا نگاه داشتن دست و ساعد از باند مثلثی استفاده می‌شود.

تصاویر	روش کار
	<p>از مصدوم بخواهید که بنشیند و دست آسیب دیده را طوری نگاه دارد که ساعد روی سینه و نوک انگشتان تقریباً روی شانه مقابل باشد.</p>
	<p>باند مثلثی را روی ساعد و دست بگذارید به طوری که راس آن کاملاً فراتر از آرنج و قسمت بالای آن روی شانه سالم قرار بگیرد.</p>
	<p>در حالی که مصدوم دست خود را نگاه داشته است با ملایمت قاعده باند را از زیر دست، بازو و آرنج مصدوم رد کنید.</p>
تصاویر	روش کار
	<p>انتهای بالای باند را به پشت مصدوم ببرید و تاجلوی شانه سالم بکشید. در صورت لزوم با ملایمت بلندی باند را میزان کنید و روی شانه سالم در جلوی حفره ترقوه دو انتهای باند را به صورت مربعی گره بزنید</p> <p>راس آزاد باند را بین بازو و قسمت جلویی تو بزنید</p> <p>گردش خون را کنترل کرده اگر اختلالی مشاهده کردید بانداز و یا وضعیت شکسته بندی را مجدد تنظیم کنید</p> <p>یک بار بلافصله پس از باند پیچی و یک بار هم ده دقیقه بعد از آن آزمایش کنید. به این صورت که یکی از ناخن‌های دست و یا پای باند پیچی شده را فشار دهید تا کاملاً سفید شود؛ زیر ناخن باید سریعاً به حالت صورتی برگردد که نشان‌دهنده جریان دوباره خون است. اگر ناخن همچنان سفید و یا کبود باقی ماند یا انگشت به طرز غیر طبیعی خیلی سرد بود نشان دهنده آن است که باند خیلی تنگ بسته شده است</p>

باند دنباله دار (باندچهار سر یا چهار گوش):



عبارت است از یک قطعه پارچه مستطیل شکل که دنباله‌های متعددی به عرض ۵ سانتی متر به آن وصل می‌شود. در نوع چهار دنباله‌ای، دو دنباله در یک طرف و دو دنباله در طرف دیگر قرار می‌گیرد. از این نوع باندها برای محکم و ثابت نگاه داشتن پانسمان بینی و چانه استفاده می‌شود.

باز کردن حلقه باند: اگر از باند استفاده مجدد نشود می‌توان آن را با قیچی برید. در این صورت باید باند را از سمت مقابل زخم از یک طرف به طرف دیگر بریدتا باند یکجا باز و برداشته شود. در مواقعي که باند مجدداً مورد استفاده قرار می‌گيرد باید انتهای آزاد شده باند را روی هم تا کردو سپس آن را با دو دست بتدريج از دور عضو يا اندام باز وروي هم لول کرد تا باند به انتهای برسد.

تمرین نظری

- ۱- دو عارضه مهم زخم‌ها را توضیح دهید.
- ۲- عوارض و نشانه‌ها در زخم‌های عفونی را فهرست نمایید.
- ۳- پنج عامل را که بر روی بھبود زخم اثر منفی دارد لیست نمایید.
- ۴- نکات لازم جهت استفاده از وسائل استریل داخل بیکس را فهرست نمایید.
- ۵- روش کار را در هنگام شستشوی زخم برای خارج نمودن ترشحات و بافت مرده توضیح دهید.
- ۶- اگر زخم ترشحات زیاد داشته باشد برای جلوگیری از تحریک پوست اطراف چه اقداماتی انجام می‌دهیم؟
- ۷- موارد استفاده باندها را توضیح دهید؟

تمرین عملی

- ۱-باند پیچی ناحیه گوش و بینی را با باند دنباله دار انجام دهید.
- ۲-باند پیچی ناحیه پا را با باند سه گوش انجام دهید.
- ۳-باند پیچی ناحیه گردن را با باند کراواتی انجام دهید.
- ۴-باند پیچی انگشتان دست را با باند لوله‌ای(نواری) انجام دهید.
- ۵-باند پیچی ناحیه زانو و آرنج را با باند لوله‌ای(نواری) انجام دهید.
- ۶-طريقه استفاده از بسته پانسمان و بیکس محتوى وسائل استريل را با هم مقایسه نمایيد.

بخش پنجم

تزریقات و انواع آن

اهداف آموزشی

انتظار است پس از یادگیری محتوای این مبحث فراغیر بتواند:

- ۱- انواع تزریق را دسته‌بندی کرده و موارد استفاده از آن را بیان نماید.
- ۲- روش کشیدن دارو از ویال و آمپول را توضیح دهد.
- ۳- وسایل کار مورد نیاز برای انواع تزریقات را فهرست نماید.
- ۴- مراحل انجام کار در تزریق عضلانی، زیرجلدی و داخل جلدی را توضیح دهد.
- ۵- تزریق ایمن را تعریف کرده و مبانی انجام آنرا فهرست نماید.

تزریقات

گاهی اوقات برای رساندن سریع دارو به بدن بیمار و یا در صورتی که از راه دیگری استفاده از دارو غیر ممکن باشد. محلول دارویی باید برای بیمار تزریق گردد.

انواع تزریقات

- تزریق عضلانی (intramuscular)
- تزریق زیر جلدی (subcutaneous)
- تزریق داخل جلدی (intradermal)
- تزریق داخل وریدی (intravenous)
- تزریق داخل مفصلی (Intra Articular)
- تزریق داخل مایع نخاعی (Intra Spinal)

که تزریق عضلانی، داخل و زیر جلد توسط بهورز و برای انجام واکسیناسیون صورت می‌گیردو انجام تزریق وریدی توسط بهورز مطلقاً ممنوع می‌باشد.

وسایل مورد نیاز برای تزریق

سرنگ‌ها

برای تزریق از سرنگ پلاستیکی یک بار مصرف بهتر است که استفاده شود. سرنگ پلاستیکی را به هیچ عنوان نباید دو بار به کار برد. حتی برای یک فرد، سرنگ پلاستیکی همراه با سوزن استریل که باز شده باشد نمی‌توان مدت زیادی (حداکثر برای چند دقیقه) در هوای آزاد نگاه داشت زیرا گردو غبار هوا آن را آلوده می‌کند.


سرنگ از دو قسمت تشکیل شده، یکی قسمت بیرونی که درجه و اندازه روی آن نوشته است و دیگری قسمت داخلی و یا پیستون که با فشار به آن مایع به خارج راه پیدا می‌کند. نباید به پیستون و سوزن که با دارو و بدن بیمار تماس دارند دست زد زیرا آلودگی میکروبی پیدا می‌کنند.

اندازه سرنگ‌ها نیز متفاوت است و از معمولی‌ترین انواع آن سرنگ یک سی سی، دو سی سی، و سرنگ ۵ سی سی است. برای تزریقات عضلانی زیر جلدی و داخل جلدی معمولاً از سرنگ‌های ۱ تا ۵ سی سی استفاده می‌شود.

سرنگ‌های انسولین یک میلی لیتر را در خود جای میدهند و به واحد درجه بندی می‌شوند. بیشتر سرنگ‌های انسولین ۱۰۰ واحدی (۱۰۰) هستند که برای استفاده از صد واحد انسولین هستند. هر میلی لیتر معادل ۱۰۰ واحد می‌باشد. سرنگ‌های ۴۰ واحدی و ۸۰ واحدی انسولین نیز وجود دارد. این گونه سرنگ‌ها برای استفاده از مقادیر کم داروها به کار می‌روند و یا برای انجام تست‌های داخل جلدی از آن‌ها استفاده می‌شود.

سوزن‌ها

سوزن‌ها در بسته بندی جداگانه نیز وجود دارند که می‌توان آن‌ها را انتخاب کرد. هر سوزن سه قسمت دارد



۱- تنه سوزن

۲- محل اتصال سوزن به سرنگ

۳- نوک تیز سوزن

اندازه سوزن‌ها نیز متفاوت است و اندازه‌ها از ۱۸ تا ۲۶ وجود دارد. هر چه شماره سوزن بیشتر باشد قطر سوزن کمتر است. در تزریقات عضلانی از سوزن‌های طویل‌تر باید استفاده کرد. در اشخاص چاق سوزن بلندتری لازم است تا در افراد لاغر، اگر مایع تزریق محلول آبی باشد قطر سوزن باید کمتر و سوزن نازک‌تر باشد. ولی چنانچه مایع روغنی و سفت باشد باید از سوزن ضخیم‌تر و با شماره پایین‌تر که سوراخ گشادتری دارند استفاده شود. در تزریق اطفال باید از سرنگ‌های کوچک‌تر و سوزن‌های نازک‌تر استفاده نمود. به‌طور معمول برای تزریقات عضلانی از سوزن‌های شماره ۲۰-۲۳ استفاده

می‌شود. تزریقات زیر جلدی نیاز به سوزن‌هایی با قطر کمتر دارند مثلاً سوزن شماره ۲۵ و برای تزریق داخل جلدی، سوزن ریزتری با شماره ۲۶ مورد نیاز است.

آمپول‌ها(پوکه‌ها)

آمپول‌ها شامل دوزهای انفرادی دارویی به شکل مایع و یا پودر هستند و به اندازه‌های مختلف موجود هستند. حجم آن‌ها از یک سی سی تا ده سی سی و بیشتر است. یک آمپول معمولاً از یک شیشه شفاف که به یک قسمت تنگ به نام گردن محدود شده و برای کشیدن مایع آمپول این قسمت باید جدا شود تشکیل شده است. خط رنگی که اطراف گردن آمپول هست محلی است که بدون استفاده از تیغ اره و به آسانی شکسته‌می‌شود.


ویال‌ها

ویال‌ها ظرف‌های شیشه‌ای یک دوزی و یا چند دوزی هستند. یک در پوش لاستیکی در قسمت بالا دارنداین قسمت پلاستیکی قبل از مصرف بوسیله یک روپوش فلزی پوشیده شده است. ویال‌ها ممکن است شکل جامد یا مایع دارو را داشته باشند. داروهایی که در صورت محلول ماندن خواص خود را از دست می‌دهند به صورت پودر در ویال قرار می‌گیرند. اتیکت‌های ویال نوع حلال و مقدار آن را مشخص می‌کند. نرمال سالین و آب مقطر استریل حلال‌هایی هستند که به طور معمول در ویال‌ها استفاده می‌شوند. ویال‌های چند دوزی نیاز به نگهداری در یخچال دارند.

تزریق عضلانی (IM)

در تزریق عضلانی محلول را به داخل بافت ماهیچه‌ای وارد می‌کنند. معمولاً میزان محلول تزریقی بین ۲ تا ۵ میلی لیتر می‌باشد. برای تزریق باید جایی را انتخاب کرد که اعصاب و عروق بزرگ در سر راه نباشند تا سوزن به آن‌ها بر خورد نکند. در این نوع

تزریق از سوزن‌های شماره ۲۰ تا ۲۲ با اندازه ۳/۷۵ سانتی متر استفاده می‌شود محل‌های مختلف تزریق به شرح ذیل می‌باشند.



الف-ماهیچه سرینی: از محل‌های مناسب برای تزریق داخل ربع خارجی و بالایی سرین است.

انتخاب محل تزریق برای جلوگیری از صدمات ناشی از آن به قدری حائز اهمیت است که هیچ تزریقی بدون دیدن کامل محل نباید انجام گیرد. در موقع تزریق در ماهیچه سرینی توصیه می‌شود که فرد به روی شکم در حالی که انگشت شست پا به طرف داخل باشد دراز بکشد. این حالت به نمایان شدن کامل محل و همچنین شل شدن عضله کمک می‌کند. در حالت ایستاده محل کاملاً نمایان نیست و ماهیچه معمولاً منقبض است که به ناراحتی بیمار اضافه می‌کند.

توجه: در نوزادان و کودکانی که راه رفتن را هنوز آغاز نکرده‌اند، هرگز از عضله باسن برای تزریق عضلانی استفاده نکنید بلکه تزریق را در عضله قدامی طرفی ران انجام دهید.

ب-عضله پهنه خارجی ران: که در سطح کناری ران قرار دارد. این ماهیچه نسبتاً بزرگ است و عصب و رگ بزرگی در حوالی آن نیست و مفصلی را نمی‌پوشاند. برای تزریق در این محل، باید در حالت دراز کشیده و یا نشسته قرار گرفت. این محل برای تزریق به کودکان مناسب است چون می‌توان ماهیچه را به صورت توده‌ای در دست جمع کرد.




ج- عضله بازو (دلتؤید): این ماهیچه بر آمدگی شانه را تشکیل می‌دهد. به علت کوچک بودن، فقط مقدار کمی از محلول را می‌توان به درون آن تزریق کرد. تزریق نادرست در عضله بازو ممکن است باعث آسیب رساندن به عصب در این ناحیه گردد. مزایای این محل آن است که به آسانی مشخص می‌شود و بیمار می‌تواند به حالت نشسته و یا خوابیده قرار گیرد.




اگر محل تزریق را به صورت مثلث کوچکی در نظر بگیریم یک راس آن را زائد شانه و دو راس دیگر را خط فرضی که از زیر بغل رد می‌شود تشکیل می‌دهد. محل تزریق مرکز این مثلث است که تقریباً ۲/۵-۵ سانتی متر زیر زائد شانه است.

تزریق زیر جلدی (Sc)



تزریق زیر پوستی، محلول دارویی را به داخل بافت زیر پوست می‌فرستد. تزریق زیر پوستی با تزریق زیر جلدی متراffد است. محل تزریق زیر پوستی



معمولاً قسمت بالای بازو است. مholmتداول دیگر ران است. از شکم و پشت نیز می‌توان برای انجام این تزریق استفاده کرد.

برای تزریق زیر جلدی از سوزن شماره

۲۵ و با اندازه $1/25$ یا $1/5$ سانتی متر استفاده می‌شود.

چون بافت‌های زیر جلدی بر خلاف عضلات خون زیادی ندارند جذب دارو در تزریقات زیر جلدی کندتر از تزریق عضلانی است. از راه زیر جلدی فقط باید به مقدار کم دارویی ($0.5-1$ سی سی) محلول در آب تزریق گردد. بافت‌های زیر جلدی نسبت به محلول‌های محرك و حجم‌های زیاد محلول حساس است. تجمع داروها در بافت می‌تواند ایجاد آبسه نماید که به صورت بر جسنگی‌های سفت و دردناک در محل تزریق مشخص می‌شود.

اگر تزریق زیر جلدی مکرر ضروری باشد. تغییر محل تزریق برای اجتناب از ناراحتی بیمار و احتمال صدمه رسیدن به بافت اهمیت دارد. زاویه تزریق، در این نوع تزریق بسته به طول سوزن بین $45-60$ درجه متغیر است.


همچنین عقاید مختلفی در باره اینکه به چه مقدار باید بافت بدن بیمار را بین شست و انگشت اشاره جمع کرد وجود دارد. این تصمیم بستگی به طول سوزن و مقدار چربی و آب پوست فرد دارد. برای افراد لاغر و برای کودکان و نوزادان، جمع کردن بافت بین دو انگشت بر کشیدن پوست محل تزریق برتری دارد.

تزریق داخل جلدی (Id)

تزریق محلول در داخل لایه‌های بالایی پوست را تزریق داخل جلدی می‌گویند. محلی که معمولاً استفاده می‌شود قسمت داخلی ساعد است. مقدار محلول مورد استفاده در این تزریق معمولاً بیش از چند صدم میلی لیتر نیست. سرنگی که برای تزریق داخل جلدی به کار می‌رود جمعاً یک سانتی متر مکعب حجم دارد. برای این سرنگ از سوزن‌های کوتاه

نمره ۲۶ و ۲۷ (اندازه سوزن $1/25$ تا $1/8$ سانتی متر) و در صورت موجود نبودن از سوزن‌های نمره ۲۵ استفاده می‌شود. بریدگی مایل نوک این سوزن‌ها باید کوتاه باشد. برای تزریق، سرنگ و سوزن تقریباً به طور موازی با ساعده نگاه داشته می‌شوند. دخول سوزن خیلی سطحی و در حالی که مقطع مورب سوزن به طرف بالاست انجام می‌گیرد. فقط قسمت نوک سوزن را به داخل پوست فرو می‌کنند. باید توجه داشت که تزریقات داخل جلدی در دنک است و نباید بیش از یک دهم سانتی متر مکعب از ماده مورد نظر تزریق شود.

تزریق داخل جلدی معمولاً برای تشخیص به کار می‌رود. برای مثال آزمون توبر کولین (تست ب ث ژ) و آزمون‌های دیگر برای تعیین میزان حساسیت بیمار نسبت به مواد مختلف



زاویه سوزن در تزریقات عضلاتی، زیر جلدی، داخل جلدی

کشیدن دارو از آمپول و ویال


وسایل لازم:

۱- سرنگ و سوزن استریل، اندازه سرنگ و سوزن بستگی به نحوه تزریق دارو، مقدار محلول دارد.



۲- ظرف پنبه الكلی

۳- ظرف قلوهای شکل

۴- آمپول(دارو) و یا ویال دارویی

توجیه روش	روش
این کنترل باعثمی شود که فعالیت به طور دقیق انجام شود و در وقت صرفه جویی گردد.	وسایل را آماده کنید، آمپول و یا ویال محتوی ماده دارویی را کنترل کنید.
شستن دستها از انتشار میکروب جلوگیری می کند.	دستها را بشویید.
با این عمل دارو از قسمت سر به بدنه آمپول به راحتی بر می گردد.	در حالی که آمپول را به طور عمودی در دست گرفته ای دبه سر آمپول چند ضربه بزنید و یا اینکه دست خود را از قسمت مج بچرخانید.
سر پوش فلزی از آلودگی قسمت لاستیکی جلوگیری می کند.	پوشش فلزی و یا پلاستیکی سر پوش ویال را که بوسیله محافظ لاستیکی پوشیده شده بردارید.
الکل آلودگی میکروبی سطحی را پاک می کند دست از خرده های شیشه هنگام شکستن آمپول محفوظ نگاه داشته می شود.	قسمت لاستیکی ویال را با پنبه الكل تمیز کنید. با پنبه الكل، گردن آمپول را ضد عفونی کرده و آن را دور گردن آمپول نگاه دارید.
	
این عمل انگشتان و صورت را از خرده شیشه محفوظ نگاه می دارد.	با یک حرکت گردن آمپول را از محلی که خط کشیده شده بشکنید. همیشه دور از بدنه آمپول را بشکنید.

بخش پنجم: تزریقات و انواع آن / ۹۹




توجیه روش	روش
<p>برخورد سوزن به اطراف موجب آلوده شدن می‌گردد.</p> 	<p>سر پوش سوزن را بردارید و برای کشیدن دارو، سوزن را مستقیماً وارد آمپول کنید و سعی کنید که نوک سوزن به اطراف تماس نیابد.</p>
<p>قبل از کشیدن مایع باید مقداری هوا تزریق گردد تا مانع از تشکیل خلاء شود زیرا در ویال سر بسته اگر هوا تزریق نشود فشار منفی ایجاد کرده و در کشیدن دارو ایجاد اشکال می‌کند.</p> 	<p>سر پوش سوزن را برداشته و آن را به طور عمودی داخل ویال کنید.</p>
<p>در هنگام وارونه کردن کشش سطحی، مایع را نگاه می‌دارد. اگر سوزن با کناره‌ها برخورد کند و یا از آمپول خارج شود و مجدداً آن را داخل کنیم کشش سطحی شکسته می‌شود و مایع به بیرون می‌ریزد. تزریق هوا به داخل محلول موجب افزایش فشار در آمپول می‌شود و موجب ریختن دارو از آمپول می‌گردد.</p>	<p>مقدار داروی مورد لزوم را بکشیده این صورت که سوزن را در وسط آمپول قرار داده و آن را وارونه کنید. نوک سوزن با اطراف نباید در تماس باشد. حباب هوا را از داخل محلول خارج نکنید. بعد از خارج کردن سوزن از آمپول با دقیقت حباب هوا را خارج کنید. مقدار دارو را در سرنگ کنترل کنید.</p>

توجیه روش	روش
<p>وجود هوا در داخل مایع می‌تواند باعث ایجاد اشتباه در کشیدن میزان دقیق دارو شود.</p> <p>نگاه داشتن سرنگ در مقابل چشم به درست خواندن کمک می‌کند.</p> <p>چون ویال به صورت در بسته است دارو استریل باقی مانده و برای تزریق بعدی می‌توان از آن استفاده کرد.</p>	<p>سوزن را از قسمت مرکزی لاستیک ویال وارد می‌کنیم و هوای اندازه‌گیری شده را در قسمت فضای بالای مایع تزریق می‌کنیم. (هوا نباید در داخل مایع تزریق شود) سرنگ را در سطح عمودی مقابل چشم قرار داده و مایع را بکشید. هنگامی که دارو با مقدار صحیح کشیده شد سوزن را از ویال خارج کنید.</p> <p>اگر ویال برای دفعات متعدد استفاده می‌شود دارو را طبق دستورالعمل در یخچال نگاهداری نمایید.</p>

روش کار در تزریقات عضلانی، زیرجلدی، داخل جلدی

توجیه روش	اجرا
این کار باعث صرفه جویی در وقت و جلوگیری از بروز اشتباه می‌گردد.	وسایل لازم برای انجام تزریقات مربوطه را آماده کنید.
توضیح دادن موجب تشویق به همکاری و رفع نگرانی می‌شود.	روش کار را برای فرد توضیح دهید.
شستن دست‌ها از انتشار میکروب جلوگیری می‌کند	دست‌ها را بشویید
برای تزریق به عضله باسن، فرد در وضعیت به پهلو و یا شکم می‌خوابد. مفصل زانو و ران خم می‌شود. برای تزریق در عضله ران، فرد باید به پشت خوابیده باشد.	محیط خصوصی برای فرد ایجاد کنید و وضعیت مناسب جهت تزریق انتخاب کنید.
برای تزریق در عضله دلتوئید (بازو) فرد می‌تواند بنشیند یا بخوابد و بازو را شل کند. جهت تزریق زیر جلدی، فرد می‌تواند بنشیند و یا در حالت دراز کشیده باشد.	
این عمل باعث کاهش میکروب‌های سطح پوست شده و از اثر تحریکی الکل به هنگام تزریق جلوگیری می‌کند.	محل تزریق را با پنبه الکلی به صورت دورانی از مرکز به خارج محل تزریق ضد عفونی نموده و ۳۰ ثانیه صبر کنید.

بخش پنجم: تزریقات و انواع آن / ۱۰۱

تجییه روش	اجرا
برای کشیدن دارو از آمپول و یا ویال روش کار را مطابق آنچه که در قبل گفته شده است انجام دهید.	
این عمل صدمات بافتی و ناراحتی فرد را کم می‌کند. 	جهت انجام تزریق عضلانی، پوست محل تزریق را در دست گرفته و بکشید.
این عمل باعث ورود آسان و کم درد به داخل بافت زیر جلدی می‌شود.	جهت انجام تزریق زیر جلدی، پوست اطراف محل تزریق را جمع و یا باز کنید.
	جهت انجام تزریق داخل جلدی، قسمتی از داخل ساعد را که دارای مو نیست انتخاب کنید. ساعد محل مناسب و راحتی برای انجام تزریقات داخل جلدی می‌باشد.
در تزریق سریع درد کمتر است. داخل کردن سوزن با زاویه ۹۰ درجه ورود آن را به داخل عضله تسهیل می‌کند 	در تزریق عضلانی، سرنگ را با دست غالب بین انگشت سبابه و شست نگاه دارید و سوزن را با زاویه ۹۰ درجه و سریع داخل عضله نمایید در تزریق زیر جلدی، سرنگ را بین انگشتان شست و سبابه بگیرید و سوزن را در محل مورد نظر با زاویه ۴۵ درجه وارد کنید در تزریق داخل جلدی، سوزن را در مقابل پوست تقریباً به حالت صاف با زاویه ۱۰ - ۱۵ درجه قرار دهید. به طوری که قسمت اریب سر سوزن بالا باشدو از طریق پوست بتوان سر سوزن را در داخل پوست مشاهده کرد. سوزن را به اندازه سه میلی متر ($\frac{1}{3}$ سانتی متر) وارد پوست بکنید

تجیهه روشن	اجرا
<p>این عمل جهت نگاه داشتن سرنگ و آسپیره کردن ملایم لازم است.</p>	<p>برای انجام تزریق عضلانی و زیر جلدی، وقتی سوزن در محل اصلی قرار گرفت دست غیر غالب را در انتهای سرنگ (محل اتصال سرنگ به سوزن) قرار داده و با دست غالب انتهای پیستون را بگیرید.</p>
<p>اگر داروی مخصوص تزریق عضلانی و یا زیر جلدی، وارد ورید گردد امکان ناراحتی و ایجاد عکس العمل های خطرناک وجود دارد.</p> <p>تزریق سریع محلول باعث فشار در بافت و در نتیجه ایجاد ناراحتی می شود.</p>	<p>جهت تعیین اینکه سوزن در عروق خونی قرار دارد با کشیدن انتهای پیستون به آرامی آسپیره می کنیم در صورتی که خون در سرنگ برگشت سرنگ و سوزن را دور ریخته و داروی جدید تهیه کرده و در محل دیگری تزریق می کنیم.</p> <p>اگر در آسپیره کردن خون مشاهده نشد تزریق را به آرامی انجام دهید.</p>
<p>اگر بر آمدگی ظاهر شد ماده داخل نسج پوست داخل گردیده است.</p>	<p>در تزریق داخل جلدی، نیاز به آسپیره کردن نیست، به محض ورود سوزن، تزریق را به آرامی انجام دهید تا زمانی که یک برآمدگی کوچک مشاهده کنید.</p>
<p>آهسته بیرون کشیدن سوزن باعث کشیده شدن بافتها و ایجاد ناراحتی می شود.</p> <p>ماساژ در محل تزریق داخل پوستی ممکن است باعث تغییر در نتیجه تست به دلیل انتشار ماده به نسوج زیر جلدی شود.</p>	<p>پس از تزریق دارو در داخل عضله و یا زیر جلد، سوزن را به سرعت بیرون بکشید و با پنبه خشک، محل تزریق را حمایت کنید.</p> <p>پس از تزریق دارو در داخل جلد و بیرون کشیدن سوزن محل را ماساژ ندهید.</p>
<p>بیشتر حوادث زخم های سوراخ کننده در هنگام گذاردن سر پوش بر روی سوزن اتفاق می افتد.</p>	<p>سرپوش را روی سوزن نگذارید. سرنگ و سر سوزن را با روش مناسب دفع کنید.</p>
<p>وضعیت مناسب باعث ایجاد احساس راحتی در فرد می شود.</p>	<p>به فرد کمک کنید که در وضعیت راحت قرار بگیرد.</p>
<p>شستن دستها از انتشار میکروب ها جلوگیری می کند.</p>	<p>وسایل را جمع کرده و دستها را بشویید.</p>
<p>ثبت دقیق برای جلوگیری از اشتباهات ضروری است.</p>	<p>تزریق دارو را ثبت کنید.</p>

توجه: مهارت در تزریق تا حد زیادی از ناراحتی فرد می‌کاهد. دستورالعملهای زیر به کم کردن درد کمک می‌کند:

- ۱- از سوزن تیز و بدون خمیدگی استفاده نمایید.
- ۲- از باریکترین سوزنی که مناسب با محل و محلول تزریق باشد استفاده کنید.
- ۳- فرو رفتن سوزن و کشیدن آن را از بدن به سرعت انجام دهید.
- ۴- محلول را به آرامی تزریق کنید به خصوص هنگامی که مقدار محلول زیاد باشد. این کار باعث خوب پخش شدن محلول به داخل بافت‌های اطراف می‌شود.
- ۵- تزریق را در محلی که پوست آن قسمت التهاب نداشته باشد انجام دهید.

ایمنی تزریقات

به منظور داشتن تزریق ایمن رعایت نکات ذیل الزامی می‌باشد:

الف- از وسایل تزریق استریل و ضد عفونی شده استفاده کنید

- ۱- برای هر تزریق و حل کردن دارو از سرنگ و سر سوزن استریل استفاده کنید.
- ۲- از سرنگ و سر سوزن یک بار مصرفی که کیفیت آن کنترل شده است استفاده نمایید.
- ۳- بسته بندی هر سرنگ و سر سوزن را کنترل کنید و در صورت داشتن هر گونه پارگی، خرابی و رطوبت آن را از رده خارج کنید.

ب- از آلودگی وسایل تزریق و مواد دارویی جلوگیری کنید

- ۱- تزریق را در محیطی که به خوبی تمیز کرده و احتمال آلودگی با خون و مایعات بدن در آن محل نیست انجام دهید.
- ۲- اگر از ویالهای چند دوزی استفاده می‌کنید همیشه با یک سرسوزن استریل آن را سوراخ کنید و از باقی گذاشتن سر سوزن بر روی درب ویال پرهیز کنید.
- ۳- اگر از آمپول‌هایی که برای باز شدن نیاز به تیغه فلزی دارند استفاده می‌کنید. مواظب انگشتان خود باشید.

۴-مراقب داروهایی که آلودگی واضح و یا شکستگی و نشتی دارند باشید و آنها را از
رده خارج کنید.

۵-به هشدارها و راهنمایی‌های تولید کننده محصول درخصوص نحوه
استفاده، نگهداری و نقل و انتقال توجه نمایید.

۶-سر سوزنی را که به هر دلیل با سطوح غیر استریل تماس داشته از رده خارج کنید.

ج-از صدمات ناشی از سر سوزن جلوگیری کنید

صدمات سر سوزن در هر زمانی ممکن است ایجاد شود. اما اغلب طی و یا بلافصله بعد
از تزریق انجام می‌شود.

۱-پیش بینی و مراقبت از حرکات ناگهانی بیمار را در طی تزریقات و بعد از آن به
عمل آورید.

۲-از گذاشتن مجدد درب سر سوزن و دستکاری آن خودداری کنید.

۳-به بیمار خود در زمان تزریق آگاهی بدهید.

۴-از دست زدن به محل تزریق بعد از تمیز کردن و قبل از تزریق کردن بپرهیزید.

۵-سرنگ‌ها و وسرسوزن‌های مصرف شده را در همان محل استفاده در محفظه دفع
که غیر قابل نفوذ به اشیاء برنده و غیر قابل نشت می‌باشد جمع‌آوری نمایید و وقتی
سه چهارم جعبه سوزنها پر شد باید درب آن را بسته و مهر و موم نمایید.

د-از دستیابی مجدد به سوزن‌ها جلوگیری کنید.

۱-ظرف محل اشیاء تیز و برنده را قبل از بردن به محل معده کردن، قفل کنید و
آن را جهت خالی کردن و یا استفاده مجدد، باز نکنید.

۲-دفع اشیاء برنده را به روشی که مناسب بوده و مطمئن و ایمن باشد و باعث ایجاد
خطر در مردم نزدیک آن منطقه نگردد انجام دهید.

هـ- نکات متفرقه

- ۱- دستهای ارائه کننده خدمت باید تمیز و ضد عفونی شده باشد و در صورت داشتن زخم و یا عفونت موضعی باید پوشانده شوند (از دستکش استفاده شود)
- ۲- پوشیدن دستکش در موقع تزریقات مورد نیاز نمی باشد ولی در صورتی که خونریزی در جریان است از دستکش یک بار مصرف استفاده شود.
- ۳- ضد عفونی کردن سر آمپول و یا ویال ضرورت ندارد و در صورتی که نیاز به این کار وجود داشته باشد، از سواب منفرد و تمیز و به مدت زمان مورد نیاز برای ضد عفونی کردن استفاده شود.
- ۴- پوست محل تزریق را اگر کثیف و روغنی است بشویید.

تمرین نظری

- ۱- محل‌های مناسب جهت انجام تزریق عضلانی کدامند؟
- ۲- به چه علت در هنگام انجام تزریق، محلول باید به آهستگی وارد بافت گردد؟
- ۳- چگونه می‌توان از صدمات ناشی از ورود سر سوزن به دست در زمان تزریق جلوگیری کرد؟
- ۴- چگونه می‌توان از آلودگی وسایل تزریق جلوگیری کرد؟
- ۵- جهت کم کردن درد در محل تزریق رعایت چه نکاتی لازم است؟
- ۶- عمل آسپیره نمودن در تزریق عضلانی و زیر جلدی به چه علت انجام می‌گیرد؟

تمرین عملی

- ۱- همراه با دوستان خود، سرنگها و سوزن‌های مربوط به انواع مختلف تزریق را از نظر حجم و اندازه با هم مقایسه نمایید.
- ۲- با مقایسه سوزن‌های مختلف برای تزریق، تعیین نمایید که به چه علت هر چه شماره سوزن بزرگتر باشد. اندازه آن کوچک‌تر است؟
- ۳- با کمک دوستان خود انجام تزریقات عضلانی، زیر جلدی و داخل جلدی را بر روی مانکن تمرین نمایید.
- ۴- با کمک دوستان خود نحوه کشیدن دارو از آمپول و ویال را تمرین نمایید.

بخش ششم

خونریزی و انواع آن

اهداف آموزشی

انتظار است پس از یادگیری محتوای این مبحث فراگیر بتواند:

- ۱- اهمیت خونریزی و چگونگی تاثیر آن را بر دستگاه گردش خون بیان نماید.
- ۲- روش‌های مختلف کنترل خونریزی خارجی را توضیح دهد.
- ۳- علایم و نشانه‌های عمومی ناشی از خون‌ریزی داخلی را فهرست نماید.
- ۴- اقدامات اولیه در هنگام بروز خونریزی داخلی را توضیح دهد.

مقدمه

زندگی انسان بستگی به خونرسانی کامل و همیشگی دارد. لذا درک اینکه در هنگام بروز خونریزی، چگونه می‌توان آن را سریعاً متوقف کرد اهمیت بسیار دارد.

اعمال مهم خون

انتقال اکسیژن و دی اکسید کربن بین اندام‌های تنفسی و بافت‌های بدن (تعذیه): انتقال مواد غذایی جذب شده از روده به کبد و سایر اندام‌های بدن (دفع): انتقال مواد دفعی از بافت‌ها به کلیه‌ها (محافظت): دفاع از بدن در مقابل بیماری‌هایی که بوسیله میکرووارگانیسم‌ها ایجاد می‌شوند مانند تولید آنتی بادی‌ها

(تنظیم): تنظیم میزان اسیدیته مایعات بدن، توزیع و تنظیم گرما در بدن. سه نوع رگ در بدن انسان وجود دارد:

شریان‌ها یا سرخرگ‌ها: که خون را از قلب به اندام‌های مختلف بدن حمل می‌کنند، دارای خون روشن همراه با اکسیژن می‌باشند بعلت فشار خون در سرخرگ‌ها اگر سرخرگی بریده شود خون قرمز روشن به بیرون فوران می‌کند، جهت جریان خون در سرخرگ‌ها از طرف اندام‌هاست.

مویرگ‌ها: تبادل مواد بین سلول‌ها و خون در کنار مویرگ‌ها صورت می‌گیرد. وریدها یا سیاه‌رگ‌ها: خون را به قلب حمل می‌کنند.

خونریزی: عبارتست از خارج شدن خون از شرائین، وریدها و مویرگ‌ها.

اثرات خونریزی بر بدن

- ۱- از بین رفتن گلbul‌های قرمز موجب کاهش رسانیدن اکسیژن به بافت‌های گردد.
- ۲- کاهش حجم خون، منجر به کاهش فشار خون می‌شود.
- ۳- جهت جبران افت فشار خون، تعداد ضربانات قلب افزایش می‌یابد.

طبقه‌بندی خونریزی

خونریزی می‌تواند به دو نوع داخلی و خارجی طبقه بندی شود.

خونریزی خارجی

هرگاه بر اثر عوامل گوناگون در یکی از رگ‌ها پارگی ایجاد شود که با پارگی سطح پوست و یا شکاف در سطح بدن باشد و مقداری خون به خارج از بدن ریخته و قابل دید باشد خونریزی را خونریزی خارجی می‌نامند مانند خونریزی خارجی حاصله از بریدگی‌ها، زخم‌ها و... خونریزی خارجی به خونریزی شریانی، خونریزی وریدی و خونریزی مویرگی تقسیم می‌شود.

خونریزی شریانی: خون از دست رفته از شریان.

مشخصات: کاملاً اکسیژن دار و رنگ آن قرمز روشن می‌باشد، این خون مستقیماً از قلب می‌آید و به این جهت دارای فشار است و اغلب همراه با ضربان قلب به بیرون از زخم می‌جهد.

خونریزی وریدی: خون از دست رفته از ورید.

مشخصات: دارای اکسیژن کمتر بوده، رنگ آن قرمز تیره است، دارای فشار کمتر نسبت به شریان‌ها می‌باشد، خون از زخم به بیرون نمی‌جهد.

خونریزی مویرگی: خون از دست رفته از مویرگ.

معمولی‌ترین نوع خونریزی است و در هر زخمی وجود دارد تنها در این نوع خونریزی است که در جراحت‌های جزئی خون از زخم به بیرون به آرامی تراوش می‌کند.

عارض و نشانه‌های ناشی از خونریزی

۱- مشاهده خونریزی به بیرون از بدن

۲- مصدوم احساس تشنجی می‌کند

۳- دید مصدوم ممکن است تار شود و احساس ضعف و سرگیجه کند


- ۴- صورت و لبها رنگ پریده می‌شود.
- ۵- پوست سرد و مرطوب می‌گردد
- ۶- ضربان قلب سریعتر ولی ضعیف‌تر می‌شود.
- ۷- مصدوم دچار تنفس سطحی و بیقراری می‌گردد.

راه‌های جلوگیری از خونریزی




۱- فشار مستقیم: در این روش پس از شستن دست‌ها بر روی محل خونریزی با دست و در صورت در دسترس بودن گاز یا پارچه تمیز مستقیماً فشار آورید و عضو را بالاتر از سطح قلب نگه دارید، اگر گاز خیس شده آن را برندارید، مجدداً با قرار دادن گاز دیگری به فشار ادامه دهید و **حدود ۱۰ دقیقه** این کار را انجام دهید در صورت توقف خونریزی بر روی گازها باند پیچی فشاری را انجام دهید.

این نوع باند پیچی نباید خیلی سفت باشد اگر پائین‌تر از محل جراحت نبض حس نگردید و یا اگر رنگ آن قسمت از عضو کبود و سیاه شد نشان می‌دهد که باند پیچی بیش از حد سفت است.



۲- فشار غیر مستقیم: اگر فشار مستقیم بر روی زخم برای توقف خونریزی موثر نباشد با فشار بر روی نقاط در روی شریانهای اصلی عضو مجروح از ادامه خونریزی می‌توان جلوگیری کرد همراه با این روش به فشار مستقیم نیز ادامه دهید.

نقاط فشار تنها در اندام فوقانی و تحتانی وجود دارند و در سر، قفسه سینه و شکم



توصیه نمی‌گردد. در زخم‌های سر و صورت و گردن می‌توان با فشار برابر روی شریان اصلی گردن و یا شریان گیجگاهی خونریزی را بند آورد، اگر زخم در دست باشد در ناحیه داخلی بازو بر روی سرخرگ بازویی فشار وارد آورید و در زخم پا نقطه مورد نظر بر روی سرخرگ رانی در کشاله ران می‌باشد.


۳- استفاده از تورنیکه: به خاطر داشته باشید که این روش را می‌توان به عنوان آخرین اقدام و در موارد ضروری بکار برد، در صورت موثر نبودن راه‌های دیگر جلوگیری



از خونریزی و یا قطع عضو بایستی از تورنیکه استفاده کرد. تورنیکه یا شریان بند نوار پهنه‌ی است که بطور مستقیم بالای محل خونریزی و کاملاً محکم بسته می‌شود. ابتدا تورنیکه را دوبار محکم بدور عضو بپیچید و سپس یک گره بزنید و روی گره یک قطعه چوب یا

وسیله مشابه دیگری قرار دهید و مجددآً دو گره بزنید، قطعه چوب را بچرخانید تا تورنیکه محکم شود و خونریزی قطع گردد بعد آن را ثابت نمایید در حین انجام کار عضو را نیز بالا نگه دارید لازم است تاریخ و ساعت بستن تورنیکه را یادداشت کرده و همراه مصدوم باشد.

توجه:



۱- باید تورنیکه به اندازه کافی محکم بسته شود تا خونریزی ادامه نیابد.

۲- هرگز نباید روی آن پوشیده شود و همیشه باید در معرض دید باشد

۳- تورنیکه درست بالای مفصل قرار نگیرد.

۴- پایین‌ترین نقطه ممکن و نزدیک‌ترین محل بالای محل خونریزی باشد.

۵- تورنیکه آخرین راه چاره برای جلوگیری از خونریزی خارجی است و پس از بستن تورنیکه به هیچ وجه نباید آن را از بدن جدا کرد. شل کردن چند لحظه‌ای تورنیکه با تصور خونگیری سایر بافت‌ها، ممنوع است.

خونریزی ناشی از فرو رفتن جسم خارجی

بسیاری از زخم‌ها جزئی هستند و خونریزی کمی دارند در این گونه موارد:

۱- قبل از پرداختن به زخم دست خود را تمیز بشویید و زخم را زیر شیر آب بگیرید تا تمیز شود. با دقیق اشیاء خارجی کوچک را از سطح زخم پاک کنید. می‌توان این کار را با استفاده از یک تکه گاز، پنبه و یا پارچه تمیز انجام داد و یا آن را زیر آب سرد گرفت.

۲- موقتاً روی زخم را پوشش استریل قرار دهید و یا در صورت کوچک بودن دهانه زخم، آن را با چسب زخم بپوشانید

۳- اگر مطمئن هستید که در عضو زخمی، شکستگی زیرین وجود ندارد آن را بالا نگاه دارید



۴- اگر خونریزی ادامه پیدا کرد از فشار مستقیم استفاده کنید.
توجه: اگر در زخم یک شیء بزرگ فرو رفته است هرگز کوشش نکنید که آن را از زخم بیرون بکشید، زیرا که جسم زخم را بسته و خونریزی را محدود کرده است، به علاوه هنگام بیرون آوردن جسم بافت‌های اطراف آسیب می‌بیند و خونریزی شدیدتر می‌شود.

اقدامات در موارد خونریزی ناشی از فرو رفتگی جسم خارجی



برای کنترل خونریزی از فشار مستقیم بوسیله فشردن لبه‌های زخم به یکدیگر در کنار شیء فرو رفته استفاده کنید.
با ملاجمت یک تکه گاز را روی و یا در کنار شیء بگذارد

بخش ششم: خونریزی و انواع آن / ۱۱۳




یک بالشتک نرم پنبه‌ای و یا جسمی مشابه آن را در اطراف زخم قرار دهید، اگر امکان داشت بالشتک را آنقدر بلند بسازید که روی شیء فشاری وارد نکند


به صورت مورب آن را باند پیچی کنید و دقث کنید که باند را روی شیء نپیچید. عضو مجروح شده را بالا نگاه دارید و آن را تا آنجا که ممکن است ثابت و بیحرکت کنید. مصدوم را سریعاً ارجاع دهید

توجه: اگر خونریزی شدید همچنان ادامه داشت از فشار غیرمستقیم استفاده کنید.

آسیب دیدگی قفسه سینه ناشی از فرو رفتن جسم خارجی

چنانچه قفسه سینه از ناحیه جلو ، پشت و یا پهلوها در اثر شکستگی دنده ها پاره و یا توسط گلوله ، کارد و یا هر وسیله تیز دیگری سوراخ شود ، هوا مستقیم وارد قفسه سینه می شود . این زخم ها از این نظر خطرناک هستند که ممکن است تبدیل به زخم های مکنده شوند. در چنین زخم هایی هنگام عمل دم مقداری هوا از محیط خارج به داخل قفسه سینه کشیده میشود ولی موقع بازدم خارج نمی شود . از این رو تجمع هوا داخل قفسه سینه موجب فشرده شدن ریه همان سمت شده علاوه بر هوا تجمع خون نیز فشار بیشتری به ریه وارد می کند. از طرفی این فشار به ریه سالم نیز منتقل می شود و در نتیجه عملکرد تنفس دچار اختلال شده احتمالاً خفگی ایجاد می شود .





علائم و نشانه ها:

- ۱- احساس درد در قفسه سینه
- ۲- اختلال در تنفس به علت باقی ماندن هوا در ریه
- ۳- کبودی دهان ، زیر ناخن ها و پوست سیانوزه که نشان دهنده اغاز خفگی است.
- ۴- در صورت جراحت ریه همراه با سرفه ، خون قرمز روشن و کف آلود از دهان مصدوم خارج می شود.
- ۵- در هنگام دم احتمالا صدای مکش هوا به ریه ها شنیده می شود
- ۶- در هنگام بازدم مایع سفیدرنگ آغشته به خون در ناحیه زخم حباب حباب می شود.

اقدامات اولیه :

- ۱- سریع زخم باز را با کف دست بپوشانید.
- ۲- مصدوم را در حالت نیمه خوابیده قرار دهید . رو شانه های او را نگه دارید، بدن مصدوم را به سمت قسمت مجروح خم کنیدتا ریه سالم بالاتر قرار گیرد.
- ۳- هرچه سریعتر برای جلوگیری از نفوذ هوا از طریق زخم به درون ریه ها روی پانسمان را با یک ورقه پلاستیکی یا فویل بپوشانید و سه طرف آن را چسب بزنید و یک طرف راجهت خروج خون و هوا باز بگذارد.
- ۴- علائم حیاتی مصدوم را هر ۱۰ دقیقه کنترل کنید .
- ۵- بلا فاصله مصدوم را با برانکارد به مراکز درمانی برسانید.

وجود جسم خارجی در چشم :

الف) جسم خارجی که در چشم فرو نرفته باشد:

اگرآسیب شدید نیست چشم را معاینه کیند درغیراین صورت نیاز به معاینه نیست چشم را بپوشانید و به مصدوم توصیه کنید از مالیدن چشم ها خودداری کند و مصدوم را ارجاع فوری دهید .

چنانچه آسیب شدید نباشد :

- چشم را با آب بشوئید . (از داخل به خارج)

- در صورت امکان جسم را با یک گوش پاکن یا پارچه تمیز مرطوب خارج کنید.

- اگر جسم درپلک فوقانی قرار دارد ، پلک را به سمت پائین و به طرف خارج بکشید و یا پلک را به دور قسمت پنبه ای گوش پاکن استریل بپیچید.

- مصدوم را به پزشک ارجاع فوری دهید.

ب) جسم خارجی که در چشم فرو رفته باشد:

- هرگز جسمی را که در چشم فرورفته خارج نکنید.
- به مصدوم آرامش بدهید.

- چشم را بانداز کنید . (با استفاده از شیلد یا پد چشمی)

- در صورت لروم هر دو چشم مصدوم را بپوشانید تا بی حرکت بمانند.

- در صورت امکان سر او را بی حرکت نگه دارید .

- مصدوم را در حالت خوابیده به پزشک ارجاع فوری دهید.

خونریزی داخلی

خونریزی داخلی در اثر جراحت هایی مانند شکستگی،له شدگی و یا به علت وضعیت خاصی مانند خونریزی ناشی از زخم معده روی می دهد. اندام های داخلی مانند طحال و کبد ممکن است بواسیله ضربه وارد به بدن آسیب بینند در حالی که این آسیب نشانه های خارجی نداشته باشد. خونریزی داخلی باید به اندازه خونریزی خارجی جدی


گرفته شود. زیرا به هر حال خون، از سیستم گردش خون خارج شده و اندام‌های حیاتی دچار کمبود اکسیژن می‌گردند. احتمال دارد که خون جراحت‌های داخلی در یکی از حفرات بدن جمع شود و پنهان باقی بماند یا اینکه خونریزی داخلی ممکن است بر اثر جریان یافتن خون از یک یا چند روزنه بدن مانند دهان و مقعد به بیرون از بدن، یا بر اثر مشاهده رنگ پریدگی و کبودی آشکار گردد.

عوارض و نشانه‌های ناشی از خونریزی داخلی


این نشانه‌ها بسته به میزان خونریزی و حجم خون از دست رفته فرق می‌کند. آنچه که مسلم است این است که تغییر ناگهانی حال عمومی مصدوم، نظیر آنچه که در مورد نشانه‌های خونریزی خارجی گفته شد از علائم اصلی و مهم می‌باشد و علاوه بر آن در اطراف ناحیه صدمه دیده، درد و حساسیت و تنفس احساس می‌شود و ممکن است جریان خون از یکی از روزنه‌ها (دهان، بینی و یا مقعد) مشاهده شود.

اقدامات اولیه در بروز خونریزی داخلی


۱- مصدوم را طوری بخوابانید که سر پایین‌تر از بدن باشد.



۲- اگر جراحت مصدوم اجازه می‌دهد پاهای مصدوم را بلند کنید تا خون به اندازه کافی به سوی اندام‌های حیاتی سرازیر شود.



- ۳- پوشش‌های تنگ دور سینه و کمر مصدوم را شل کنید.
- ۴- به بیمار اطمینان خاطر بدهید و برایش لزوم آرام بودن را توضیح دهید.
- ۵- در صورت بروز شوک، او را گرم نگاه داشته و سر او را پایین تراز بدنش قرار دهید.
- ۶- میزان تنفس، نبض و سطح هوشیاری او را هر ۱۰ دقیقه یک بار کنترل کنید.
- ۷- مصدوم را برای یافتن سایر جراحت‌های احتمالی، معاينه کنید.
- ۸- در صورت بیهوش بودن، راه‌های تنفسی او را باز نگاه داشته و او را در وضعیت بهبود قرار دهید.



- ۹- در صورت لزوم، احیاء قلبی، تنفسی انجام دهید.
- ۱۰- مقدمات ارجاع فوری را فراهم کرده و مصدوم را به نزدیک‌ترین مرکز درمانی ارجاع دهید.

وضعیت بهبود بخش

در مواقعي که فرد بیهوش نفس می‌کشد و قلبش ضربان دارد، او را باید در وضعیت بهبود قرار داد. اگر بیمار در این وضعیت قرار داده شود ممکن بود که راه تنفس

باز می‌ماند، زبان نمی‌تواند به عقب گلو بیفتدو سر و گردن در وضعیت کشیده قرار می‌گیرد. به طوری که هوا بدون بر خورد با مانع به شش‌ها می‌رسد، آب دهان و یا سایر مایعات موجود در دهان بیمار از گوشه دهان بیرون ریخته و نمی‌توانند خطری برای مصدوم ایجاد کند.


قرار دادن مصدوم در وضعیت بهبود بخش در زمانی که اقدام به معاینه بیمار می‌شود و یا مصدوم دچار آسیب دیدگی ستون فقرات می‌باشد کار درستی نیست.

تصاویر ذیل مراحل مختلف چرخاندن مصدومی که به پشت افتاده است نشان می‌دهد، اگر مصدوم به روی صورت و یا یکی از پهلوها افتاده است، انجام تمامی مراحل لازم نیست. اگر مصدوم عینک به چشم دارد باید قبل از چرخاندن سر او عینکش را بردارید تا به چشم آسیبی نرسد.



۱- مستقیم پهلوی مصدوم زانو بزنید، حدود ۳۰ سانتی متر از او فاصله بگیرید. در این حال باید صورت شما هم سطح سینه مصدوم باشد، سر او را به سوی خود برگردانید و به عقب خم کنید، چانه را به بالا بکشید.

۲- دست مصدوم را در کنار تنہ در طرف خود زیر باسنیش قرار دهید. به طوری که اگر امکان داشت کف دست به طرف بالا باشد. دست دیگرش را روی سینه‌اش بگذارید. پای سمت دیگر را از زیر زانو و یا پاشنه پا بگیرید و روی پای نزدیک به خود قرار دهید.



۳- با یک دست سر را نگاه دارید و با دست دیگر شلوار او را از ناحیه باسن بگیرید و سریع مصدوم را به سمت خود بچرخانید به طوری که سنگینی



بخش ششم: خونریزی و انواع آن / ۱۱۹



تنه روی زانوهای شما بیفتد.

۴- در حالی که هنوز سنگینی مصدوم روی زانوی شمامست دوباره سر او را تنظیم کنید و مطمئن شوید که راه تنفس باز است.

۵- بازوی بیمار را از آرنج خم کرده و در وضعیت مناسبی قرار دهید تا بتواند سنگینی تنه را تحمل کند.

۶- پای مصدوم را از زانو خم کنید و ران او را کاملا به سمت خود بکشید تا بتواند سنگینی قسمت پایین بدن را تحمل کند.



۷- با دقت دست دیگر مصدوم را از زیر تنهاش بکشید و به موازات بدنش قرار دهید تا از غلت زدن مصدوم پیشگیری شود

توجه: شما ممکن است در مورد مصدوم چاق از هر دو دست خود استفاده کنید. لباس را از شانه و باسن بگیرید و مصدوم را بکشید به طوری که سنگینی بدن او روی رانهای شما بیفتد.

شکل‌های خاص خونریزی

جراحت فرق سر: اکثرا بر اثر زمین خوردن رخ می‌دهد که معمولا در میان سالمندان شایع‌تر است. عامل‌های دیگر این جراحت عبارت است از تصادفات جاده‌ای، کتک کاری، حوادث ورزشی و افتادن اشیاء سنگین روی سر.

عوارض و نشانه‌ها

- ۱- درد، حساسیت و خونریزی در فرق سر.
- ۲- ورم در اطراف زخم.
- ۳- احتمالاً عوارض و نشانه‌های ناشی از شکستگی جمجمه.
- ۴- بیهوشی ممکن است دست بددهد.

اقدامات اولیه

۱- کنترل خونریزی با استفاده از فشار مستقیم، یک باند پانسمان که بزرگ‌تر از زخم باشد روی آن قرار دهید و محکم باند پیچی نمایید.


۲- اگر در فرق سر شکستگی وجود دارد و یا جسم خارجی در آن فرو رفته است از وارد کردن فشار مستقیم بر روی سر خودداری کنید.

۳- اگر مصدوم به هوش است او را طوری بخوابانید که سر و شانه‌هایش کمی بالا باشد.

۴- میزان تنفس، نبض و سطح هوشیاری مصدوم را هر ۱۰ دقیقه یک بار کنترل کنید.

۵- اگر مصدوم بیهوش شد او را در وضعیت بهبود بخش طوری قرار دهید که قسمت جراحت برداشته بالا باشد.

۶- مقدمات ارجاع مصدوم را فراهم نمایید.



خونریزی از گوش

خونریزی از داخل کanal گوش با خونریزی قسمت بیرونی گوش تفاوت دارد. خونریزی از داخل گوش عموماً به علت پارگی پرده گوش و یا شکستگی جمجمه رخ می‌دهد. پارگی پرده گوش می‌تواند ناشی از فرو کردن اشیاء به داخل گوش و یا نزدیک بودن به محل وقوع انفجار باشد.

عوارض و نشانه‌ها

اگر ناشی از پارگی پرده گوش باشد:

۱- مصدوم در داخل گوش خود احساس درد می‌کند

۲- جریان آرام خون از گوش

اگر ناشی از شکستگی جمجمه باشد.

۱- چگونگی وقوع حادثه، احتمال شکستگی جمجمه و یا سایر آسیب‌های سر را مشخص می‌سازد.

۲- مصدوم از سر درد شکایت دارد.

۳- مقدار کمی خون مخلوط با مایع شفاف مغزی-نخاعی از گوش سرازیر می‌شود.

۴- مصدوم ممکن است دچار بیهوشی گردد.

اقدامات اولیه در موارد بروز خونریزی از گوش



۱- در صورتی که مصدوم بیهوش نیست او را در وضعیت نیمه خوابیده قرار دهید به طوری که سر به سوی قسمت مجروح شده خم شود تا خون و یا مایع بتواند خارج شود.

۲- گوش را با یک پانسمان استریل غیر آغشته به دارو و یا مشابه آن که تمیز باشد بپوشانید و روی آن را خیلی شل باند پیچی کنید یا با چسب به اطراف بچسبانید.



۳- سطح هوشیاری و علائم حیاتی مصدوم را کنترل نمایید.

۴- اگر مصدوم بیهوش شد ولی تنفسش حالت عادی داشت او را در وضعیت بهبود بخش قرار دهید. سر بایستی به سمت قسمت مجروح خم شود تا مایع از آن خارج گردد.

توجه: نباید گوش را ببندید و یا سعی کنید که با فشار جریان خون را متوقف کنید زیرا این عمل باعث صدمه به گوش میانی خواهد شد.

جراحتها و خونریزی‌های ناحیه دهان

بریدگی زبان، لبها می‌تواند باعث ایجاد خونریزی خفیف تا شدید گردد. این جراحت‌ها معمولاً بر اثر فشار دندان مصدوم به هنگام با صورت به زمین خوردن و یا ضربه به صورت ایجاد می‌گردند.

اقدامات اولیه :

- از مصدوم بخواهید بنشیند و سرش را به طرف قسمت آسیب دیده خم کند و کاملاً جلو بگیرد.

- برای کنترل خونریزی، یک تکه پارچه تمیز روی زخم بگذارید و بوسیله شست از یک سو و سایر انگشت‌ها از سوی دیگر، مستقیماً روی زخم فشار وارد کنید.

- به مصدوم بگوئید که خون داخل دهانش را به بیرون بریزد زیرا که بلعیدن خون ممکن است باعث ایجاد استفراغ شود.

- اگر بعد از ۲۰ - ۱۰ دقیقه بازهم خونریزی ادامه یافت یا اگر زخم بزرگ بود و پوست شکاف عمیق برداشته بود مصدوم را به پزشک ارجاع فوری دهید.

- به مصدوم توصیه کنید که دهان خودرا نشوید چون به لخته آسیب می‌رسد.


- از آشامیدن مایعات گرم برای مدت ۱۲ ساعت خودداری کند.

خونریزی از حفره دندان و احتمالاً پارگی لثه در اطراف حفره مشاهده می‌شود.

خونریزی از بینی

بر اثر عوامل مختلفی از جمله اختلال انعقادی، بالا رفتن ناگهانی فشار خون، شکستگی جمجمه، پولیپ بینی، شکستگی مخاط بینی و راه رفتن طولانی مدت در زیر آفتاب شدید ممکن است خونریزی از بینی اتفاق افتد.

در صورت خونریزی از بینی اقدامات زیر را انجام دهید:



۱- از بیمار بخواهید در حالت نشسته قرار گیرد و سر وی به جلو باشد تا از بلع و وارد شدن خون به ریه‌ها جلوگیری شود.

۲- به او توصیه کنید که از راه دهان نفس بکشد.

۳- از او بخواهید از حرکت کردن خودداری کند.

۴- لباس‌های تنگ دور گردن و سینه او را شل کنید.

۵- به مدت ۱۰ - ۵ دقیقه بر روی قسمت نرم بینی فرد فشار دهید.

۶- به مصدوم بگوئید که از بلعیدن خون داخل دهان خودداری کند.

۷- پس از ۱۰ دقیقه فشردن بینی را خاتمه دهید اگر چانچه خونریزی بند نیامد مجدداً ۱۰ دقیقه دیگر این کار را تکرار کنید.

۸- بر روی سر و پیشانی فرد کمپرس سرد قرار دهید.

۹- وقتی خونریزی بند آمد از مصدوم بخواهید که تقلانکند و حداقل برای ۴ ساعت ازدستکاری بینی و فین کردن اورا منع کنید.

۱۰- اگر پس از ۳۰ دقیقه خونریزی بند نیامد فرد را سریعاً ارجاع دهید.

چنانچه خونریزی بند آمده است ولی بیمار سابقه خونریزی را ذکر می‌کند مراجعه به پزشک ضروری است.

زخم های چشم :

زخم ها و صدمات به چشم خطرناک هستند و حتی یک خراش سطحی چشم می تواند منجر به زخم مشهود، درد و خون گرفتگی چشم (ممکن است با یک زخم مشهود روی حدقه چشم ها یا پلک همراه باشد)، خونریزی یا جاری شدن یک مایع شفاف از زخم چشم

اقداماتی که باید در این حالت انجام دهید شامل موارد زیر است :

-باید دست ها شسته و تمیز باشد.

-پانسمان استریل و تمیز استفاده کنید.(زیرا چشم به عفونت حساس است).

-از مصدوم بخواهید اگر لنز داخل چشم دارد در بیاورد.

-در صورتی که نتوانستید لنزا خارج کنید آن را نادیده بگیرد و چشم را درمان کنید.

-به مصدوم آرامش و قوت قلب بدھید.

اقدامات در زخم هایا صدمات له کننده ناشی از ضربه به چشم :

-به مصدوم آرامش خاطر بدهید.

-مصدوم را بخوابانید و او را در وضعیت راحتی قرار دهید.

-سروشانه هایش را ۱۰ تا ۲۰ درجه بالا بیاورید.

-مصدوم را آرام و بی حرکت نگه دارید.

-به مصدوم توصیه کنید چشم هایش را حرکت ندهد.

-وی را از استفراغ منع کنید.

-از کمپرس سرد استفاده کنید.

-روی هردو چشم پانسمان قرار دهید و به آرامی آن را محکم کنید.

-بیمار را در حالت خوابیده به پزشک ارجاع فوری دهید.

زخم های شکمی :

زخم عمیق روی دیواره شکم نه تنها به این دلیل که با خونریزی فراوان همراه است، بلکه به این علت که احتمالاً اندام های زیردیواره شکم ممکن است پاره یا سوراخ شده باشد نیز خطرناک است.

زخم دیواره شکم ممکن است به خونریزی های شدید داخلی وعفونت منجر شود. حتی ممکن است که براثر شدت پارگی قسمتی ازروده ارزخم بیرون بزند.

علائم و نشانه های درز خم های شکمی :

- وجود درد عمومی درناحیه شکم

- خونریزی همراه با زخم درناحیه شکم

- ممکن است قسمتی ازروده بیرون آمده و مشاهده شود

- مصدوم ممکن است استفراغ کند

- وجود علائم و نشانه های شوک

اقدامات اولیه در زخم های شکمی :

۱- بافسردن لبه های زخم به یکدیگر خونریزی را کنترل کنید.

۲- مصدوم را در حالت نمیه نشسته قراردهید به طوری که زانویش خم باشد تا از شکاف برداشتن زخم جلوگیری شده و فشار کمتری روی زخم وارد شود.

۳- زخم را پانسمان کرده و روی آن را باندپیچی نمایید.

۴- اگر تنفس مصدوم عادی است اما بی هوش می باشد شکمش را نگهدارید و اورا دروضعیت مناسب قراردهید.

۵- تعداد تنفس ونبض را هر ۱۰ دقیقه یکبارشمارش کنید و علائم خونریزی داخلی در مصدوم را جستجو کنید.

۶- اگر مصدوم خواست سرفه یا استفراغ کند به آرامی دست خود را روی پانسمان بگذاردید که زخم وی باز نشود.

۷- به مصدوم چیزی از راه دهان ندهید.

۸- در صورتی که مصدوم به حالت شوک فرورفت اقدامات اولیه شوک را انجام دهید.

۹- در اولین فرصت مصدوم را به پزشک ارجاع فوری دهید.

اگر قسمتی از روده از زخم بیرون آمده باشد اقدامات ذیل را انجام دهید:

- با استفاده از فشار مستقیم خونریزی را کنترل کنید.

- از واردآمدن فشار سنگین روی شکم خودداری کنید.(نباید به روده بیرون آمده دست بزنید.)

- روی زخم را با یک باند مرتبط استریل بپوشانید.

- علائم حیاتی بیمار را هر ۱۰ دقیقه کنترل کنید.

- در اولین فرصت مصدوم را ارجاع دهید.

تمرین عملی و نظری

۱- با همراهی دوستان خود، کنترل خونریزی از اندامها را به روش مستقیم و غیر مستقیم و بستن تورنیکت بر روی مانکن آموزشی تمرین نمایید.

۲- با همراهی دوستان خود، کنترل خونروی از بینی بر روی مانکن آموزشی تمرین نمایید.

۳- با همراهی دوستان خود، اقدامات در زخم‌های چشم را بر روی مانکن آموزشی تمرین کنید.

۴- با همراهی دوستان خود، وضعیت بهبود بخش را تمرین کنید.

۵- علائم و نشانه‌های خونریزی را فهرست نمایید.

بخش هفتم

احیای قلبی ریوی و اکسیژن درمانی

اهداف آموزشی

انتظار است پس از یادگیری محتوای این مبحث فرآگیر بتواند:

- ۱- وقفه قلبی، تنفسی و عوارض ناشی از آن را بیان نمایید.
- ۲- علی که باعث اختلال کار دستگاه تنفس و قلب می‌شوند را لیست نماید.
- ۳- نحوه احیای قلبی در موارد شاهد را توضیح دهد.
- ۴- مراحل انجام احیای قلبی - ریوی را با یک کمک کننده و دو کمک کننده در بالغین توضیح دهد. (غیرشاهد)
- ۵- مراحل احیای قلبی - ریوی را با یک کمک کننده و دو کمک کننده در کودکان توضیح دهد.
- ۶- علاجیم تجدید حیات در مصدوم دچار وقفه قلبی، تنفسی را فهرست نماید.
- ۷- هدف از اکسیژن درمانی چیست؟ قسمت‌های مختلف دستگاه اکسیژن را توضیح دهد.
- ۸- علی که نمی‌توان از تنفس دهان به دهان استفاده کرد را ذکر نماید.
- ۹- نکات مهم که در هنگام استفاده از دستگاه اکسیژن باید مورد توجه قرار گیرد را فهرست نماید.

مقدمه

برای رسانیدن اکسیژن به سلول‌های بدن عمل طبیعی دو سیستم تنفسی و جریان خون ضروری است، پس از وارد شدن هوا به ریه‌ها اکسیژن در آنجا به خون انتقال یافته و سپس از طریق خون به تمام سلول‌های بدن می‌رسد.

هر گونه اختلال در کار دستگاه تنفس و یا قلب باعث کمبود و فقدان اکسیژن می‌شود و در نتیجه کار سلول‌ها مختل شده و در نهایت صدمه غیر قابل برگشتی به آن‌ها وارد می‌گردد و از بین می‌روند.

عللی که باعث اختلال کار دستگاه تنفس و قلب می‌شوند

عبارتند از:

- غرق شدن: وجود آب در دهان و راه‌های تنفسی مانع نفس کشیدن می‌شود.
- برق گرفتگی: به علت تأثیر بروی اعصاب مغز، مرکز کنترل تنفس و ضربان قلب آسیب می‌بیند.
- مسمومیت با گازهای سمی: بعضی از گازها از جمله منوکسید کربن (CO) جایگزین اکسیژن خون شده و ترکیب ثابتی را تشکیل می‌دهد
- مسمومیت با داروهای بعضی از داروهای مانند آرام بخش‌ها با تأثیر بر روی اعصاب موجب کاهش یا قطع فعالیت تنفسی می‌شود .
- ضربه مغزی: در این حالت ممکن است مرکز تنفس آسیب ببیند
- بیماری قلبی مثل انسداد رگ‌های قلب
- سقوط ناگهانی فشار خون
- انسداد راه هوایی در اثر وجود جسم خارجی و یا بیماری‌ها مثل دیفتی

تعاریف

نارسایی تنفسی: دشواری شدید تنفس که بر اثر کاهش فشار اکسیژن و افزایش فشار دی اکسید کربن در خون سرخرگی پیش می‌آید .

وقفه تنفسی: قطع کامل فعالیت‌های تنفسی

وقفه قلبی: باز ایستادن قلب از انقباض و انبساط پی در پی که بر اثر آن جریان خون در تمام دستگاه گردش خون متوقف می‌شود.

نارسایی قلبی: ناتوانی قلب برای پمپ مقادیر کافی خون که قادر به تأمین اکسیژن و مواد مورد نیاز بافت‌ها نباشد.

وقفه قلبی تنفسی: توأم شدن وقفه قلبی و وقفه تنفسی.

احیای قلبی ریوی: مجموعه عملیاتی است که برای برقراری گردش خون (C)، باز کردن راه هوایی (A) و برقراری تنفس (B) انجام می‌شود.

مرگ بالینی: در این حالت فرد بیهوش است و تنفس ندارد ولی هنوز سلول‌های مغزی او صدمه ندیده است، اگر احیا، بلا فاصله شروع شود از صدمه مغزی جلوگیری شده و شناسی زنده ماندن او بیشتر می‌شود.

مرگ مغزی: حدود ۴ تا ۶ دقیقه پس از قطع تنفس و ضربان قلب، مغز دچار صدمه غیر قابل برگشت می‌گردد، در صورتی که احیا، در این مدت شروع نشود امیدی به نجات فرد نیست.

زمان طلایی برای انجام اقدامات احیاء قلبی- ریوی ۴ تا ۶ دقیقه است.
به ازای هر دقیقه تأخیر مازاد بر ۴ دقیقه افزایش احتمال ۷ تا ۱۰ درصد مرگ قربانیان وجود دارد.

احیای قلبی ریوی در بزرگسالان (۸ سال به بالا) :

در بزرگسالان احیا به دو صورت انجام می‌شود :

۱- شاهد

۲- غیرشاهد

احیای قلبی شاهد در بزرگسالان :

زمانی که مصدوم در مقابل چشمان ما دچار ایست قلبی و بی هوش شود(ما ناظر بی هوشی و ایست قلبی مصدوم باشیم) :

ابتدا از ایمن بودن صحنه حادثه اطمینان حاصل کنید، سپس مطمئن شوید که آیا مصدوم هوشیار است یا بی هوش؟ بدین منظور اقدامات زیررا جهت مصدوم انجام دهید:

۱- ارزیابی :

اگر آسیب ستون فقرات (گردنی) وجود ندارد


برای ارزیابی (بررسی هوشیاری) مصدوم :

- صدا زدن فرد
- بدون تکان دادن چند ضربه آرام به شانه ها




اگرآسیب ستون فقرات (خصوصاً گردنی) وجود دارد :

- صدا زدن فرد
- چند ضربه آهسته روی شکم فرد (حدفاصل بین ناف و جناق سینه)



۲- اورژانس را خبر کنید:

اگر شما تنها هستید و مصدوم بی‌هوش بود درخواست کمک کنید. اگر هیچ کسی پاسخ نداد، اورژانس ۱۱۵ را خبر کنید و سپس به کنار مصدوم برگردید و CPR را شروع کنید. اگر مصدوم همراه دارد از او جهت درخواست کمک و یا اطلاع به اورژانس ۱۱۵ کمک بگیرید.



۳- نبض را چک کنید:

- برای چک کردن نبض در بزرگسالان، نبض کاروتید (گردنی) را لمس کنید.
- برای تعیین محل نبض کاروتید مراحل زیر را دنبال کنید:
 - با یک دست که بر روی پیشانی مصدوم را قرار می‌دهید سر او را عقب نگه دارید.
 - با استفاده از ۲ یا ۳ انگشت دست دیگرتان، تراشه را پیدا کنید.

- این ۲ یا ۳ انگشت را به داخل شیار بین تراشه و عضلات در یک طرف گردن، جایی که شما بتواند نبض کاروتید (گردنی) را احساس کنید حرکت دهید.
- نبض شریان کاروتید را برای حداقل ۵ ثانیه ولی کمتر از ۱۰ ثانیه لمس کنید.



۴- ماساژ قلبی را شروع کنید:


در صورت فقدان نبض و ایست قلبی شاهد در بزرگسالان باید بلافاصله ماساژ قلبی را با سرعت ۱۰۰ بار در دقیقه برای مصدوم انجام دهید.

برای ماساژ قلبی در بزرگسالان مراحل زیر را انجام دهید:

- کنار سینه مصدوم زانو بزنید. (حتی الامکان سمت راست)
- لباس مصدوم را حتی الامکان از روی سینه کنار بزنید.
- ساعت و انگشت را از دست ها خارج نمایید.
- پاشنه کف یکی از دستانتان را در وسط قفسه سینه بر هنره مصدوم بین خط فرضی که دو نوک پستان را بهم وصل می کند قرار دهید.
- کف دست دیگر را روی دست قبلی قرار داده و انگشتان دست زیری را به بالا بکشید.
- زاویه دستها با بدن مصدوم ۹۰ درجه می باشد.

بخش هفتم: احیای قلبی ریوی و اکسیژن درمانی / ۱۳۳

- با قدرت و با سرعت فشار دهید. به طوری که با هر ماساژ قلبی ۴ تا ۵ سانتی‌متر قفسه‌سینه به پایین فشرده شود. در هر ماساژ قلبی مطمئن شوید که فشار مستقیم به سمت پایین و بر استخوان جناغ مصدوم وارد می‌شود.
- مطمئن شوید در پایان هر ماساژ قلبی، اجازه داده‌اید قفسه سینه به طور کامل به حالت اول برمی‌گردد برگشت کامل قفسه سینه اجازه می‌دهد که قلب در بین ماساژهای قلبی با میزان خون بیشتری دوباره پر شود. برگشت ناکامل قفسه سینه جریان خون ایجاد شده به وسیله ماساژ قلبی را کاهش می‌دهد.
- ماساژ‌ها را به طور یک‌نواخت و با سرعت ۱۰۰ بار در دقیقه انجام دهید.



توجه : در صورت بروز ایست قلبی شاهد در بزرگسالان شما می‌توانید ابتدا ضمن تماس با اورژانس تنها فشدن قفسه سینه (ماساژ قلبی) را با سرعت ۱۰۰ بار در دقیقه بطور مداوم و بدون انجام تنفس مصنوعی تا رسیدن آمبولانس یا رسیدن افراد حرفه‌ای ادامه داده و هر ۲ دقیقه بطور متناوب ارزیابی را انجام دهید.

مراحل احیای قلبی - ریوی (C . A . B) :

در شرایط زیر باید احیای قلبی - ریوی به طور کامل انجام شود:

- ایست قلبی غیر شاهد در بزرگسالان
- کودکان
- شیرخواران
- غرق شدگی
- خفگی با جسم خارجی

احیای قلبی - ریوی

Cardio Pulmonary Resuscitation= CPR

CPR شامل ۳ قسمت اصلی می باشد:

- | | |
|--------------------|------------------|
| Circulation | جریان خون |
| Air way | راه هوایی |
| Breathiny | تنفس |

مراحل احیای قلبی - ریوی (غیر شاهد) در بزرگسالان (۸ سال به بالا):

۱- ارزیابی

*اگر آسیب ستون فقرات (گردنی) وجود ندارد:

برای ارزیابی (بررسی هوشیاری) مصدوم :

- صدا زدن فرد
- بدون تکان دادن چند ضربه آرام به شانه ها



* * * اگر آسیب ستون فقرات (خصوصاً گردنی) وجود دارد:

- صدا زدن فرد
- چند ضربه آهسته روی شکم فرد (حدفاصل بین ناف و جناق سینه)



۲- اورژانس را خبر کنید:

اگر شما تنها هستید و مصدوم بی‌هوش بود درخواست کمک کنید. اگر هیچ کسی پاسخ نداد، اورژانس ۱۱۵ را خبر کنید و سپس به کنار مصدوم برگردید و CPR را شروع کنید. اگر مصدوم همراه دارد از او جهت درخواست کمک و یا اطلاع به اورژانس ۱۱۵ کمک بگیرید.

۳- نبض را چک کنید:

برای چک کردن نبض در بزرگسالان، نبض کاروتید (گردنی) را لمس کنید.



۴- ماساژ قلبی را شروع کنید:

اگر مصدوم هیچ نبضی نداشت باید بلا فاصله ۳۰ ماساژ قلبی را برای مصدوم شروع کنید.
(مطابق آنچه که قبل اموزش داده شد).

۵- راه هوایی را باز کنید :

برای باز کردن راه هوایی مصدوم بزرگسال از مانور سر کاملاً عقب - چانه بالا استفاده نمائید. در این روش ابتدا باید مصدوم را به پشت بر رویک سطح صاف و سفت قرار گیرد . اگر مصدوم به شکم خوابیده او را با دقت به پشت بغلطانید سپس:

- بايك دست که بر روی پیشانی مصدوم را قرار می دهيد سر او را عقب نگه داريد.
- انگشتان دست دیگر را زیر قسمت استخوانی فک تحتانی نزدیک چانه قرار دهيد.
- فک را بالا ببريد به طوری که چانه به جلو آورده شود.
- انسداد به وسیله زبان : زمانی که مصدوم بی هوش است زبانش راه هوایی فوقانی را مسدود می کند.
- مانور سر عقب - چانه بالا انسداد راه هوایی را در مصدوم بی هوش برطرف می کند.
- این مانور زبان را به سمت بالا حرکت می دهد و انسداد راه هوایی را برطرف می کند.






توجه: مانور سرکاملاً عقب - چانه بالا زمانی کاربرد دارد که مطمئن باشیم آسیب به نخاع گردنی وارد نشده باشد.

۶- تنفس را چک کنید:

برای ارزیابی تنفس، شما باید نگاه کنید، گوش دهید و احساس کنید. این ارزیابی باید حداقل ۵ ثانیه ولی کمتر از ۱۰ ثانیه به طول بیانجامد. اگر در مدت ۱۰ ثانیه تنفس را تشخیص ندهید، باید تنفس مصنوعی را شروع کنید.

برای ارزیابی وجود تنفس در مصدوم:

- تمام لباس‌هایی که قفسه سینه مصدوم را پوشانده، خارج کنید و یا کنار بزنید.
- گوشستان را نزدیک دهان و بینی مصدوم قرار دهید.
- در حالی که به قفسه سینه مصدوم نگاه می‌کنید:
- به حرکات قفسه سینه مصدوم نگاه کنید.
- به هوایی که در طول بازدم خارج می‌شود گوش کنید.
- هوایی را که در طول بازدم خارج می‌شود بر روی گونه خود احساس کنید.
- تنفس را چک کنید. صورت خود را نزدیک بینی و دهان مصدوم قرار داده و برای ارزیابی وجود تنفس نگاه کنید، گوش دهید و احساس کنید.



۷-تنفس بدھید :

اگر مصدوم تنفس کافی و مناسب نداشت ابتدا ۲ تنفس دهید.

از تنفس دهان به دهان استفاده کنید. تنفس دهان به دهان یک راه مؤثر و سریع جهت فراهم کردن اکسیژن برای مصدوم می‌باشد. هوای بازدمی احیاگر تقریباً شامل ۱۷٪ اکسیژن و ۴٪ دی‌اکسیدکربن می‌باشد. این مقدار اکسیژن نیاز مصدوم را تأمین می‌کند.

برای انجام تنفس دهان به دهان به مصدوم مراحل زیر را دنبال کنید:

- راههوازی مصدوم را با مانور سر عقب - چانه بالا باز نگهدارید.
- بینی را با انگشت شست و اشاره خود محکم بگیرید تا کامل بسته شود.
(از دستی که روی پیشانی مصدوم است استفاده کنید)
- با یک تنفس عمومی (نه عمیق) هوا را به سینه خود فرو ببرید و لبانتان را محکم در اطراف دهان مصدوم بچسبانید به طوری که هیچ منفذی وجود نداشته باشد.
- یک تنفس بدھید (در عرض یک ثانیه دمیده شود) زمانی که تنفس می‌دهید قفسه سینه مریض را از نظر بالا آمدن نگاه کنید.
- اگر قفسه سینه بالا نیامد، مانور سر عقب - چانه بالا را تکرار کنید.


بخش هفتم: احیای قلبی ریوی و اکسیژن درمانی / ۱۳۹

- دومین تنفس را بدھید. (در عرض یک ثانیه دمیده شود). به بالا آمدن قفسه سینه نگاه کنید.

توجه: اگر شما تنفس‌ها را با سرعت یا با نیروی زیاد بدھید هوا به جای ریه‌ها وارد معده می‌شود. این امر می‌تواند باعث اتساع معده شود.

برای جلوگیری از اتساع معده:

- هر تنفس را در عرض یک ثانیه بدھید.
- هر بار به مقدار کافی و به اندازه‌ای که قفسه سینه مصدوم بالا بیاید، هوا بدمید.



توجه: این مراحل را ۵ سیکل کامل (۳۰ بار ماساژ قلبی، ۲ بار تنفس) انجام دهید، سپس علائم برگشت جریان خون خود به خودی (مثل شروع بیمار به حرکت کردن، پلک زدن و یا برگشت تنفس) بیمار را مجددًا ارزیابی کنید.

اگر این علائم وجود نداشت مجددًا ۵ سیکل کامل (۳۰ ماساژ قلبی، ۲ تنفس) را انجام دهید. (۵ سیکل = ۲ دقیقه)

CPR is as easy as

C - A - B



Compressions
Push hard and fast
on the center of
the victim's chest

Airway
Tilt the victim's head
back and lift the chin
to open the airway

Breathing
Give mouth-to-mouth
rescue breaths

توجه:

در بزرگسالان اگر احیاگریک نفر یا دو نفر باشند نسبت ماساژ قلبی به تنفس همان ۳۰ به ۲ می‌باشد.

قطع احیای قلبی – ریوی :

CPR باید تا زمانی ادامه یابد که :

- نبض و تنفس بیمار برقرار شود.
- پرسنل اورژانس سررسیده و مصدوم تحويل آنها گردد.
- امدادگر از شدت خستگی قادر به ادامه CPR نباشد.

مواردیکه استفاده از تنفس دهان به دهان مجاز نیست :

- خودکشی مصدوم با سموم (آغشته شدن دهان و اطراف آن به سم)
- شکستگیهای فک و آسیبهای شدید ناحیه دهان
- انقباض شدید عضلات فک
- محیط نشدن کامل دهان امدادگر روی دهان مصدوم
- در این موارد باید به جای تنفس دهان به دهان از تنفس دهان به بینی استفاده شود.



احیای قلبی - ریوی برای کودکان (۱تا ۸ سال)

اگرچه مراحل CPR در بزرگسالان و کودک مشابه هم می‌باشد. اما تفاوت‌های کمی میان آن‌ها وجود دارد:

۱- ارزیابی :

کودک مصدوم را از نظر هوشیاری بررسی کنید. (مطابق آنچه که درمبخت بزرگسالان آموزش داده شد.)

۲- اورژانس ۱۱۵ را خبر کنید :

اگر احیاگر تنهاست قبل از خبر دادن به اورژانس باید حدود ۵ سیکل CPR را انجام دهد سپس اورژانس را خبر کند. ولی اگر کودک همراه دارد احیاگر از همراه کودک بخواهد که اورژانس را خبر کند.

۳- نبض را چک کنید:

برای چک کردن نبض در کودک مانند بزرگسال از نبض کاروتید (گردنی) استفاده می‌شود. اگر کودک هیچ نبضی نداشت و یا تعداد ضربان قلب کودک کمتر از ۶۰ بار در دقیقه و همراه با کاهش خون‌رسانی بافتی (رنگ پریدگی) باشد باید ۳۰ ماساژ قلبی را شروع کنید.



۴- ماساژ قلبی را شروع کنید:

- در یک طرف مصدوم قرار بگیرید.
- مصدوم را به پشت روییک سطح صاف و سفت قرار دهید.
- پوشش و لباس‌های کودک را از روی قفسه سینه بردارید.
- خط فرضی بین ۲ نوک سینه بکشید اگر کودک کوچک است با کف یک دست
- و اگر بزرگ است با کف دو دست ۳۰ ماساژ قلبی را شروع کنید.
(دست باید حالت قائم باشد)
- با هر ماساژ قلبی حدود $2/5$ - $3/5$ سانتیمتر قفسه سینه به پائین فشرده شود.



۵- راه هوایی کودک را باز کنید :

برای باز کردن راه هوایی کودک از مانور سر عقب - چانه بالا استفاده کنید. ابتدا باید مصدوم را بر روییک سطح صاف و سفت به پشت قرار دهید. در کودک برای باز کردن راه هوایی فقط کافی است سر کمی به عقب رانده شود.



۶- تنفس را چک کنید :

برای ارزیابی تنفس از روش نگاه کردن، گوش کردن و حس کردن استفاده نمایید.



۷- تنفس بدھید :

اگر مصدوم تنفس کافی و مناسب نداشت ابتدا ۲ تنفس دهان به دهان بدھید. به طوری که منجر به بالا آمدن قفسه سینه شود (هر تنفس در عرض یک ثانیه) ممکن است نیاز باشد یک بار دیگر برای دادن ۲ تنفس که منجر به بالا آمدن قفسه سینه شود تلاش کنید.

توجه: برای کودکان خیلی کوچک ممکن است از هوای کمتری نسبت به کودکان بزرگ‌تر و بزرگسالان استفاده کنید.



این مراحل را ۵ سیکل کامل (۳۰ بار ماساژ قلبی ، ۲ بار تنفس) انجام دهید ، سپس علائم برگشت جریان خون خود به خودی (مثل شروع بیمار به حرکت کردن ، پلک زدن و یا برگشت تنفس) بیمار را مجدداً ارزیابی کنید.

اگر این علائم وجود نداشت مجدداً ۵ سیکل کامل (۳۰ ماساژ قلبی ، ۲ تنفس) را انجام دهید.

توجه: در کودکان اگر احیاگریک نفر باشد نسبت ماساژ قلبی به تنفس ۳۰ به ۲ است ولی اگر احیاگر دو نفر باشد نسبت ماساژ قلبی به تنفس ۱۵ به ۲ است.

احیای قلبی - ریوی در شیرخواران (زیر یک سال)

اگرچه مراحل CPR در شیرخواران مانند بزرگسالان و کودکان می‌باشد اما تفاوت‌هایی وجود دارد که به ترتیب در ذیل به آن‌ها اشاره می‌گردد:



۱- ارزیابی:

- مطمئن شوید صحنه برای شما و شیرخوار امن است
- آهسته به کف پای شیرخوار ضربه بزنید.

اگر شیرخوار هیچ عکس العملی نشان نداد
مراحل CPR را شروع کنید.

۲- اورژانس ۱۱۵ را خبر کنید:

اگر احیاگر تنهاست قبل از خبر دادن به اورژانس باید حدود ۵ سیکل CPR را انجام دهد سپس اورژانس را خبر کند. ولی اگر کودک همراه دارد احیاگر از همراه کودک بخواهد که اورژانس را خبر کند.

۳- نبض را چک کنید:

- برای چک کردن نبض در شیرخوار، از نبض براکیال (بازویی) استفاده می‌شود.
- ۲ یا ۳ انگشت خود را در قسمت داخلی بازو بین آرنج و شانه شیرخوار قرار دهید.
 - به آرامی انگشت اشاره و میانی خود را در قسمت داخلی بازو فشار دهید برای حداقل ۵ ثانیه ولی کمتر از ۱۰ ثانیه، تا نبض را حس کنید.

- اگر هیچ نبضی نداشت و یا تعداد ضربان قلب کمتر از ۶۰ بار در دقیقه و همراه آن کاهش خونرسانی بافتی(رنگ پریدگی) وجود داشت ماساژ قلبی را شروع کنید.



۴- ماساژ قلبی را شروع کنید:

- شیرخوار را روییک سطح سفت و صاف قرا ردهید.
- پوشش و لباس را از روی قفسه سینه شیرخوار بردارید.
- یک خط فرضی بین ۲ نوک پستان بکشید. ۳ انگشت وسطی خود را روی استخوان جناغ سینه زیر این خط فرضی قرار دهید سپس انگشت بالایی را که نزدیک سراست بلند کنید و بعد با دوانگشت روی جناق سینه ۳۰ ماساژ قلبی را شروع کنید. (انگشتان باید به صورت راست باشند)
- با هر ماساژ قلبی حدود ۲/۵- ۱/۵ سانتیمتر قفسه سینه به پائین فشرده شود.
- بعد از هر ماساژ به صورت تکامل فشار افزایشی استخوان جناغ حذف نماید و اجزاء دهید برگشت قفسه سینه به حالت اول به طول کامل انجام شود.

بخش هفتم: احیای قلبی ریوی و اکسیژن درمانی / ۱۴۷



۵- راه هوایی را باز کنید:

در شیرخوار برای باز کردن راه هوایی کافی است سر شیرخوار در راستای تنه قرار گیرد.



۶- تنفس را چک کنید :

برای ارزیابی تنفس از روش نگاه کردن ، گوش کردن و حس کردن استفاده نمایید.



۷- تنفس بدھید:

- در شیرخوار ابتدا ۲ تنفس مصنوعی به روش دهان به دهان و بینی بدھید.
- برای باز نگه داشتن راه هوایی شیرخوار سر را در راستای تنہ قرار دھید.
- دهانتان را بر روی دهان و بینی شیرخوار محکم بچسبانید به طوری که هیچ منفذی برای ورود و خروج هوا وجود نداشته باشد.
- به داخل بینی و دهان شیرخوار بدミد (توقف برای انجام دم در بین تنفس‌ها) به طوری که با هر تنفس قفسه سینه بالا بیايد.
- اگر قفسه سینه بالا نیامد، می‌توان یک حوله یا ملحفه تا شده (۲-۳ سانتیمتر صخامت) در زیر شانه های مصدوم گذاشته و یک بار دیگر جهت دادن ۲ تنفس تلاش کنید .




توجه: در صورتی که نتوانید با دهانتان، دهان و بینی شیرخوار را بپوشانید از تکنیک دهان به دهان استفاده کنید.

آسیب سر، گردن، یا ستون فقرات

مانور باز کردن فک با فشار (Jaw Thrust)

اگر شک به آسیب ستون فقرات گردنی دارید، راه هوایی را با استفاده از مانور باز کردن فک با فشار، بدون عقب رفتن سر انجام دهید. به علت اولویت باز کردن راه هوایی و برقراری تهویه موثر در جریان انجام CPR، در شرایطی که با انجام مانور باز کردن فک با فشار نمی‌توانید راه هوایی را باز نمایید، از مانور سرعقب - چانه بالا استفاده نمایید.



فک بدون عقب بردن سر، به بالا حرکت داده می‌شود. این عمل، مانور انتخابی برای باز کردن راه هوایی در شرایطی است که شک به آسیب ستون فقرات گردنی وجود دارد.
مراحل زیر را برای انجام مانور باز کردن فک با فشار دنبال کنید:

مرحله	اقدام
۱	هر یک از دستان خود را در یک طرف سر مصدوم در شرایطی قرار دهید که آرنج شما روی سطحی قرار گیرد که مصدوم بر روی آن خوابیده است.
۲	انگشتان خود را زیر زوایای فک تحتانی مصدوم قرار دهید و آنرا با استفاده از هر دو دست خود به سمت بالا بلند کنید به گونه‌ای که فک به سمت جلو حرکت نماید.
۳	اگر لب‌ها بسته شد، با استفاده از انگشتان شست خود لب پایین را باز کنید.

وضعیت بهبود بخش (ریکاوری)

وضعیت ریکاوری را برای مراقبت از مصدومین بی‌هوش که تنفس موثری دارند بکار ببرید. زمانی که مصدوم بی‌هوش تنفس خودبخودی دارد، زبان، ترشحات و یا مواد استفراغی مصدوم می‌تواند راه هوایی را مسدود نماید. با قرار دادن مصدوم به پهلو، مایعات می‌تواند به راحتی از دهانش به بیرون جاری شود و از بروز این مشکل جلوگیری گردد. شما باید به دقت نبض و تنفس مصدوم را در وضعیت ریکاوری کنترل نمایید.

اگر ترومما به مصدوم وجود دارد و یا به وجود ترومما مشکوک هستید تنها زمانی مصدوم را جابجا کنید که قادر به باز کردن راه هوایی نیستید و یا صحنۀ حادثه، ایمن نیست و یا به هر دلیلی شما نمی‌توانید CPR را انجام دهید. در چنین شرایطی می‌بایست در هنگام چرخاندن بیمار از ستون فقرات حمایت نمایید.

توجه: وضعیت ریکاوری برای شیرخواران و کودکان کوچک توصیه نمی‌شود زیرا این وضعیت در شرایطی که سر مصدوم به خوبی حمایت نگردد می‌تواند باعث بسته شدن راه هوایی او گردد.



شکل ۲۰ - وضعیت ریکاوری

علائم تجدید حیات

با توجه به علائم زیر متوجه می‌شویم که CPR موفق بوده و به هدف رسیده‌ایم:

- ۱- بهبود رنگ پوست و غشا، مخاطی
- ۲- تنگ شدن مردمک چشم
- ۳- تنفس عمیق و صدا دار
- ۴- حرکات غیر ارادی در دست‌ها و پاها
- ۵- شروع حرکات بلعی
- ۶- ظاهر شدن اشک در گوشه چشم
- ۷- حس کردن نبض بیمار

انواع روش‌های تنفس مصنوعی

- ۱- تنفس دهان به دهان
- ۲- تنفس دهان به بینی
- ۳- تنفس دهان به دهان و بینی

اکسیژن درمانی

اکسیژن گازی است بی‌طعم، بی‌بو، بدون رنگ و قابل اشتعال که ۲۰٪ از هوای معمولی را شامل می‌شود.

هر گاه اکسیژن بطور طبیعی به بدن نرسد و تنفس مشکل و سخت باشد لازم است اکسیژن مورد نیاز برای فرد تاً مین گردد، از موارد نیاز به دریافت اکسیژن می‌توان بیماری قلبی، بیماری ریوی، مسمومیت با گازها را ذکر کرد.

دستگاه اکسیژن چیست؟

این دستگاه وسیله‌ای است برای رساندن اکسیژن به شخصی که دچار کمبود اکسیژن شده است.

دستگاه اکسیژن شامل دو قسمت است:

قسمت اول کپسول اکسیژن است که مخزنی استوانه‌ای شکل و حاوی اکسیژن است.

قسمت دوم مانومتر است و

شامل موارد زیر است:

۱- فشار سنج: نشان‌دهنده

فشار گاز درون کپسول است.

۲- شیر تنظیم کننده خودکار:

فشار گاز درون کپسول را قبل


از رسیدن به مانومتر کاهش

می‌دهد.

۳- جریان سنج: مقدار اکسیژن

صرف شده را بر حسب لیتر در

دقیقه نشان می‌دهد.



۴- پیچ کنترل: که بوسیله آن میزان اکسیژن را با توجه به جریان سنج می‌توان تنظیم کرد.

۵- شیشه محتوی آب مقطر: برای مرطوب کردن اکسیژن بکار می‌رود.

انواع روش‌های دادن اکسیژن:

۱- استفاده از سوند بینی (کانولای بینی)

۲- استفاده از ماسک

استفاده از سوند بینی: نسبت به ماسک کاربرد بیشتری داشته از این روش به صورت وسیعی برای اکسیژن رسانی بیماران دچار هیپوکسی که به غلظت‌های کم تا متوسط اکسیژن نیاز دارند استفاده می‌گردد.

استفاده از ماسک: در این روش اکسیژن با غلظت ورطوبت بیشتر به بیمارداده می‌شود و در بیمارانی که با دهان تنفس می‌کنند تجویز اکسیژن با این روش مؤثرتر از کانولای بینی است.

طریقه استفاده از دستگاه اکسیژن:

- ۱- مانومتر را به کپسول اکسیژن وصل کنید.
- ۲- شیشه محتوی آب مقطر را تا یک سوم یا خط نشانه پر کنید.
- ۳- یک سر لوله پلاستیکی بلند را به طرف محتوای آب مقطر و سر دیگر را به سوند بینی و یا ماسک وصل کنید.
- ۴- شیر اصلی کپسول را باز کنید.
- ۵- پیچ کنترل اکسیژن را در حدود ۳ لیتر در دقیقه باز کنید، برای امتحان سر سوند را داخل لیوان آب بگذارید اگر حباب تولید شد دلیل بر این است که جریان اکسیژن برقرار است سپس پیچ کنترل را ببندید.
- ۶- بیمار را در وضعیت نیمه نشسته قرار دهید.
- ۷- اگر از سوند استفاده می‌کنید مطابق شکل زیر سوند را برای بیمار وصل کنید.



۸- چنانچه از ماسک استفاده می کنید بایستی ماسک را روی دهان و بینی فرد گذاشته و بند کشی ماسک را در پشت سر وی ثابت کنید طوریکه از اطراف ماسک اکسیژن خارج نشود.

۹- پیچ کنترل اکسیژن را باز کنید تا جریان اکسیژن برقرار شود، میزان اکسیژن برای بزرگسالان حداکثر ۵ تا ۶ لیتر در دقیقه و برای اطفال ۲ تا ۳ لیتر در دقیقه مناسب است.

توجه: دادن اکسیژن به مقدار زیاد باعث می شود ریه ها نتواند کار خود را به خوبی انجام دهند و بعلت کندی کار ریه ها عمل تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن بطور طبیعی صورت نگیرد، در نوزادان و اطفال نیز اکسیژن زیاد باعث نابینایی می شود.

۱۰- علائم حیاتی و حال عمومی بیمار را باید دقیقاً در طی مدت اکسیژن درمانی کنترل کنید.

۱۱- بعد از اتمام کار پیچ کنترل و شیر اصلی کپسول را ببندید و کپسول اکسیژن را در محل مناسبی قرار دهید.

تذکرات مهم:

به خاطر داشته باشید:

- دستگاه اکسیژن دور از نور مستقیم آفتاب و حرارت قرار گیرد.

- علامت سیگار کشیدن ممنوع، در محلی که در معرض دید همگان باشد نصب گردد.

- وسایل الکتریکی داخل اتاق از نظر درست کار کردن و خارج نشدن جرقه مرتباً کنترل شود.

- محفظه آب باید در فواصلی که از دستگاه استفاده نمی شود بصورت خشک نگهداری شود و همیشه قبل از استفاده بلا فاصله آب در محفظه ریخته شود.

- همیشه در ابتدای کار شیر اصلی کپسول و سپس پیچ کنترل را باز کنید.

- به کنار کپسول سرنگی را با چسب ثابت کرده تا در موقع لزوم لوله پلاستیکی به آن متصل شود و بدین ترتیب از تماس آن با زمین جلوگیری گردد.
- بعد از اتمام اکسیژن درمانی سوند ویا ماسک را ضد عفوی کرده و در داخل کیسه پارچه‌ای یا نایلونی تمیز قراردهید.
- جهت جابجایی کپسول اکسیژن از پایه چرخدار استفاده شود و در صورت نبودن به حالت دورانی حرکت داده شود.
- برای تعویض اکسیژن از آچار مخصوص استفاده شود.
- کپسول اکسیژن همیشه پر و آماده باشد.
- محل قرار گرفتن کپسول اکسیژن بالای تخت معاینه می‌باشد.

تمرین عملی

- ۱- مراحل احیاء قلبی شاهدرابر روی مانکن آموزشی تمرین نمایید.
- ۲- مراحل احیاء قلبی- ریوی فرد بالغ را با یک و دو کمک کننده، بر روی مانکن آموزشی انجام دهید.
- ۳- مراحل احیاء قلبی- ریوی کودک را با یک کمک دهنده بر روی مانکن آموزشی انجام دهید.
- ۴- مراحل احیاء قلبی- ریوی کودک را بر روی مانکن آموزشی انجام دهید.
- ۵- مراحل احیاء قلبی- ریوی‌شیرخوار را بر روی مانکن آموزشی انجام دهید.
- ۶- نحوه آماده سازی و کاربرد کپسول اکسیژن را هم با ماسک و هم با سوند بینی تمرین نمایید.

بخش هشتم

اختلالات گردن خون (صرع، بیهوشی، شوک)

اهداف آموزشی

انتظار است پس از یادگیری محتوای این مبحث فراغیر بتواند:

- ۱- علل عمومی ایجاد کننده صرع را فهرست نماید.
- ۲- علایم درجات مختلف بیهوشی را بیان نماید.
- ۳- علایم و نشانه‌های عمومی شوک را توضیح دهد.
- ۴- انواع شوک را براساس علت بوجود آورنده لیست نماید.
- ۵- اقدامات اولیه که در برخورد با مصدوم دچار شوک باید انجام گیرد را توضیح دهد.

تشنج :

تشنج عبارتند از اختلال در فعالیت فیزیکی مغز که به ۲ صورت عمومی و موضعی ایجاد می‌شود.

تشنج عمومی :

اختلال به تمام قسمت‌های مغز متشرمی شود، فردی بی هوش شده و دچار اختلال در اندام‌ها می‌شود.

تشنج موضعی :

اختلال در یک قسمت از مغذ باقی می‌ماند، فرد بی هوش و فقط در یک بخش از بدن مانند دست‌ها و پاها دچار لرزش و اسپاسم می‌شود.

اگر تشنج به طور مکرر در طول زمان تکرار شود و ضایعات مغزی (مانند آبسه، تومورو سکته مغزی) یا اختلالات خاصی (مانند کاهش قند خون یا تب بالا) در بدن وجود نداشته باشد به آن صرع گفته می‌شود.

صرع (اپی لپسی)

صرع مجموعه‌ای است از علائم که بر اثر اختلال در عملکرد سلول‌های مغزی ایجاد می‌گردد و با تشنج‌های مکرر مشخص می‌شود. این بیماری در هر سنی ظاهر می‌شود و در جوانان شایع‌تر است بیش از ۲۰٪ موارد صرع قبل از ۲۰ سالگی شروع می‌شود.

علل بیماری صرع

در اغلب مبتلا یان به صرع دلیل مشخصی برای بروز این بیماری یافت نمی‌شود ولی شواهدی به نفع ارثی بودن آن وجود دارد هم چنین صدمات مغزی، تومورهای مغزی، عفونت و خونریزی مغز از علل این بیماری محسوب می‌شود.

علائم و نشانه‌ها:

مرحله اول :

- مصدوم ناگهان بی هوش شده به زمین می‌افتد.
- سپس برای چند لحظه بدن مصدوم سفت و سخت شده نفس او بند می‌آید.
- لب‌ها کبود شده، صورت و گردن به طور غیرعادی پرخون می‌شود.

مرحله دوم :

- ماهیچه‌های بدن مصدوم شل شده حرکات تشنجمی شروع می‌شود حرکات تشنجمی به صورت انقباض و انبساط اندام‌های ماهیچه‌ای بدن دیدن می‌شود.
- تنفس مشکل و صدادار می‌شود، دهان مصدوم قفل شده کف در اطراف دهان اوظاهر می‌شود که گاهی به علت گازگرفتن زبان، کف آغشته به خون است بی اختیاری درد فوج ادرار و مدفع نیز دیده می‌شود.
- سرانجام ماهیچه‌ها شل شده مصدوم برای چند دقیقه بی هوش می‌ماند.
- مصدوم پس از بیدارشدن احساس سرگیجه دارد و ممکن است تمایل شدیدی به خوابیدن داشته باشد

اقدامات لازم در برخورد با بیمار صرعی

- ۱- مصدوم را روی سطح صاف بخوابانید.
- ۲- از سوی مصدوم محافظت کنید اگر مصدوم سقوط کرده به علائم آسیب سر توجه کنید.
- ۳- پوشش‌های تنگ اطراف گردن و سینه را آزاد کرده، اطراف مصدوم را خلوت کنید.
- ۴- هیچگاه در حال تشنج به مصدوم خوراکی یا نوشیدنی ندهید.
- ۵- سعی نکنید که دست و پای مصدوم را برای جلوگیری از تکان‌های ناشی از تشنج نگه دارید.

بخش دهم؛ شکستگی‌ها، درفتگی‌ها، آسیب‌های عضلانی مفصلی ۱۵۹ /

- ۶- در صورت قفل شدن دندان‌های مصدوم سعی نکیند بین دندان‌های او چیزی قرار دهید.
- ۷- روی صورت مصدوم یا داخل دهان او آب نریزید.
- ۸- مصدوم را به محل دیگری انتقال ندهید مگر این که خطری مصدوم یا شما را تهدید کند.
- ۹- هنگامی که تشنج پایان یافت مصدوم را به پهلو برگردانید یا او را در وضعیت بهبود بخش قرار دهید.
- ۱۰- به دنبال علامت مخصوص که معرف بیماری صرع است بگردید. (گردن‌بند، مج‌بند، کارت مخصوص)
- ۱۱- لازم به ذکر است که علائم ناشی از صرع پس از ۱-۲ دقیقه تمام می‌شود و در اکثر موارد نیاز به مراقبت‌های پزشکی نمی‌باشد.
- ۱۲- پس از اتمام حمله تا زمانی که از بهبود حال مصدوم مطمئن نشده اید در کار مصدوم بمانید.
- ۱۳- سعی نکنید که او را بیدار کنید.

توجه:

- هرگاه یکی از شرایط زیر را دارا بود به مرکز اورژانس اطلاع دهید:
- اگر تشنج علت مشخصی نداشته باشد.
- اگر تشنج بیش از ۵ دقیقه طول بکشد.
- بیدار شدن مصدوم طولانی شود و یا تشنج تکرار شود.
- مصدوم دچار مشکلات تنفسی باشد.
- مصدوم باردار بوده یا مشکلات طبی دیگری داشته باشد.
- علائمی از صدمه در قسمت‌های مختلف بدن، شکستگی به دنبال زمین خوردن در مصدوم وجود داشته باشد.

تعريف بیهوشی

بیهوشی حالتی است که در آن فرد آگاهی و هوشیاری خود را از دست داده و از آنچه در اطرافش می‌گذرد بی‌خبر است.

درجات مختلف بیهوشی

- مرحله خواب آلوگی: خفیف ترین حالت بیهوشی است که اگر با فرد صحبت شود فوراً به هوش می‌آید.

- مرحله گیجی: بیمار به سختی و با فریاد کشیدن یا تکان دادن و تحریکات بیشتر به هوش می‌آید و به سوالات جواب می‌دهد.

- غش یا سنکوب: بیهوشی موقت و ناگهانی است که به علت قطع کوتاه مدت جریان خون در مغز ایجاد می‌شود.

در یک شخص سالم علی از جمله سرپا ایستادن طولانی، ترس، درد، هیجان، وحشت و دیدن خون می‌تواند باعث غش شود مشکلات جدی از جمله ناراحتی قلی و خونریزی از علل دیگر می‌باشند.


- اغما یا کما: شدیدترین و طولانی ترین حالت بیهوشی است که در آن فرد به تحریکات خارجی جواب نمی‌دهد.


از شایع‌ترین علل کما می‌توان خونریزی مغزی، مسمومیت‌های شدید، اعتیاد به الکل و مواد مخدر، بیماری‌های سوخت و ساز مثل دیابت و بیماری کلیه را ذکر کرد.

اگر مصدوم بیهوش باشد راه تنفس ممکن است تنگ و یا مسدود باشد که این امر به چند دلیل اتفاق می‌افتد:

۱- سر به جلو خم شده باشد که در این صورت راه تنفس تنگ می‌شود.

۲- ماهیچه گلو کنترل خود را روی مسیر هوا از دست داده باشد که این





امرباعثمی‌شود زبان به عقب برگرددو
راه هوا را مسدود کند.

۳- در هنگام بیهوشی چون عمل انعکاسی بلع انجام نمی‌شود. ممکن است آب دهان و یا استفراغ در عقب گلو راه هوا را سد کند. هر یک از این شرایط ممکن است منجر به مرگ مصدوم شود.

بنابراین حتماً باید راه تنفسی باز گردد، به این ترتیب که یک دست خود را زیر گردن و دست دیگر را روی پیشانی مصدوم قرار دهید و سر مصدوم را به عقب خم نمایید. این کار باعث کشیدگی سر و گردن شده و راه تنفس را باز می‌کند.

برای فرد بیهوش چه اقداماتی را باید انجام داد؟

۱- اگر احتمال آسیب ستون مهره‌ها را در فرد بیهوش نمی‌دهید بهترین حالت این است که مصدوم را روی سطح صاف بخوابانید و پاهای او را ۲۰-۵۲ سانتی‌متر بالاتر از سطح زمین قرار دهید.

۲- لباس‌های تنگ وی را شل کنید و دندان مصنوعی‌اش را خارج نمایید.

۳- چیزی از راه دهان به مصدوم ندهید تا زمانی که کاملاً بیدار شود و قدرت بلع کافی را داشته باشد.

۴- از پاشیدن یا ریختن آب روی صورت مصدوم خودداری کنید.

۵- از زدن سیلی به صورت مصدوم به قصد بیدار شدن وی خودداری کنید.

۶- وضعیت راه تنفس و نفس کشیدن و گردش خون بیمار را برسی کنید و پس از باز کردن راه تنفس در صورت لزوم تنفس مصنوعی و ماساژ قلبی را شروع کنید.

۷- اگر به دستگاه اکسیژن دسترسی دارید به فرد اکسیژن بدهید.

۸- در موارد نیاز سایر اقدامات را برای فرد انجام دهید مانند پانسمان زخم، آتل بندی و.....

- ۹- بعد از بهوش آمدن به بیمار قوت قلب دهید و نگذارید به سرعت بلند شود، هیچگاه برای بیدار کردن و به هوش آوردن روی صورت شخص آب نپاشید و یا به صورتش سیلی نزنید.
- ۱۰- پس از انجام اقدامات فوق بیمار را ارجاع فوری دهید.

شوک

شوک یک وضعیت بالینی است که در اثر کاهش خونرسانی به نسوج ایجاد می‌شود یا کم شدن فعالیتهای حیاتی بدن را در اثر عوامل و حوادث گوناگون شوک می‌نامند. این حالت دارای درجات مختلفی است از ضعف تا از پا افتادگی کامل.

أنواع شوك

شوک شوک ناشی از کمبود مایعات (هیپو و لمیک): در اثر کم شدن حجم مایعات بدن در اثر خونریزی داخلی و یا خارجی، از دست دادن پلاسمما به علت سوختگی‌های شدید، از دست دادن آب بدن به علت اسهال و یا استفراغ شدید حاصل می‌گردد.


شوک قلبی (کاردیوژنیک): بر اثر بروز حملات قلبی و ناکافی بودن گردش خون در بدن به علت اختلالات ریتم قلب حاصل می‌شود

شوک عصبی (نوروژنیک): بر اثر دردهای فوق العاده و یا وحشت بیش از حد ایجاد می‌گردد

شوک حساسیتی (آنا فیلا کتیک): بر اثر حساسیت به مواد دارویی و یا غذایی خاص ایجاد می‌گردد

شوک عفونی (سپتیک): بر اثر هجوم باکتری‌ها به داخل خون از یک کانون عفونی در بدن ایجاد می‌گردد

علائم و نشانه‌های شوک



- ۱- ضعف و سستی
- ۲- تهوع
- ۳- تشنجی
- ۴- سر گیچه
- ۵- سردی
- ۶- بیقراری
- ۷- استفراغ
- ۸- لرزش
- ۹- فقدان هوشیاری
- ۱۰- نبض تند و ضعیف
- ۱۱- هیپو تانسیون تا حدود ۹۰/۶۰ و شاید پائین تر
- ۱۲- تنفس سطحی و تند

انواع شوک و کمک‌های اولیه

نوع شوک	علل	کمک‌های اولیه
شوک ناشی از کمبود مایعات	از دست رفتن خون و مایعات بدن (خونریزی‌ها، اسهال و استفراغ، سوختگی، گرمایشی)	ارزیابی مصدوم، برقراری تنفس و گردش خون، بالا نگه داشتن پای مصدوم، جلوگیری از آسپیراسیون، انتقال و ارجاع سریع مصدوم به پزشک
شوک حساسیتی	واکنش حساسیتی شدید به دارو یا مواد خاص	بازکردن راه هوایی، برقراری تنفس، تعیین علت بروز شوک، انتقال و ارجاع مصدوم به پزشک
قلبی	سکته قلبی، اختلال دریچه ای قلب و...	قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب و راحت، دادن اکسیژن و برقراری تنفس، انتقال و ارجاع سریع به پزشک
عفونی	وجود عوامل عفونی در خون	قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب و راحت، دادن اکسیژن و برقراری تنفس، انتقال و ارجاع سریع به پزشک
عصبي	آسیب و ترومما به طناب نخاعی یا مغز	بازکردن راه هوایی، برقراری تنفس، تعیین علت بروز شوک، انتقال و ارجاع مصدوم به پزشک

اصول کلی درمان شوک

هدف:

۱- تامین خون کافی برای قلب، شش‌ها و مغز.

۲- مشخص کردن علت شوک.

۳- مداوای آن و رساندن مصدوم به بیمارستان.

درمان:

۱- قرار دادن بیمار در یک وضعیت راحت و اطمینان خاطر مصدوم.

۲- اگر وضعیت مصدوم اجازه می‌دهد او را به پشت بخوابانید.

۳- سر مصدوم را برای تامین خون کافی برای مغز و کاهش خطر استفراغ که ممکن است محتويات معده وارد نای شده و باعث خفگی شود، پائین نگه داشته و به یک طرف خم کنید.



۴- بالاتر نگه داشتن پاهای بیمار از سطح قلب بشرط نداشتن شکستگی در پا.

۵- مصدوم را گرم نگه دارید این کار را با یک پتو می‌توانید انجام دهید.

۶- هر پوشش تنگی را شل کنید تا به گردش خون و تنفس کمک شود.

۷- در صورت نیاز اکسیژن درمانی را برای بیمار انجام دهید.

۸- بدبال علت شوک بگردید و اگر امکان داشت آنرا رفع کنید.

۹- از حرکت غیر ضروری مصدوم دچار شوک بپرهیزید چون حرکت باعث عمیق‌تر شدن شوک می‌شود.

۱۰- اگر مصدوم تقاضای آب کرد لب‌های او را با آب تر کنید اما چیزی به او ننوشانید.


۱۱- میزان تنفس، نبض و سطح هوشیاری را هر ۱۰ دقیقه یکبار آزمایش کنید.

۱۲- در صورت اشکال در تنفس و یا اگر مصدوم خواست استفراغ کند و یا اگر بیهوش شد او را در وضعیت بهبودبخش قرار دهید.(در این وضعیت، راه تنفس باز می‌ماند و زبان به عقب گلو نمی‌افتد)

۱۳- اگر ضربان و تنفس ایستاد روش‌های نجات زندگی را بلافصله شروع کنید.

۱۴- به مصدوم چیزی از راه دهان ندهید این امر باعث جلوگیری یا به تعویق انداختن اقداماتی نظیر بیهوشی در بیمارستان خواهد شد.

۱۵- بلافصله او را با برانکارد به شکلی که وضعیت درمانی اش حفظ شود به بیمارستان برسانید.



توجه: در مورد مصدومین بیهوشی که از ناحیه بالا تنه و یا پایین تنه دچار شکستگی شده‌اند و نمی‌توان جهت بهبود بخشیدن تنفس، عضو صدمه دیده را خم کرد و از آن به عنوان حائل استفاده کرد. می‌توان با قرار دادن یک پتوی لوله شده در کنار مصدوم، وضعیت بهبود بخش را برای او فراهم کرد.

توجه: نباید به مصدوم چیزی از راه دهان بدهید، مگر آنکه کاملاً به هوش آید. در این حالت چند جرعه آب سرد به او بدهید.

سکته مغزی

این واژه برای توصیف حالتی به کار می‌رود که لخته شدن خون باعثی شود که تامین خون قسمتی از مغز به طور ناگهانی و بحرانی دچار اختلال گردد(ترومبوز مغزی) و یا حالتی که پاره شدن شریانچه‌های مغزی باعثی شود که خون به داخل مغز چکه کند(خونریزی مغزی) حالت اخیر بیشتر برای کسانی که فشار خون بالا دارند پیش می‌آید و در هر دو مورد سلول‌های آسیب دیده مغز از وظایفشان باز می‌مانند. هر ناحیه از مغز، سیستم و یا قسمت خاصی از بدن را کنترل می‌کند و هر نوع از کار افتادگی اعضای بدن که از سکته ناشی می‌شود بستگی به این دارد که کدام قسمت مغز و تا چه حد تحت

تاثیر سکته قرار گرفته است، سکته مغزی بیشتر در افراد میانسال، افرادی که دچار بیماری‌ها و اختلالات گردش خون هستند دیده می‌شود.

علائم سکته مغزی



عوارض و نشانه‌ها:

- سر درد شدید ناگهانی
- نبض کامل و پر است
- مصدوم جهت را گم می‌کند و دچار تیرگی شعور می‌شود
- سرگیجه و احتمالاً بیهوشی
- بسه به شدت عارضه، ممکن است یکی یا چند از علائم زیر ظاهر شود، مانند ضعف و بیحسی در یک یا هر دو دست و پا و در یک سمت بدن، صورت بر افروخته با پوست گرم و خشک، مردمک‌های چشم به طور نامساوی گشاد می‌شوند.

اقدامات درمانی اولیه

- ۱- اگر مصدوم به هوش است او را بخوابانید، سر و شانه‌هایش را کمی بالاتر قرار دهید، سر مصدوم را به یک سو خم کنید تا آب دهان از گوشه دهان بیرون ببریزد.
- ۲- پوشش‌های تنگ دور گردن، سینه، کمر را شل کنید تا به گردش خون و تنفس کمک کند.
- ۳- وضعیت عمومی و علائم حیاتی او را کنترل کنید.



بخش دهم؛ شکستگی‌ها، درفتگی‌ها، آسیب‌های عضلانی مفصلی / ۱۶۷

- ۴-اگر مصدوم بیهوش شد او را در وضعیت بهبود بخش قرار دهید.
- ۵-اگر تنفس و ضربان قلب باز ایستاد احیاء قلبی، تنفسی را شروع کنید.
- ۶-مصدوم را با برانکارد و با حفظ وضعیت بلافاصله ارجاع دهید.

تمرین نظری

- ۱- نشانه‌های افتراقی انواع شوک را بر حسب عامل بوجود آورنده توضیح دهید.
- ۲- اقدامات اولیه در صرع را توضیح دهید.
- ۳- اقدامات اولیه در بی هوشی را شرح دهید.
- ۴- علائم و نشانه سکته مغزی و اقدامات اولیه در این بیماران را توضیح دهید.

بخش نهم

خفگی


اهداف آموزشی

انتظار است پس از یادگیری محتوای این مبحث فرآگیر بتواند:

- ۱- خفگی را تعریف کرده و دلایل ایجاد آن را فهرست نماید.
- ۲- علایم و نشانه‌های خفگی ناشی از بسته شدن راههای هوایی را فهرست نماید.
- ۳- علایم و نشانه‌های خفگی ناشی از غرق شدن در آب را فهرست نماید.
- ۴- عوارض و نشانه‌های خفگی ناشی از جراحات‌های قفسه سینه را فهرست نماید.
- ۵- عوارض و نشانه‌های خفگی ناشی از مسمومیت با گازها و مواد سوختنی را فهرست نماید.
- ۶- عوارض و نشانه‌های خفگی ناشی از برق گرفتگی را فهرست نماید.
- ۷- اقدامات اولیه لازم در مورد هر یک از انواع خفگی را بسته به علل ایجاد‌کننده توضیح دهد.

(CHOKING) خفگی

این حالت که بالقوه خطرناک است زمانی اتفاق می‌افتد که بافت‌های بدن به اکسیژن کافی دسترسی نداشته باشند. این فقدان ممکن است به کمبود اکسیژن در هوایی که تنفس می‌کنیم، اختلال و یا جراحت در سیستم تنفسی مربوط باشد..



بدون اکسیژن کافی، بافت‌ها به سرعت کار آیی خود را از دست می‌دهند. به عنوان مثال، سلولهای حیاتی در مغز تنها ۳ دقیقه می‌توانند بدون اکسیژن دوام بیاورند. عوامل مختلف می‌توانند باعث خفگی شوند. از عواملی که بر روی تنفس و شش‌ها اثر می‌گذارند عبارتند از:

مسدود شدن راه تنفس

یک حالت آن، زمانی ایجاد می‌شود که یک شیء مسدود کننده وارد راههای هوایی شود، آن را درگیر کند و باعث بسته شدن آن و گرفتگی عضلات گلو شود.

علل معمول آن عبارتند از:

۱- بالغینی که غذا را به خوبی نمی‌جوند

۲- در کودکان کم سن و سال، بر اثر فرو دادن ناگهانی شیرینی‌های پخته، نوک قلم و یا سایر اشیاء کوچک

تشخیص:



۱- یک فردی که دچار خفگی شده است ممکن است به زحمت صحبت نماید و یا تنفس سخت داشته باشد، گلو را نشان دهد و حتی آن را چنگ بزند.

۲- عروق خونی صورت و گلو متورم شده است

۳- پوست‌رنگ خاکستری می‌یابد و سیانوز و کبود می‌شود.

۴- اطرافیان به شما می‌گویند که فرد با عجله غذا می‌خورد

و یا شیء را در دهانش داشته است. در ادامه چنین حالتی

اگر شیء راه تنفسی را مسدود نماید و برطرف نشود فرد ممکن است که بیهوش شود.



اصول اقدامات اولیه

۱- عامل ایجاد کننده انسداد را بر طرف نمایید

۲- تنفس طبیعی را برقرار کنید

۳- مراقبت‌ها و امداد پزشکی را تا بهبودی کامل ادامه دهید.

توجه: انجام کمک‌های اولیه در کودکان و نوزادان دچار خفگی متفاوت از بزرگسالان است.



اقدامات اولیه در خفگی با جسم خارجی در بالغین

گام ۱: فرد را به سرفه کردن تشویق کنید.

گام ۲: اگر با سرفه کردن جسم خارجی برطرف نشد با کف دست خود در حالی که فرد را از ناحیه کمر خم نموده‌اید، ۵ بار با سرعت بین کتف‌های او بکویید.

گام ۳: اگر کوبیدن کف دست به پشت فرد دچار خفگی موفقیت آمیز نبود ۵ فشار شکمی وارد نمایید به این صورت که در پشت فرد بایستید. دست‌های خود را زیر قفسه سینه او قفل نمایید. دست‌ها را سریعاً به داخل و بالا بکشید.

گام ۴: اگر لازم بود ۵ بار کوبیدن به پشت را با کف دست،

۵ بار فشار شکمی را تا زمانی که عامل ایجاد کننده انسداد برطرف شود بکار ببرید.

گام ۵: اگر فرد بیهوش شد عملیات احیاء را شروع نمایید.


اقدامات اولیه در خفگی با جسم خارجی در مصدوم بی هوش:

۱- مصدوم را به پشت بخوابانید و راه تنفس او را باز کنید. تنفس مصنوعی را شروع کنید.

۲- اگر مصدوم به هوش نیامد او را به پهلو بچرخانید به طوری که سینه‌اش روی رانهای شما قرار گیرد (سنگینی بدن مصدوم روی پاهای شما بیفتد).
 و سر کاملاً عقب باشد و به ترتیبی که گفته شد ۵ ضربه به پشت او وارد کنید.

۳- دهان او را کنترل کنید که اگر شیء بیرون آمده باشد با انگشت خود آن را محکم بگیرید و بیرون بکشید، اگر شیء بیرون نیامده بود بیمار را به پشت بخوابانید، سر کاملاً به عقب خم شود و روی شکم فشار وارد کنید.

به این ترتیب گه:

۱- زانوان خود را در دو طرف مصدوم در کنار رانهای او روی زمین قرار دهید به طوری که بتوانید درست در وسط شکم او فشار وارد کنید. اگر نتوانستید کنار او زانو بزنید.


۲- کف دست را وسط قسمت بالایی شکم قرار دهید و دست دیگر را روی آن قرار داده به طوری که انگشتان شما از شکم او جدا باشد و فقط کف دست به شکم بچسبد.

۳- هر دو بازو را راست نگاه داشته و سریع یک فشار محکم به سمت داخل و جلو وارد کنید. در صورت لزوم ۵ بار این کار را تکرار کنید. هر کدام از فشارها باید به اندازه کافی محکم باشد تا بتواند لقمه را خارج کند.

اقدامات اولیه در خفگی با جسم خارجی در کودکان (۱ تا ۸ سال)

اقدامات زیر برای کودکان با فشار کمتری لازم است.

گام ۱: کودک را وادار به سرفه کردن نمایید.



گام ۲: کودک را به سمت جلو خم نمایید به طوری که سر او پایین‌تر از قفسه سینه‌اش باشد. با کف دست ۵ بار به پشت او بین کتف‌هایش بکوبید.

گام ۳: دهان کودک را کنترل نمایید و هر گونه شیء قابل دید را با یک انگشت خارج نمایید.



گام ۴: اگر ضربه به پشت موفقیت‌آمیز نبود فشار به قفسه سینه کودک (زمان هر فشار ۳ ثانیه) وارد نمایید به این صورت که بايستید و یا در پشت کودک زانو بزنید. یک دست خود را در قسمت زیرین قفسه سینه کودک قرار دهید دست دیگر خود را با آن چنگ نمایید و به طور سریع به قفسه سینه کودک فشار وارد کنید

گام ۵: دهان کودک را مجدداً برای رویت شیء عامل انسداد کنترل نمایید. مواظب باشید که با دست خود و با فشار به عقب گلوی کودک جسم خارجی را بیشتر به درون نرانیید.

گام ۶: ضربه به پشت را دوباره انجام داده و دهان کودک را مجدداً کنترل نمایید.

گام ۷: اگر ضربه به پشت موفقیت‌آمیز نبود ۵ فشار را به قفسه سینه مجدداً تکرار نمایید.


گام ۸: دهان کودک را مجدداً کنترل و هر گونه عامل انسداد قابل دید را با یک انگشت خارج نمایید.

گام ۹: اگر لازم بود مراحل ۲-۸ را تارسیدن کمک تکرار نمایید.

اقدامات اولیه در خفگی با جسم خارجی در شیرخواران (زیر ۱ سال)



گام ۱: صورت نوزاد را به طرف پایین بر روی بازویتان قرار دهید به طوری که سرش پایین‌تر از قفسه سینه قرار بگیرد. با کف دست با ملایم‌تر و لی به محکمی ۵ ضربه بین کتفهای نوزاد وارد نمایید.



گام ۲: اگر ضربه به پشت نوزاد موفقیت آمیز نبود ۵ فشار روی قفسه سینه نوزاد وارد کنید. به این صورت که نوزاد به پشت خوابیده و صورت او به سمت بالا باشد و سر پایین‌تر از قفسه سینه و بدن نوزاد بوسیله بازوی شما حمایت گردد. نوک دو انگشت خود را فقط بر روی قسمت میانی قفسه سینه نوزاد (درناحیه بین دو سینه یک انگشت پائین تراز خط سینه به همان ترتیبی که در CPR انجام می‌شود) قرار دهید. سریعاً به پایین فشار وارد نمایید.

گام ۳: دهان نوزاد را کنترل و هر گونه شیء قابل دید را با کمک یک انگشت خارج نمایید.

گام ۴: مراحل ۱-۴ را تا ۳ بار مجدداً تا زمانی که انسداد بر طرف نشده و تا رسیدن به مرکز مجهر تکرار نمایید و در صورت لزوم نوزاد را احیاء نمایید.

توجه:

داشته باشید که هیچ‌گاه برای شیرخوار زیر یک سال فشار بر روی شکم وارد نکنید.
(زیرا سبب آسیب کبد می‌گردد).

اقدامات اولیه در خفگی با جسم خارجی در افراد باردار و چاق :

دراین افراد :

- به جای فشار ببروی شکم (مانورهیم لیخ) از مانور فشاربه قفسه سینه استفاده شود.


به این صورت که:

- بیمار را ایستاده یا نشسته نگه داشته، پشت او ایستاده و دستان خود را از زیربغل اورد کنید تا دور قفسه سینه حلقه شود.

- سپس دست خود را مشت کرده و سمت انگشت شست را در مرکز قفسه سینه بگذارید. اگر نزدیک لبه های دنده هستید یعنی خیلی پائین قرار گرفته اند.


- دو دست خود را در هم گره نموده و محکم به عقب فشاردهید.

- این کار را تازمانی که جسم خارجی بیرون آمده یا بیمار غیرپاسخگو (بی هوش) شود ادامه دهید.



مسدود شدن راه تنفس در اثر کمبود هوا

راه هوایی ممکن است بوسیله فشار بر روی آن بسته شود و یا دچار اختناق گرددو یا
دهان و بینی بسته شود که در نتیجه‌های وارد ریه‌ها نمی‌تواند بشود. اگر راه هوایی به



وسیله فشار خارجی بسته شود به این عارضه اختناق گویندو
این مورد ممکن است به طور تصادفی اتفاق بیفتد به عنوان
مثال اگر شال گردن و یا یقه لباس به جایی گیر کند و خلاصی
از آن ممکن نباشد. وارد آمدن فشار روی قسمت خارجی گردن

بوسیله دار آویختگی و یا فشرده شدن گلو، باعث بسته شدن مجرای تنفس و نرسیدن هوا
به شش‌ها می‌شود.

انسدادگرهای خارجی مانند بالش و یا کیسه پلاستیکی مانع از این می‌شوند که هوا
بتواند وارد ریه‌ها شود. همچنین این نوع خفگی ممکن است به علت تنفس طولانی در
یک فضای سربسته زمانی که تمام اکسیژن قابل مصرف تمام می‌شود مانند گیر کردن
کودک در یک محیط بسته (در کمد) اتفاق بیفتد.

تشخیص علائم اختناق راه‌های هوایی

- ۱- تنفس فرد سریع است و یا بدون تنفس می‌باشد.
- ۲- فرد بیهوش است و یا همین حالا هوشیاری خود را از دست داده است.
- ۳- ممکن است اثری از وجود انسداد مانند طناب و یا کراوات در اطراف گردن فرد باشد.
- ۴- علائم فشار بر گردن دیده می‌شود.
- ۵- پوست به رنگ آبی و یا خاکستری است.
- ۶- عروق خونی پوست متورم و لکه‌های نازک، قرمز و روشن بر روی پوست صورت و
در سفیدی چشم‌ها مشاهده می‌شود.

اگر عامل انسداد اطراف گردن باعث خفگی برای فرد شده باشد ممکن است دچار صدمات نخاع گردنی نیز شده باشد.

اصول اقدامات اولیه

۱- برای مصدوم هوای کافی تامین کنید.

۲- اصول کمکهای اولیه را ادامه دهید.


گام ۱: عامل انسداد را به سرعت ولی با حفظ ایمنی فرد برطرف نمایید.

گام ۲: CAB^۱ را کنترل نمایید (راه تنفسی را باز کنید، دفعات تنفس و ضربان قلب را کنترل کنید).

گام ۳: اگر فرد مصدوم نفس می‌کشد او را در وضعیت بهبود بخش قرار دهید و اگر نفس نمی‌کشید عملیات احیاء را آغاز نمایید.

گام ۴: کلیه کمکهای اولیه را ادامه داده و فرد را سریعاً به نزد پزشک ارجاع دهید حتی اگر حال عمومی‌وی به سرعت بهبود یابد.

توجه: هرگز مصدوم را به علت صدمات نخاعی تکان بیجا ندهید.



^۱- C A.B. = Circulation Airway , Breathing ,

غرق شدگی در آب (DROWNING)

معمولًا ناشی از فرو رفتن آب در ریه‌ها است که باعث خفگی می‌شود و موجب می‌گردد که عضلات گلو دچار گرفتگی شده و راه‌های هوایی بسته شود. مرگ ناشی از غرق شدگی به این دلیل است که یا مقدار کمی هوا می‌تواند وارد ریه‌ها شود و یا اینکه هوا نمی‌تواند وارد ریه‌ها شود و به این جهت گرفتگی گلو مانع از انجام تنفس می‌شود.

همیشه اجازه دهید که در فرد غرق شده آب بلعیده شده خود بخود خارج شود(اگر شما سعی نمایید که با فشار آن را خارج کنید ممکن است فرد مصدوم محتویات معده خود را آسپیره نماید).


فرد را از نظر هیپوترمی کنترل کرده و در صورت لزوم اقدامات لازم را شروع نماید.

توجه: حتی اگر فرد به سرعت ببهود یابد، باید برای توجهات بیشتر به نزد پزشک ارجاع فوری شود زیرا هر مقدار آب در درون ریه‌ها به آن‌ها صدمه وارد می‌کند و راه عبور هوا ممکن است ساعت‌ها بعد تنگ شود.

تشخیص فرد دچار غرق شدگی

- ۱ - بازوهای فرد در آب شل و آویزان است.
- ۲ - صورت به طرف پایین در آب غرق شده است.
- ۳ - وجود کف در داخل دهان، دور لبها و بینی
- ۴ - فرد مصدوم ممکن است بیهوش، دارای بدن سرد و بدون نیض و تنفس باشد.

اصول اقدامات اولیه



۱- راه هوایی و گردش خون را کنترل نمایید

۲- فرد را گرم نگاه دارید

۳- توجهات فوری را اعمال نمایید

گام ۱: فرد آسیب دیده را بدون اینکه خود را به خطر اندازید از خطر دور نمایید

گام ۲: سر فرد آسیب دیده را از بقیه قسمت‌های بدن او پایین‌تر نگاه دارید تا آب خود بخود خارج شده و خطر ورود بیشتر آب به ریه‌ها کم شود.

گام ۳: فرد آسیب دیده را به پشت بر روی یک پوشش مانند فرش و یا موکت بخوابانید و برای جلوگیری از هیپووترمی او را بپوشانید.



گام ۴: CAB را کنترل نمایید (راه‌های هوایی را باز کنید، دفعات تنفس و ضربان قلب را کنترل کنید).

گام ۵: اگر فرد نفس می‌کشد او را در وضعیت بهبود بخش قرار دهید و اگر تنفس ندارد عملیات احیاء را آغاز نمایید (توجه داشته باشید که باید احیاء را آهسته‌تر از حد معمول به علت اثرات آب و سرما در ریه‌ها انجام دهید)

گام ۶: سریعاً فرد را ارجاع دهید حتی اگر به نظر برسد که حال عمومی‌تری بهبود یافته است

توجه: هیچگاه سعی نکنید که آب بلعیده شده را به زور خارج نمایید.

خفگی بر اثر مسمومیت با گازها

مسمومیت با گاز منو اکسیدکربن

منو اکسیدکربن گازی است بی رنگ و بی بو و استنشاق آن خطرناک است. زیرا که منو اکسید کربن جایگزین اکسیژن موجود در خون می‌شود. از آنجا که این گاز راحت‌تر از اکسیژن جذب خون می‌شود بنابراین مصدوم به تنفس مصنوعی طولانی‌تری نیاز دارد تا منو اکسید کربن به طور کامل دفع شود. منابع معمولی تولید منو اکسید کربن عبارتند از دود ناشی از نیم سوز شدن (بد سوختن) سوخت‌های مصرفی مثل بنزین اتوموبیل، زغال، نفت (والور یا علاء الدین) و دود اگزوژ ماسین.

خطر از آنجا ناشی می‌شود که ماده سوختنی مثل بنزین یا ذغال و یا چراغ خوراک پزی بد بسوزد و دود ناشی از ماده سوختنی در یک محل سر بسته جمع شود.

عارض و نشانه‌ها

- ۱- ععارض و نشانه‌های عمومی خفگی.
- ۲- احتمالاً مصدوم در صورت هوشیاری از سر درد شکایت دارد.
- ۳- رنگ صورت ممکن است ابتدا عادی باشد اما همچنان که میزان منو اکسید کربن در خون بالا می‌رود رنگ صورت، صورتی می‌شود.
- ۴- مصدوم ممکن است گیج شده و نتواند برای نجات جان خود اقدامی انجام دهد.
- ۵- تنفس مشکل و یا قطع شده است.



اصول اقدامات اولیه



گام ۱: تنها زمانی برای نجات مصدوم وارد اتاق پر از گاز شوید که خودتان در معرض خطر نباشید و یا بتوانید به آسانی خارج شوید. مطمئن شوید که پشت سر شما کمک وجود دارد.

گام ۲: منبع تولید گاز را قطع کنید و مصدوم را از محل خارج کنید.

گام ۳: اگر مصدوم بیهوش شده ولی به طور عادی نفس می‌کشد وی را در وضعیت بهبود بخش قرار دهید.

گام ۴: میزان تنفس مصدوم، نبض و سطح هوشیاری را هر ۱۰ دقیقه یک بار کنترل کنید.

گام ۵: مصدوم را به بیمارستان ارجاع فوری بدهید.

توجه: به غیر از منو اکسید کربن، گازهای دیگری هم هستند که خطرناکند اگر چه ممکن است سمی نباشنداما به علت جایگزین شدن به جای اکسیژن در خون می‌توانند خطر ناک باشند مثل دی اکسید کربن که بر اثر احتراق ناقص سوخت‌ها بوجود می‌آید و معمولاً در فاضلاب‌ها و محیط‌های سر بسته پیدا می‌شود.

خفگی بر اثر برق گرفتگی

برق گرفتگی با ولتاژ کم:

اگر توانستید سریعاً فیوز برق را بیرون بکشید یا دگمه آن را فشار دهید تا برق قطع شود اگر دسترسی سریع به فیوز امکان‌پذیر نبود سعی کنید دو شاخه را از پریز بیرون بیاورید یا سیم روكش دار را بکشید تا از پریز خارج شود.

اگر نتوانستید حریان را به این ترتیب قطع نمایید. روی یک ماده عایق خشک مانند روزنامه یا یک تخته چوبی و یا لاستیک بایستید و بوسیله یک جاروی بلند چوبی منبع

برق را از مصدوم دور کنید. یا اینکه یک طناب به دور رانها و یا دست مصدوم بیندازید و او را به سمت خود بکشید تا از منبع برق دور شود.

توجه: از به کار بردن وسایل فلزی یا مرطوب یا از تماس با بدن لخت مصدوم خودداری کنید. اگر هیچ راهی وجود نداشت گوشه لباس مصدوم را که خشک است بگیرید و او را به طرف خود بکشید.

اصول اقدامات اولیه

گام ۱: قطع جریان برق و یا خارج کردن مصدوم از محل به شرطی که اینمی کافی برای این کار وجود داشته باشد.

گام ۲: CAB را کنترل کنید (راههای هوایی را باز کرده، تنفس و ضربان قلب را کنترل کنید)

گام ۳: اگر مصدوم بیهوش است اما به طور عادی نفس می کشد او را در وضعیت بهبود بخش قرار دهید


گام ۴: اگر تنفس و ضربان قلب قطع شده است بلا فاصله عملیات احیاء را شروع کنید.

گام ۵: در صورت وجود سوختگی بر حسب شدت آن درمانهای معمول را انجام دهید.

گام ۶: کلیه قربانیان بایستی ارجاع فوری شده و در مراکز و بیمارستان‌های مجهرز بستری شوند.

توجه: در حوادث ناشی از برق گرفتگی اولین اقدام، قطع جریان برق می باشد.

برق‌گرفتگی با ولتاژ بالا:



اگر احتمالاً مصدوم همچنان در تماس با برق مانده بودو یا اینکه کمتر از ۱۸ متر از خطوط فشار قوی فاصله داشت هرگز کوشش نکنید که او را نجات دهید. حتی به او نزدیک نشوید تا اینکه برق بوسیله مسئولین قطع شود. زیرا که جریان برق فشار قوی حالت قوسی داشته و می‌تواند تا مسافت دوری را

بپوشاند. مواد عایق مانند چوب و یا لباس خشک به هیچ وجه حفاظتی ایجاد نخواهد کرد. زمانی کمک‌های اولیه را شروع کنید که از طریق مراجع رسمی به شما اطلاع داده شود که برق قطع شده است.

تمرین نظری

- ۱- مسمومیت با گاز منواکسید کربن منجر به بروز چه عوارضی می‌شود؟
- ۲- اقدامات لازم برای رفع خفگی ناشی از ورود جسم خارجی در راههای هوایی را فهرست نمایید.
- ۳- عوارض ناشی از برق‌گرفتگی را فهرست نمایید..

تمرین عملی

- ۱- اقدامات لازم را مرحله به مرحله برای خروج جسم خارجی از ریه‌ها در شیر خواران کوچک انجام دهید.
- ۲- اقدامات لازم جهت مصدوم برق گرفته را مرحله به مرحله انجام دهید.

بخش دهم

شکستگی‌ها، دررفتگی‌ها، آسیب‌های عضلانی مفصلی

اهداف آموزشی

انتظار است پس از یادگیری محتوای این مبحث فراغیر بتواند:

- ۱- علایم عمومی شکستگی را فهرست کند.
- ۲- انواع شکستگی را بر حسب آسیب به استخوان و عضلات طبقه بنده نماید.
- ۳- علایم در رفتگی‌ها را بیان کند.
- ۴- علایم پیچ خورده‌گی‌ها را بیان کند.
- ۵- عوارض ناشی از شکستگی‌ها را توضیح دهد.
- ۶- کمک‌های اولیه عمومی در انواع شکستگی‌ها را شرح دهد.
- ۷- مراحل انجام کمک‌های اولیه در دررفتگی‌ها را شرح دهد.
- ۸- مراحل انجام کمک‌های اولیه در پیچ خورده‌گی‌ها را شرح دهد.

شکستگی

در مبحث شناخت بدن بادستگاه اسکلتی، عضلانی، انواع استخوان‌ها و انواع مفصل‌ها آشنا شده اید لذا یادآوری آن در اینجا ضروری به نظر نمی‌رسد. لازم به ذکر است که موارد فوق پیش نیاز آموخته‌های این فصل می‌باشد.


تعريف شکستگی

از بین رفتن پیوستگی و تداوم بافت استخوانی و تغییر شکل آن را شکستگی گویند.

انواع شکستگی

۱- شکستگی باز

شکستگی باز



در این نوع شکستگی پوست بدن در قسمت شکسته آسیب دیده یا پاره می‌شود و زخم باز بدن بال این آسیب یا در اثر بیرون زدن استخوان از پوست ایجاد شده یا زخم ناشی از ضربه مستقیم شئی برنده‌ای بوده که در زمان شکستگی به پوست وارد می‌شود.

شکستگی‌های باز به علت از دادن خون بدلیل آسیب به شریان‌هایی که در مجاورت استخوان قرار دارند و احتمال عفونت وجود دارد، جدی‌تر و مهم‌تر هستند.

شکستگی بسته

در این نوع شکستگی تداوم بافت استخوان از بین رفته ولی به بافت‌های مجاور استخوان آسیب نرسیده است.

در مبحث شکستگی‌ها ممکن است به اصطلاحاتی نظیر شکستگی ساده یا مرکب برخورد کنیم این تقسیم‌بندی از جهت آسیب‌های وارده به اعضاء بیان می‌شود. بدین

معنی که در شکستگی ساده فقط آسیب به بافت استخوانی وارد شده، اما در شکستگی مركب علاوه برآسیب وارد به بافت استخوانی بافت‌های مجاور آن مانند عروق، عضلات و... نیز آسیب دیده‌اند.

پس نتیجه می‌گیریم که شکستگی باز الزاماً مركب است و شکستگی بسته ممکن است مركب یا ساده باشد.

دررفتگی‌ها

دررفتگی به حالتی گفته می‌شود که سراستخوان از مفصل آن خارج می‌شود. و هنگامی روی می‌دهد که یک مفصل بیش از حد طبیعی حرکت خود، به حرکت واداشته شود.

علایم و نشانه‌های شکستگی و دررفتگی

- ۱- محدودیت حرکت اندام
 - ۲- تغییر حالت و تغییر شکل عضو
 - ۳- تورم عضو
 - ۴- تغییررنگ یا تغییر دمای عضو
- درشکستگی باز زخم و خونریزی وجود دارد.
- درشکستگی استخوان‌های ران، لگن و قفسه سینه باید به علائم شوک نیز توجه داشته باشیم.

درد شایع‌ترین علامت دررفتگی و شکستگی‌ها است. درد معمولاً محدود به محل آسیب است که با لمس یا فشار شدید می‌شود، لازم به ذکر است الزاماً تمامی علائم و نشانه‌های گفته شده ممکن است در یک مصدوم دچار آسیب‌های اسکلتی دیده نشود. بنابراین مشاهده یک یا دو علامت نیز باید ما را به وجود شکستگی یا دررفتگی هدایت کند.

عوارض مخاطره آمیز دررفتگی‌ها و شکستگی‌ها

۱- عوارض تهدیدکننده حیات مصدوم

آسیب اسکلتی ممکن است سبب پاره شدن یک رگ بزرگ، خونریزی شدید و در نهایت شوک و مرگ شود. یا شکستگی دندنه‌ها سبب پارگی قلب یا ریه‌ها شود. همچنین شکستگی لگن سبب خونریزی شدید داخلی، شوک و مرگ گردد.

۲- عوارض تهدیدکننده حیات عضو

شکستگی استخوان ممکن است سبب آسیب به اعصاب و عروق و نرسیدن خون به عضو و در نتیجه قطع آن شود. از بین رفتن نبض اندام در قسمت پایین‌تر از محل شکستگی، رنگ پریدگی، بی‌حسی از نشانه‌های آسیب به عروق و اعصاب می‌باشد.

توجه:

اساس کمک‌های اولیه درآسیب‌های استخوانی، مفصلی، عضلانی بر پایه ثابت نمودن و بی‌حرکت کردن عضو و انتقال مصدوم به مرکز درمانی می‌باشد.


در هر مصدومی بررسی علائم حیاتی شامل تنفس، نبض، فشار خون الزامی است و هرگونه افت در فشارخون باید نشانه‌ای از شوک تلقی شود.

هرگز عضو آسیب دیده را حرکت ندهید بلکه سعی کنید در همان حالت به وسیله آتل آن را بی‌حرکت کنید.

اصول انجام کمک‌های اولیه در شکستگی‌ها و دررفتگی‌ها

- ۱- بررسی حال عمومی و علائم حیاتی، که در صورت طبیعی نبودن علائم حیاتی اقدامات احیاء را انجام دهید.
- ۲- در صورت وجود زخم یا خونریزی در محل ضایعه، کنترل خونریزی و پانسمان زخم انجام شود.
- ۳- اگر مصدوم هوشیار است در مورد نحوه آسیب دیدگی ازوی سوال کنید. پاسخ مصدوم کمک می‌کند تا محل و نوع و شدت آسیب را حدس بزنید.
- ۴- عضو آسیب دیده را به وسیله آتل مناسبی که در اختیار دارد ب حرکت کنید.
- ۵- جهت بررسی سلامت عروق و اعصاب، نبض، حس و حرکت عضو را بررسی کنید.
- ۶- مسکن‌ها به کاهش درد همراه با صدمه دیدگی اعضا کمک می‌کند. در صورت بیهوش نبودن بیمار، به بیمار مسکن بدھید.
- ۷- مصدوم را سریعاً به مرکز درمانی انتقال دهید.

شکستگی ستون فقرات




شکستگی ستون فقرات و مهره‌ها همیشه یک خطر جدی برای مصدومین است و برای هر فرد کمک دهنده آموزش روش برخورد با آن و رعایت جوانب احتیاط لازم و ضروری است زیرا خطر آسیب به نخاع بسیار زیاد است. آسیب‌پذیرترین ناحیه ستون فقرات معمولاً مهره‌های گردنی و مهره‌های کمری هستند.

در موارد زیر همیشه به آسیب ستون فقرات فکر کنید.

سقوط از بلندی، افتادن از اسب یا موتورسکلت، افتادن یک جسم سنگین روی کمر، زیرآوار ماندن، تصادفات رانندگی و ...

علائم:



- ۱- درد شدید روی مهره آسیب دیده به هنگام لمس
- ۲- هنگام لمس ممکن است جابجایی مهره‌ها مشهود باشد.
- ۳- علائم بی‌حرکتی در اندام‌های بیمار
- ۴- بی‌اختیاری ادرار و مدفوع یا ناتوانی در دفع آن

کمک‌های اولیه در آسیب‌های ستون فقرات

- مصدوم را دروضعیت ثابت نگه دارید و از هرگونه جابجایی آن به شدت بپرهیزید.
- سطح هوشیاری و CAB مصدوم را بررسی کنید.
- تنفس این مصدوم ممکن است شکمی باشد. (به بالا و پائین رفتن شکم به هر تنفس توجه کنید).
- علائم حیاتی مصدوم را مرتبأً چک کنید.
- کمک‌های اولیه را برای سایر عوارض و صدمات جدی مصدوم انجام دهید.
- با پزشک مرکز بهداشتی درمانی تماس حاصل نمایید و موارد را به پزشک اعلام دارید
- تا به کمک شما برای مراقبت از مصدوم آسیب دیده ستون فقرات بیاید.
- به مصدوم اطمینان و آرامش خاطر دهید.
- جزء برای احیای قلبی-ریوی یا دور کردن مصدوم از محل نالمن و خطرناک اقدام به جابجایی مصدوم نکنید. (با کمک آتل بلند ستون مهره‌های مصدوم را ثابت کنید).
- سروگردن مصدوم را نپیچانید و اجزا حرکت به جلو را در قسمت سروگردن ندهید.
- غذا و مایعات به مصدوم ندهید.

- اگر مجبورید که مصدوم را حرکت دهید یا منتقل کنید. حداقل از ۳-۴ نفر برای بلند کردن مصدوم کمک بگیرید و با گردن بند طبی (یا گردن بندی که با حوله یا لباس تا شده تهیه می کنید) صدمات گردنی را حمایت کنید.

- بیمار را به پزشک ارجاع فوری دهید.



شکستگی دنده ها و قفسه سینه


وجود شکستگی های متعدد در دیواره قفسه سینه باعث می شود که قفسه سینه حالت سفتی و استحکام خود را از دست دهد و در نتیجه حرکت عادی آن دچار اختلال گردد. ناحیه شکسته در هنگام دم به درون کشیده می شود و در هنگام بازدم به سمت بالا رانده می شود و این بر خلاف حرکت طبیعی قفسه سینه است و در تضاد با حرکت عادی شش سالم طرف دیگر قرار می گیرد. این حالت که به آن تنفس متضاد و یا غیر عادی می گویند باعث می شود که تنفس مصدوم مختل شود. به علاوه دنده های شکسته ممکن است به سایر اندام های داخلی صدمه بزنند. معمولاً این حالت بر اثر تصادف در جاده ها ایجاد می شود. به این ترتیب که بر اثر شدت تصادف قفسه سینه راننده به شدت به فرمان ماشین بر خورد می کند و یا بر عکس فرمان در اثر ضربه جلو می آید و به قفسه سینه راننده برخورد می کند که در هر حال باعث ایجاد جراحت و شکستگی در قفسه سینه می شود. این حالت ممکن است بر اثر افتادن شیء سنگین نیز بر روی قفسه سینه ایجاد شود.

علائم و نشانه‌ها :

- ۱- درد شدید در محل شکستگی در هنگام لمس.
- ۲- درد در هنگام نفس کشیدن.
- ۳- احتمال وجود یک زخم نافذ از بیرون قفسه سینه.

عوارض :

- ۱- عوارض و نشانه‌های عمومی خفگی.
- ۲- نفس کشیدن برای مصدوم مشکل و دردناک است.
- ۳- حرکت غیر عادی قفسه سینه مشاهده می‌شود که استحکام و سختی خود را از دست داده است.
- ۴- احتمالاً مصدوم خون کف آلود بالا می‌آورد که نشانه صدمه دیدن ریه‌ها است.



اصول اقدامات اولیه

- گام ۱: قسمت صدمه دیده قفسه سینه مصدوم را با دست نگاه دارید
- گام ۲: به مصدوم کمک کنید که در وضعیت نیمه خوابیده به طرف قسمت مجروح متمایل شود. نشانه‌ها و سر او را با دست نگاه دارید



- گام ۳: هر گونه زخم را پانسمان کنید
- گام ۴: مصدوم را حرکت ندهید. یک تکه بالشتک ضخیم و نرم روی زخم و ناحیه آسیب دیده بگذارید. بازوی مصدوم را روی بالشتک قرار دهید و روی بازو را باند پیچی کنید. به این صورت که با استفاده از یک باند پهن بازو را به بدن محکم بچسبانید و باند را در قسمت جلو در طرف سالم گره بزنید.

گام ۵: اگر پوشش تنگی به دور گردن و یا کمر وجود دارد آن را شل کنید.

گام ۶: مصدوم را معاینه کنید که آیا جراحت دیگری برداشته است یا نه.

گام ۷: اگر مصدوم بیهوش شد فوراً او را در وضعیت بهبود بخش قرار دهید.

گام ۸: مصدوم را بدون معطلي با برانکارد به طوری که وضعیت درمانیش حفظ شود به بیمارستان ارجاع فوری بدهید.

شکستگی ترقوه

علائم و نشانه ها:



۱- درد در محل شکستگی. ۲- پایین تر قرار گرفتن شانه سمت ترقوه آسیب دیده. معمولاً به علت دردی که وجود دارد بیمار سر خود را به طرف ترقوه شکسته خم می‌کند.

اقدامات اولیه:



۱- بیمار را بنشانید و دست سمت شکستگی رابرروی سینه قراردهید و از او بخواهید که با دست دیگر زیر آرنج دست سمت شکستگی را نگه دارد.

۲- یک حوله یا ملحفه یا مقداری پنبه را در بین دست مصدوم و بدنش قراردهید.

۳- سپس بایک باند (باندسه گوش بهتراست) دست را به قفسه سینه بانداز کنید.

۴- مصدوم را به مرکز درمانی انتقال دهید.

بخش دهم؛ شکستگی‌ها، دررفتگی‌ها، آسیب‌های عضلانی مفصلی / ۱۹۳



دررفتگی شانه

علائم و نشانه ها:

- ۱- تغییر شکل واضح در محل شانه در رفته
- ۲- درد شدید که در هنگام حرکت بیشتر می‌شود.
- ۳- ورم و کبودی ممکن است وجود داشته باشد.



اقدامات اولیه:

تصدوم را به آرامی بنشانید و به آرامی دست و بازوی سمت دررفته را در هر زاویه‌ای که تصدوم احساس راحتی بیشتری و درد کمتری می‌نماید قرار دهید و به قفسه سینه بچسبانید. گودی بین دست و بدن بیمار را با استفاده از ملافه، پنبه یا پارچه و ... پر نمایید.

دست را به وسیله باند مثلثی به قفسه سینه ثابت نمایید. بیمار را به مرکز درمانی انتقال دهید.

شکستگی بازو

علائم و نشانه ها :

- ۱- درد با حرکت بیشتر می‌شود.
- ۲- درد شدید و حساسیت روی ناحیه آسیب دیده هنگام لمس.
- ۳- تورم و کبودی که ممکن است به آهستگی بوجود آید.

اقدامات اولیه:


۱- مصدوم را به آرامی روی زمین بخوابانید یا بنشانید، دست آسیب دیده را مقابل قفسه سینه در هرزماویه‌ای که مصدوم راحت‌تر است قرار دهید.

۲- دست را به وسیله باند و بال گردن نمایید.

۳- فضای خالی بین دست و بدن بیمار را به وسیله ملافه، پارچه، پنبه و یا ... پر نمایید.

۴- بایک باندسه گوش دیگر دست را به قفسه سینه بچسبانید.

۵- مصدوم را به مرکز درمانی منتقل نمایید.



شکستگی‌های اطراف آرنج :

علائم



- ۱- دردشده‌ید که با حرکت زیاد می‌شود.
- ۲- حساسیت زیاد بر روی محل شکستگی.
- ۳- تورم و کبوdí در محل شکستگی.

اقدامات اولیه

هرگز سعی نکنید دست و آرنج آسیب دیده را حرکت دهید.

- ۱- بیمار را بر روی زمین بخوابانید و یک حوله یا بالش نرم اطراف آرنج او قرار دهید.
- ۲- نبض مج دست را کنترل کنید.



- ۳- اگر فاصله تا مرکز درمانی زیاد است یا امکان حضور نیروهای درمانی بر بالین بیمار نمی‌باشد. فضای بین دست و بدن بیمار را با حوله یا ... پر نمایید و دست را در امتداد بدن به قفسه سینه ثابت نمایید.

- ۴- مصدوم را به مرکز درمانی انتقال دهید.

آسیب‌های ساعد و مج دست

علائم و نشانه‌ها:

- ۱- تغییر شکل.
- ۲- درد که با حرکت بیشتر می‌شود.

۳- حساسیت دردناک روی محل شکستگی.

۴- تورم و کبودی.

اقدامات اولیه

۱- بیمار را بنشانید و به آرامی ساعد را مقابل سینه قرار دهید. (اگر زخم یا خونریزی وجود دارد درمان نمایید)

۲- با استفاده از یک باند مثلثی دست را از ساعد به گردن بیمار آویزان می‌کنیم.

۳- بیمار را به مرکز درمانی انتقال دهید.

شکستگی‌های اندام تحتانی

اهمیت رسیدگی به شکستگی‌هایی که در اندام تحتانی اتفاق می‌افتد معمولاً به دلیل خونریزهای شدیدی که ایجاد می‌کنند و برای بیمار خطر شوک را بهمراه دارد.

شکستگی ران و ساق :

علائم

۱- درد در محل آسیب

۲- ناتوانی در راه رفتن


۳- کوتاه شدن عضو شکسته نسب به سمت سالم

۴- معمولاً پای شکسته به سمت خارج بدن می‌چرخد.

اقدامات اولیه

علائم حیاتی را بررسی نمایید و در صورت بروز شوک یا ایست قلبی تنفسی اقدام لازم را انجام دهید.

بخش دهم؛ شکستگی‌ها، درفتگی‌ها، آسیب‌های عضلانی مفصلی ۱۹۷ /



در صورت وجود زخم یا خونریزی در محل شکسته اقدام مناسب را انجام دهید. پای آسیب دیده را به وسیله آتل ثابت نمایید. در صورت عدم دسترسی به آتل مناسب می‌توان از پای سالم به عنوان آتل برای پای آسیب دیده استفاده نمود.

شکستگی کاسه زانو:


این استخوان کوچک که در جلوی مفصل زانو قرار گرفته، تکیه گاهی است برای ماهیچه‌های ران و استخوان ساق پا، کاسه زانو ممکن است بر اثر ضربه مستقیم و یا بر اثر حرکات شدید ماهیچه‌ای مانند اشتباه شوت کردن بشکند.

عوارض و نشانه‌ها


- ۱- درد شدید در زانو بخصوص جلوی زانو
- ۲- حساسیت در اطراف کاسه زانو
- ۳- عدم تحرک مفصل زانو، بیمار قادر به خم کردن زانو نیست
- ۴- ورم قابل توجه و پس از آن کبودی ممکن است ظاهر شود

اقدامات اولیه

۱- مصدوم را به پشت بخوابانید به طوری که با گذاشتن یک کت یا پتوی تا شده سر و شانه هایش کمی بالا بیايد.



-با ملایمت پای شکسته را بگیرید، کمی بالا بیاورید و زیر پا یک تخته شکسته بندی که از زیر باسن تا پاشنه پا ادامه يابد، قرار دهید. بین پا و تخته به اندازه کافی بالشتک بگذارید. زیر زانو درست به اندازه های که حفره را پر کند بالشتک اضافی بگذارید. یک بالشتک اضافی دیگر نیز زیر پاشنه پا قرار دهید تا از تخته فاصله بگیرد.



۳- به شکل آلاتین دور قوزک، کف پا و تخته، باند بپیچید و کنار تخته گرمه بزنید. یک نوار پهن دور ران و یکی هم دور ساق و تخته ببندید و در طرف بیرونی پای شکسته گره بزنید.

۴- مصدوم را با برانکارد حمل کرده و ارجاع فوری دهید.

بخش دهم؛ شکستگی‌ها، درفتگی‌ها، آسیب‌های عضلانی مفصلی ۱۹۹ /

شکستگی پا :



این عارضه غالبا در اثر نیروی مستقیم وارد بر آن مانند افتادن یک شیء سنگین و ضربه رخ می‌دهد. این نوع شکستگی ممکن است بر اثر پیچ خوردن و یا افتادن و پریدن پیش بیاید.

عارض و نشانه‌ها

- ۱- احساس درد در پا که بر اثر حرکت بیشتر می‌شود.
- ۲- حساسیت در اطراف محل شکستگی
- ۳- مصدوم نمی‌تواند به راحتی روی پاهایش راه برود
- ۴- ورم، کبودی، از شکل افتادگی در محل شکستگی

اقدامات اولیه

- ۱- مصدوم را بخوابانید
- ۲- پای شکسته را بگیرید و بلند کنید.
- ۳- به آرامی کفش و جوراب را از پا خارج کنید.
- ۴- جلوی خونریزی احتمالی را گرفته و اگر زخمی دارد آن را پاسمنان نمایید.
- ۵- یک تخته شکسته بندی همراه با پد نرم و یا بالشتک در کف پا قرار دهید.
- ۶- تخته را بوسیله باند پیچی به شکل ۸ لاتین به پا وصل کنید. مرکز باند پهن باید روی تخته در محل کف پا قرار گیردو سپس آن را از روی برجستگی روی پا رد کنید.
- ۷- دو انتهای باند را پشت قوزک بپیچید و یک بار دیگر آن را از ساق پا رد کنید.
- ۸- دو انتهای را زیر تخته و در کف پا گره بزنید- پا را ثابت و بی حرکت نگاه دارید.
- ۹- مصدوم را ارجاع دهید.



شکستگی لگن خاصه

در اثر ضربه مستقيم به پاها يا فشار به لگن ايجاد مى شود که يکى از مهمترین عوارض آن خونریزی داخلی و آسيب به احشاء داخلی بدن است و مصدوم حتى ممکن است تا ۴ لیتر خون از دست بدهد و همین امر باعث شوک و مرگ مى شود.

علائم شکستگی لگن :

- ۱- درد شديد هنگام حرکت دادن پاها.
- ۲- مصدوم در حالت خوابیده به پشت قادر به نشستن يا بلند کردن پاهایش نیست.
- ۳- معمولاً پای سمت آسيب دیده به سمت بیرون چرخیده است.
- ۴- عالیم و نشانه های شوک ممکن است وجود داشته باشد.
- ۵- اگر مثانه يا مجرای ادراری آسيب دیده باشد بیمار میل شدیدی به ادرار کردن دارد که ادرار وی خونی خواهد بود.

کمک‌های اولیه:

- ۱- مصدوم را به پشت بخوابانید بطوری که پاهایش کشیده باشد. پاهایش را اندکی خم کرده و زیر زانوهایش پتو یا ملحفه‌ای قرار دهید.
- ۲- جهت جلوگیری از بروز شوک می‌توان به مصدوم مایعات وریدی داد.
- ۳- اگر تا رسیدن به مرکز درمانی فاصله زیادی است (بیش از ۳۰ دقیقه) حداقل سه باند پهن دور لگن خاصره ببندید.(بهتر است از باند سه گوش استفاده شود)
- ۴- یک بالش نرم یا ملحفه یا پنبه بین زانوها و قوزک‌ها قرا ردهید.
- ۵- هر دو تا قوزک پاها و زانوها را به یکدیگر ببندید.



شکستگی جمجمه

جمجمه یک محافظ مطمئن برای مغز است، اگر چه صدمه به استخوان جمجمه ممکن است که قابل توجه نباشد، اما فرو رفتن جمجمه یا ترشح خون از محل شکستگی به داخل مغز باعث وارد شدن فشار بر روی مغز می‌شود. که ممکن است باعث صدمه و اختلال در کار مغز شود که در این حالت هوشیاری ممکن است مختل شود و یا بیهوشی دست دهد.

بنابراین تمام جراحت‌های سر می‌بایست که جدی گرفته شوند، حتی اگر هیچ اثر ظاهری از زخم در آن دیده نشود.

شکستگی فرق سر معمولاً در اثر ضربه مستقیم به جمجمه و با سر به زمین خوردن اتفاق می‌افتد. در این حالت ممکن است در استخوان‌ها فرو رفتگی ایجاد شود، شکستگی قاعده جمجمه معمولاً در اثر نیروی غیر مستقیم مانند افتادن روی پاها به زمین و یا ضربه به چانه ایجاد شود.

عوارض و نشانه‌ها:



- ۱- نشانه‌های واضح جراحت سر.
- ۲- خون و یا مایع آب مانند شفاف مغزی نخاعی ممکن است از گوش و یا بینی جاری شود.
- ۳- خون گرفتگی چشم‌ها و بعد سیاه شدن اطراف چشم.
- ۴- مردمک‌های چشم به اندازه‌های متفاوت گشاد می‌شوند.
- ۵- بیهوشی نسبی و یا کوتاه مدت.



اقدامات اولیه

- ۱- اگر مصدوم به هوش باشد او را در یک وضعیت نیمه خوابیده قرار دهید. سر و شانه‌هایش را تکیه دهید.
- ۲- در صورت مشاهده ترشح از گوش، سر را به سمت قسمت مجروح خم کنید.
- ۳- روی گوش را با پوشش استریل پوشانده و آن را شل باند پیچی کنید. چیزی را داخل گوش فرو نکنید.
- ۴- اگر مصدوم بیهوش بود ولی تنفس عادی داشت او را

بخش دهم: شکستگی‌ها، درفتگی‌ها، آسیب‌های عضلانی مفصلی ۲۰۳ /

در وضعیت بهبود قرار دهید به طوری که سر به طرف قسمت صدمه دیده در روی زمین قرار بگیرد.

۵- میزان هوشیاری، تنفس و نبض مصدوم را هر یک دقیقه یک بار کنترل کنید.


۶- اگر مصدوم دچار وقفه قلبی، تنفسی شد احیای قلبی، تنفسی را شروع کنید.

۷- مصدوم را سریعاً ارجاع دهید.



گرفتگی ماهیچه

گرفتگی ماهیچه عبارت است از انقباض ناگهانی، غیر ارادی و دردناک ماهیچه و یا یک گروه از ماهیچه‌ها، این حالت بر اثر ناهماهنگی ماهیچه به علت ورزش، یا سرد شدن



ماهیچه‌ها هنگام و یا پس از ورزش‌هایی مانند شنا و یا به دلیل از دست رفتن مایعات بدن از طریق تعریق شدید، اسهال و یا استفراغ رخ می‌دهد.

این حالت معمولاً با کشیدن ماهیچه بر طرف و یا بهتر می‌شود. ابتدا ماهیچه را بکشید و سپس آن را با ملایمت ماساژ دهید.

گرفتگی ماهیچه دست:

با ملایمت اما قاطعانه انگشت‌ها را راست کنید و به آرامی محل گرفتگی را ماساژ دهید.

گرفتگی ماهیچه ران :

زانو را راست کرده و ساق پا را از پاشنه بالا بیاورید و با دست دیگر زانو را به طرف پایین فشار دهید. سپس با ملایمیت ماهیچه گرفته شده را ماساژ دهید.

کوفتگی

به علت وارد آمدن ضربه به عضله یا بافت ایجاد شده و به صورت یک زخم بسته دیده می‌شود.

پیچ خوردگی

پیچ خوردگی عبارت است از چرخش یا کشش بیش از حدمعمول یک عضو در سطح مفصلی که باعث آسیب به رباط (تاندون) و کپسول مفصلی و عضلات مجاور مفصل می‌شود. پیچ خوردگی اغلب در قوزک پا و زانو روی میدهد. درمان و برخورد نامناسب با این آسیب می‌تواند اختلال در کارعضو را برای همیشه بدنیال داشته باشد.

علائم:

- ۱- درد شدید
- ۲- حساسیت به فشار در مفصل آسیب دیده
- ۳- محدودیت حرکت مفصل
- ۴- تورم و خون مردگی در سطح مفصل

کمک‌های اولیه :

کمک‌های اولیه در مورد پیچ خوردگی را می‌توان با علائم اختصاری R.I.C.E. به خاطر سپرد.

R مخفف Rest استراحت دادن عضو، عضو آسیب دیده را در وضعیتی که بیمار راحت باشد قرار داده و از حرکت عضو جلوگیری کنید.


بخش دهم؛ شکستگی‌ها، درفتگی‌ها، آسیب‌های عضلانی مفصلی / ۲۰۵

I مخفف Ice به معنی یخ به منظور استفاده از کمپرس سرد در محل آسیب دیده. استفاده از سرما سبب انقباض عروق خونی و کاهش خونریزی، تورم و درد می‌شود. که این عمل بهتر است فقط ۲۴ ساعت اول حداقل به مدت ۳ الی ۴ نوبت و هر نوبت به مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه ادامه یابد. در ۲۴ ساعت دوم استفاده از کمپرس گرم مناسب است. **C** مخفف Compression به معنی فشردن عضو، قسمت آسیب دیده را با استفاده از باندکشی تحت فشار قرار دهید.

E مخفف Elevation به معنی بالانگه داشتن عضو آسیب دیده برای کاهش بیشترورم و خونریزی از مصدوم بخواهید تا عضوآسیب دیده را برای مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت اول پس از آسیب بالاتر از سطح بدن نگه دارد.

لازم به ذکر است که در هر کدام از آسیب‌های استخوانی، مفصلی، عضلانی در صورت مشکوک بودن، جهت انجام اقدامات اولیه بنا را بر شکستگی گذاشته و اقدامات لازم جهت شکستگی‌ها را انجام دهید.

نمودار روش برخورد با آسیب‌های استخوانی، مفصلی و عضلانی



اثرات درمانی موضعی گرم‌ما:

- ۱- عضلات را شل می‌کند.
- ۲- درد را کاهش می‌دهد
- ۳- گردش خون را افزایش می‌دهد
- ۴- درد مفاصل را کاهش می‌دهد
- ۵- التیام زخم را تسريع کرده و احتقان بافتی را از بین می‌برد

استفاده از کیف آب گرم

وسایل لازم: ۱- کیف آب گرم ۲- روکش کیسه ۳- پارچ محتوی آب گرم با دمای ۴۶ تا ۵۲ درجه برای بزرگسالان و ۴۰ تا ۴۳ درجه برای کودکان ۴- پارچه تمیز

روشن کار	توجیه روش
هدف از انجام کار را برای بیمار توضیح دهید.	این عمل موجب جلب همکاری بیمار می‌شود.
وضعیت پوست محلی که می‌خواهید گرما را برای آن استفاده کنید بررسی کنید.	زیرا اختلال در گردش خون محل ممکن است حساسیت به گرما را بیشتر کند.
دست‌ها را بشویید.	شستن دست‌ها از انتقال میکروب جلوگیری می‌کند.
وسایل را آماده کرده و کیف و در آن را از نظر سالم بودن و نداشتن نشت آب کنترل کنید.	نشست آب موجب سوختگی و ایجاد ناراحتی می‌گردد.
دمای آب را با دماسچ و یا قسمت داخلی مج دست کنترل کنید.	با این عمل از سوختن احتمالی بیمار جلوگیری می‌شود.
یک سوم کیف را از آب پر کنید.	بیش از حد پرشدن کیسه باعث فشار به عضو می‌گردد.
کیف را بر روی سطح صاف قرار داده تا هوای آن خارج شود.	وجود هوا باعث فشار به سر کیف و باز شدن آن می‌شود.
کیف را با پارچه‌ای خشک کرده و روی آن روکش بشکشد و بر روی محل مورد نظر قرار دهید.	روکش بر روی کیف از تحریک عضو جلوگیری می‌کند.
بعدازمدت ۳۰ تا ۴۰ دقیقه کیسه را از محل بردارید.	با این کار از عوارض استفاده طولانی مدت گرما جلوگیری می‌شود.
وسایل را جمع کرده و آن‌ها را برای استفاده مجدد آماده نمایید(کیف را پس از خالی کردن به طور وارونه آویزان نمایید تا خشک شود)	این عمل موجب سازمان دهی در کارها می‌شود.
دست‌ها را شسته و اقدامات انجام یافته را در دفتر ثبت نمایید.	این کار موجب حفظ سابقه و تداوم مراقبتها می‌گردد.


استفاده از کیف آب سرد

وسایل لازم: کیف مخصوص، ظرف محتوی آب و یخ، پارچه، روکش کیف

توجیه روشن	روش کار
کوچک بودن تکه ها موجب می شود تا کیسه بهتر روی محل قرار گیرد.	کیف یخ را روی سطح صافی قرار داده و تا نصف آن را از تکه های یخ پر کنید.
	
با این کار کیف قابل انعطاف شده و تمام قسمت های آن روی محل قرار می گیرد.	با دست روی کیف فشار آورید تا هوای آن خارج شود سپس درب کیف را ببندید.
	کیف یخ را وارونه کرده و آن را از نظر نشت آب کنترل کنید.
با این کار از تماس مستقیم پوست با لاستیک جلوگیری می شود.	سطح بیرونی کیف را با پارچه خشک کرده و پس از قرار دادن آن در روکش، آن را روی محل قرار دهید.
با این عمل از عوارض احتمالی جلو گیری می شود.	هر ۱۰ دقیقه یک بار پوست محل را از نظر تعییر رنگ و واکنش بیمار و آب شدن یخها بررسی نمایید.
با این کار از عوارض طولانی مدت سرما جلو گیری می شود.	بعد از مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه کیف را از محل بردارید.
این عمل موجب سازمان دهی در کارها می شود.	وسایل را جمع کرده و آن ها را برای استفاده مجدد آماده نمایید (کیف را پس از خالی کردن به طور وارونه آویزان نمایید تا خشک شود)
این کار موجب حفظ سابقه و تداوم مراقبتها می گردد.	دستها را شسته و اقدامات انجام یافته را در دفتر ثبت نمایید.


توجه: پس از خشک شدن کیسه به منظور جلوگیری از چسبیدن دو جدار کیف، بهم باید مقداری هوا داخل آن وارد کرد و سپس درب آن را بست.

بخش دهم؛ شکستگی‌ها، دررفتگی‌ها، آسیب‌های عضلانی مفصلی ۲۰۹ /



کمپرس سرد

پنبه، حolle یا چیزی شبیه آن را در آب سرد و یا یخ-آب وارد کنید و بیرون از ظرف آنقدر آن را بفشارید که دیگر چکه نکند. فقط مرطوب باشد و سپس آن را روی جراحت قرار دهید.



کمپرس گرم

پنبه، حolle یا چیزی شبیه آن را در آب گرم وارد کنید و بیرون از ظرف آنقدر آن را بفشارید که دیگر چکه نکند. فقط مرطوب باشد و سپس آن را روی جراحت قرار دهید.

تمرین نظری

- ۱- عوارض مخاطره آمیز ناشی از شکستگی‌ها را توضیح دهید.
- ۲- اصول انجام کمکهای اولیه در شکستگی‌ها و دررفتگی‌ها را بنویسید.
- ۳- علائم عمومی ناشی از شکستگی جمجمه را فهرست نمایید.
- ۴- چه اقدامی برای کاهش درد و ورم عضو مجروح و شکسته شده می‌توان انجام داد.
- ۵- تفاوت شکستگی باز با شکستگی مرکب در چیست.

تمرین عملی

- کمکهای اولیه در بروز شکستگی دندنه‌ها و ستون فقرات را انجام دهید.
- کمکهای اولیه در بروز شکستگی کاسه زانو را انجام دهید.
- محل شکستگی باز را که خونریزی دهنده نیز می‌باشد، پانسمان نمایید.

بخش یازدهم

سوختگی‌ها

اهداف آموزشی

- انتظار است پس از یادگیری محتوای این مبحث فراغیر بتواند:
- ۱- وسعت سوختگی را براساس قانون ۹ توضیح دهد.
 - ۲- سوختگی‌ها را برحسب درجه و شدت آن توضیح دهد.
 - ۳- انواع سوختگی را برحسب عامل ایجاد کننده فهرست کند.
 - ۴- علایم سوختگی‌ها را فهرست نماید.
 - ۵- کمک‌های اولیه در انواع سوختگی‌ها را توضیح دهد.

تعریف سوختگی

به صدماتی که در اثر مجاورت پوست بدن با عوامل سوزاننده مانند حرارت، موادشیمیایی، جریان الکتریسیته و تابش اشعه ایجاد می‌شود سوختگی گویند. با توجه به درجه عامل سوزاننده و مدت زمان تماس آن با بدن شدت سوختگی متفاوت خواهد بود.

عوارض سوختگی‌ها

- ۱- ازدست رفتن حرارت بدن
- ۲- ازدست رفتن مایعات بدن
- ۳- ازدست رفتن انرژی بدن
- ۴- عفونت‌ها
- ۵- عوارض دیگری مانند استفراغ، شوک،
- ۶- عوارضی که پس از بهبودی ممکن است ایجاد شوند مانند بیهوشی، درد و اسکار و محدودیت حرکت مفاصل و، ...


عوامل تعیین‌کننده اهمیت سوختگی

- در برخورد با یک مصدوم دچار سوختگی باید به معیارهای زیر توجه داشته باشیم.
- ۱- درجه سوختگی
 - ۲- وسعت سوختگی
 - ۳- محل سوختگی
 - ۴- بیماری‌های همراه (بیماری قند، فشارخون، بیماری قلبی)
 - ۵- سن مصدوم

درجه سوختگی

سوختگی‌ها را بر حسب عمق آسیب واردہ به پوست به سه درجه تقسیم می‌کنند.
سوختگی درجه یک یا سطحی، سوختگی درجه دو یا متوسط، سوختگی درجه سه یا عمیق

سوختگی درجه یک یا سطحی



این سوختگی تنها لایه خارجی پوست را متاثر می‌کند و با قرمزی درد و سوزش همراه است این نوع سوختگی معمولاً در عرض چند روز بدون بجا گذاشتن اثری از خود بهبود می‌یابد و معمولاً نیاز به درمان خاصی ندارد.

سوختگی درجه دو یا متوسط



در این نوع سوختگی پوست نمای صورتی یا لکه دار پیدا می‌کند که با تاول، تورم، درد شدید و ترشح همراه است مدت بهبودی در این سوختگی طولانی‌تر است.

سوختگی درجه سه یا عمیق




در این نوع سوختگی پوست کاملاً تخریب شده و حتی ممکن است به بافت‌های زیرین پوست یعنی چربی، عضلات و حتی استخوان نیز آسیب وارد شود. رنگ پوست بسیار متفاوت است ممکن است سفید، زرد مایل به قهوه‌ای، سیاه یا کاملاً شفاف باشد



در این نوع سوختگی به علت از بین رفتن انتهای اعصاب حسی درد وجود ندارد.

وسعت سوختگی

به درصدی از سطح پوست که آسیب دیده است وسعت سوختگی گویند. و خامت سوختگی در مرحله اول باید با توجه به وسعت آن برآورد شود. هرچه سوختگی بیشتر باشد مایعات بیشتری از دست می‌رود و احتمال بروز شوک بیشتر است. برای تخمین وسعت سوختگی از قانون ۹ می‌توان استفاده نمود که در این روش سطح بدن به مضربهایی از عدد ۹ به شرح زیر تقسیم بندی شده است.



در صد مناطق سوختگی بر اساس قانون ۹

سر و گردن٪ ۹
سینه و شکم٪ ۱۸
قسمت پشت تن٪ ۱۸/ هر پا٪ ۱۸
هر دست٪ ۹، ناحیه پرینه و دستگاه تناسلی٪ ۱
این تقسیم بندی در مورد کودکان نیز صادق است با این تفاوت که سرو گردن٪ ۱۸ و هر پا٪ ۱۴ محاسبه می‌شود.

محل سوختگی

در تعیین و خامت سوختگی محل آن از اهمیت به سزاگی برخوردار است. مثلاً سوختگی بعضی نقاط بدن مانند سر و گردن خطرناک‌تر از سایر نواحی بدن است. زیرا تورم ناشی از سوختگی باعث تنگی نفس یا انسداد مجاری تنفسی می‌شود.

بیماری‌های همراه یا عوامل زمینه‌ای

سوختگی در افرادی که از یک بیماری قلبی یا دیابت رنج می‌برند یا کسانی که دچار آسیب‌های دیگری هم‌زمان با سوختگی شده‌اند حتی اگر از درجات پایین نیز برخوردار باشد واکنش‌های شدیدی را به دنبال دارد.

سن مصدوم

از جمله عوامل مهم در تعیین اهمیت سوختگی بوده بطوری که در سنین پایین‌تر از ۵ سال و بالای ۵۵ سال احتمال وقوع شوک و از دست رفتن سریع مایعات بدن به دنبال سوختگی وجود دارد.

کمک‌های اولیه در سوختگی‌ها

- ۱- لباس و موهای مصدوم را در صورت آتش سوزی خاموش کنید.
- ۲- مصدوم را بر روی زمین بخوابانید.
- ۳- محل سوختگی را با آب سرد نمائید.
- ۴- وضعیت عمومی مصدوم را بررسی کنید.
- ۵- لباس‌های مصدوم را خارج کنید ولی لباس‌های چسبیده به پوست را جدا نکنید بلکه آن‌ها را از اطراف محل چسبیده قیچی کنید.
- ۶- شستشوی زخم‌های ناحیه سوختگی را باید با محلول استریل نرمال سالین و به آرامی انجام داد، در این مورد پوست‌های شل و کنده شده باید برداشته شوند. تاول‌های کوچک و سالم را به حال خود باید باقی گذاشت ولی تاول‌های پاره شده و حاوی ماده خونی و یا کدر باید برداشته شوند. تاول‌های بسیار بزرگ را باید آسپیره کرد و پوست آن را به عنوان پوشش حفظ نمود.
- ۷- پانسمان زخم‌های سوختگی درجه دو با پماد نیتروفورازون صورت گیرد. باید دقت نمود که بعد از خشک نمودن ملایم زخم، پماد را باید با چوب زبان استریل و یا

دستکش استریل به روی زخم مالید و سپس لایه گاز استریل بر روی آن قرار داد.

-۸- با توجه به حال عمومی بیمار، وسعت و محل سوختگی در صورت نیاز مصدوم را به مرکز بهداشتی درمانی ارجاع دهید.

سوختگی‌های شیمیایی

تماس با برخی مواد شیمیایی مانند اسیدها، بازها، حلال‌ها، سفیدکننده‌ها و مواد رنگ بر قوی سبب سوختگی و صدمه به پوست می‌شود. برخی از بافت‌های بدن به سوختگی‌های قلیایی حساس‌ترند. مانند مخاط چشم، دهان، راه تنفسی سوختگی با مواد قلیایی از اسیدها خطرناک‌تر است چون در پوست بیشتر نفوذ می‌کند و مدت طولانی‌تری فعال باقی می‌مانند.

اقدامات اولیه

۱- حتماً از دستکش استفاده کنید.

۲- لباسهای مصدوم را خارج کنید.

۳- ناحیه آلوده و سوخته را به مدت ۱۰ دقیقه زیر جریان آب سرد بگیرید تا ماده شیمیایی از سطح پوست شسته شود. مصدوم را به مرکز درمانی ارجاع دهید.

سوختگی چشم با مواد شیمیایی


اقدامات اولیه :

۱- چشم را به مدت ۲۰ دقیقه شستشو دهید. (از داخل به خارج)

۲- قبل از انتقال مصدوم چشم وی را با یک بانداز استریل بپوشانید.

۳- مصدوم را به پزشک ارجاع دهید.

اقدامات اولیه در سوختگی‌های حرارتی



سوختگی تابشی

این نوع سوختگی معمولاً در اثر تابش اشعه ماوراء بنفش موجود در نور خورشید روی می‌دهد. در صورتی که پوست بدن برای مدت طولانی بخصوص در تابستان در معرض تابش نور خورشید قرار گیرد دچار آفتاب سوختگی می‌شود.

کمک‌های اولیه در آفتاب سوختگی

آفتاب سوختگی خفیف

که با علائمی مانند قرمزی و درد و سوزش خفیف پوست سوخته بروز می‌کند. که نیاز به اقدام خاصی ندارد. و استفاده از کرم‌های ضد آفتاب برای جلوگیری از تابش بیشتر نور خورشید توصیه می‌شود.

آفتاب سوختگی متوسط

قرمزی و گرمی وسیع پوست همراه با تاول که اقداماتی مانند بالاتر قرار دادن عضو سوخته از سطح بدن برای کمتر شدن پرخونی منطقه سوخته، استفاده از کمپرس آب سرد، استفاده از نرم‌کننده برای جلوگیری از سوختگی و از خشکی و ناراحتی بیشتر پوست موثر است.

آفتاب سوختگی شدید

در این حالت منطقه سوخته شدیداً ملتهب و متورم است. هنگام لمس درد شدیدی ایجاد می‌کند. و پوست به حالت کاملاً براق و نازک در می‌آید. که درمان قطعی این نوع سوختگی ارجاع فوری بیمار به مرکز درمانی است.

جدول کمک‌های اولیه در انواع سوختگی

درجه سوختگی	علائم	آنچه باید انجام شود	آنچه نباید انجام شود
درجه یک	تورم، درد و سوزش	سودکردن موضع با آب سرد و پانسمان خشک	قراردادن خمیردندان، سیب زمینی و نظایر آن
درجہ دو و وسیع	درد شدید، تورم، سوزش و تاول	فروبردن درآب سرد، پانسمان خشک استریل، درمان شوک، اعماق به مرکز درمانی	ترکاندن تاولها، برداشت پوست باقی مانده، استفاده از بیمادهای خانگی
درجہ سه	تخرب قسمت‌های عمیق پوست، حتی عضلات و استخوان، درد وجود ندارد.	پانسمان با وسایل استریل، درمان شوک، بررسی مشکلات تنفسی، انتقال سریع به مرکز درمانی	برداشتن البسه‌ای که به پوست چسبیده - استفاده از بیمادهای خانگی
سوختگی‌های شیمیایی تاول	درد، سوزش، قرمزی،	حذف عامل سوزاننده از روی پوست با جریان آب فراوان حداقل به مدت ۱۰ دقیقه برداشتن لباسهای غیرچسبیده، پانسمان محل سوختگی، انتقال به مرکز درمانی	برداشتن البسه‌ای که به پوست چسبیده، شستشوی با فشار زیاد آب،

تقسیم بندی سوختگی در بزرگسالان

الف - سوختگی درجه ۳ در کمتر از ۲٪ سطح بدن ب - سوختگی درجه ۲ در کمتر از ۱۵٪ سطح بدن ج - سوختگی درجه ۱ در کمتر از ۵۰٪ سطح بدن	سوختگی خفیف:
الف - سوختگی درجه ۳ بین ۱۰٪ تا ۲۰٪ سطح بدن (بجز دست و پا، صورت، دستگاه تنفس فوقانی، دستگاه تناسلی) ب - سوختگی درجه ۲ بین ۱۵٪ تا ۳۰٪ سطح بدن ج - سوختگی درجه ۱ در بیش از ۵۰٪ سطح بدن	سوختگی متوسط
الف - سوختگی درجه ۳ در دست، پا، صورت و اعضاء تناسلی ب - سوختگی درجه ۳ در بیش از ۱۰٪ بدن ج - سوختگی درجه ۲ در در بیش از ۳۰٪ بدن د - سوختگی با اسید، برق گرفتگی، سوختگی در بیمار دارای بیماری زمینه‌ای	سوختگی شدید(بحرانی)

تقسیم‌بندی سوختگی در کودکان و نوزادان

سوختگی خفیف:	ب - سوختگی درجه ۲ در کمتر از ۱۰٪ سطح بدن
سوختگی متوسط	ب- سوختگی درجه ۲ در ۱۰٪ تا ۲۰٪ سطح بدن
سوختگی شدید (بحارانی)	الف - سوختگی درجه ۲ یا ۳ در بیش از ۲۰٪ بدن
	ب - سوختگی در دست، پا، صورت، مجاری تنفسی یا دستگاه تناسلی

تمرین نظری و عملی

- ۱- معیارهای ارجاع فوری در انواع سوختگی کدامند.
- ۲- عوارض مخاطره آمیز ناشی از سوختگی‌ها را فهرست نمایید.
- ۳- اقدامات اولیه عمومی در مورد انواع سوختگی‌ها را توضیح دهید.
- ۴- پانسمان انگشتان دست را که دچار سوختگی درجه دو شده‌اند انجام دهید.

بخش دوازدهم

اثرات تغییرات بیش از حد دما بر روی فعالیت‌های بدنی

اهداف آموزشی

انتظار است پس از یادگیری محتوای این مبحث فرآگیر بتواند:

- ۱- دلایل ایجاد گرمایش و سرمایش را فهرست کند.
- ۲- نشانه‌ها و علایم گرمایش و سرمایش را فهرست نماید.
- ۳- اقدامات اولیه در هنگام بروز گرمایش را توضیح دهد.
- ۴- اقدامات اولیه در عارضه سرمایش را توضیح دهد.
- ۵- اقدامات اولیه در عارضه یخ زدگی را توضیح دهد.

تغییرات شدید دما



قرار گرفتن در معرض گرما و یا سرمای بیش از حد موجب می‌شود که بدن نتواند حرارت طبیعی خود را حفظ نماید. بدن ما حرارت و گرما را از منابع خارجی نظیر گرمای تشعشعی نور خورشید، غذا و یا نوشیدنی گرم و یا تماس با یک جسم گرم به دست می‌آورد. همچنین می‌تواند حرارت را در شرایط سرما، هوای مرطوب و یا تماس با جسم سرد به بیرون

بفرستند. همچنین بدن می‌تواند حرارت را در درون خود بوسیله تبدیل غذا به انرژی و فعالیت عضلانی در طی ورزش و لرزیدن ایجاد کند. به این ترتیب بدن ما می‌تواند هم گرما را ذخیره کند و هم آن را از دست بدهد.

بدن حرارت را بوسیله متسع شدن عروق سطحی پوست (از دست رفتن گرمای خون از طریق تشعشع پوستی) و تعریق (از دست دادن گرما از طریق تبخیر) از دست می‌دهد. بدن حرارت را بوسیله انقباض عروق خونی سطح بدن (که باعث نگهداری حرارت مرکزی بدن می‌شود)، تعریق کمتر، تنفس آهسته‌تر و راست شدن موهای پوست که باعثی شود هوای گرم در پوست باقی بماند نگاه می‌دارد.

تنظیم کننده حرارت در مغز به طور معمول ایجاد تعادل بین حرارت بوجود آمده و از دست رفته می‌کند و دمای بدن را در حالت ثابت ۳۶-۳۸ درجه سانتی‌گراد نگهداری می‌کند. زمانی که هوای محیط بسیار سرد و یا گرم است شرایط نامساعدی ایجاد می‌شود که موجب می‌شود که بدن تعادل حرارتی خود را از دست بدهد.

حمله گرمایی(heat stroke)

این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که بدن قادر نیست از شر گرمای اضافی تولید شده خلاص شود که ممکن است ناشی از بیماری‌های تبدار و یا بودن فرد در محیط بسیار گرم باشد. موقعیت‌های خاصی پیش می‌آید که در آن بسیار مشکل است که بدن گرمای اضافی خود را از دست دهد به عنوان مثال:

۱- زمانی که دمای محیط بسیار بالا است و حرارت بدن از طریق تشعشع نمی‌تواند کاهش یابد.

۲- وقتی که رطوبت محیط بسیار بالا است و عرق بدن نمی‌تواند تبخیر شود. حمله ناشی از گرمایی در این شرایط می‌تواند به سرعت گسترش یابد بخصوص زمانی که بدن حرارت زیادی را در طی فعالیت مداوم عضلانی ایجاد کرده است. حمله گرمایی ایجاد شرایط نا مساعد در بدن است که به سرعت گسترش یافته و وخیم می‌شود و باعث می‌شود که که فعالیت مرکز تنظیم کننده حرارت در مغز به هم بخورد و دمای بدن به طور خطرناکی در برابر تب بالا و یا قرار گرفتن در محیط بسیار گرم به هم بخورد.

علائم: فرد مبتلا دارای علائم زیر می‌باشد

۱- بیقراری و گیجی

۲- وجود سر درد و سرگیجه

۳- پوست گرم و قرمز و خشک است.

۴- تنفس آهسته و عمیق و نبض کوبنده است.

۵- دمای بدن بالای ۴۰ درجه سانتی‌گراد و سطح آگاهی مصدوم کم می‌شود تا سر انجام به نا آگاهی کامل می‌رسد.


اصول اقدامات اولیه

- باید سریعاً دمای بدن فرد را پایین آورد و مراقبتهای لازم را انجام داد.

گام اول: فرد آسیب دیده را به مکان سرد منتقل کنید و لباس‌های او را از تن خارج نمایید.

گام دوم: بدن فرد آسیب دیده را بوسیله پیچیدن در ملحفه خیس و پارچه سرد و یا با قرار دادن در روپرتوی پنکه یا کولرنیز خنک نمایید می‌توان این عمل را تا زمانی ادامه دهید که درجه حرارت بدن مصدوم به $\frac{37}{4}$ درجه سانتیگراد برسد و اورا به پزشک ارجاع دهید. (در حین ارجاع این عمل را ادامه دهید).
*به یاد داشته باشید که اگر دمای بدن مصدوم به زیر $\frac{37}{8}$ درجه سانتیگراد نرسد احتمال بازگشت مجدد حمله گرمایی وجود دارد.

گام سوم: در حین سرد کردن بدن مصدوم، سر و گردن مصدوم را کمی از سطح بدن شبالاتر قرار دهید تا احساس راحتی کند.



گام چهارم: هرگز به مصدوم نوشیدنی داغ ندهید.

گام پنجم: همیشه مراقب عوارض حمله گرمایی: تشنج، ورود مواد استفراغی به مجرای تنفسی و ... باشید.

گام ششم: همیشه مصدوم را به پزشک ارجاع دهید حتی اگر دمای بدنش کاهش یابد.

اگر فرد آسیب دیده هوشیاری خود را از دست داد (A و وضعیت گردش خون و راههای تنفسی) را کنترل نمایید به این ترتیب که راه تنفسی را باز نمایید، تنفس و نبض را کنترل نمایید. اگر فرد بیهوش دارای تنفس بود او را در وضعیت بهبود بخش قرار دهید و اگر تنفس نداشت عملیات احیاء را شروع کنید.

فرسودگی ناشی از گرما(heat exhaustion)

به ایجاد شرایطی در بدن می‌گویند، زمانی که آب و نمک از طریق تعریق بیش از حد از بدن خارج می‌شود، اتفاق می‌افتد که اغلب اوقات بوسیله کار و فعالیت بیش از حد در محیط بسیار گرم پیش می‌آید.

در واقع فرسودگی ناشی از گرما بوسیله کاهش آب و نمک در طی تعریق بیش از حد پیش می‌آید، این موقعیت زمانی پیش می‌آید که فرد دارای سابقه‌ای از بیماری و اسهال می‌باشد. این عارضه بتدريج پيشرفت می‌کند و ممکن است که باعث شود تا مرکر تنظيم درجه حرارت بدن در مغز مختلف شود و حمله گرمایي نيز رخ دهد در چنین حالاتي اگر فرد آسيب دیده حتى به سرعت بهبود يابد حتماً توسيط پزشك يابد ديده شود.

علائم فرسودگی ناشی از گرما

- ۱-فرد دارای سردد و سرگیجه است.
- ۲-اشتهاي کم و حالت تهوع دارد.
- ۳-تعریق همراه با رنگ پريديگي و پوست مرطوب می‌باشد.
- ۴-گرفتگي ماهيچه در ساق پا و شکم دارد که بر اثر کمبود نمک اتفاق می‌افتد.
- ۵-نبض و تنفس ضعيف و تند می‌باشد.
- ۶-حرارت بدن ممکن است در حد عادي باقی بماند و یا پايان آيد.
- ۷-تصدوم ممکن است بر اثر هر حرکت ناگهانی ضعف کند.

اصول درمان

- الف-فرد آسيب دیده را هر چه سريعتر به محل سرد منتقل کنيد.
 - ب-آب و نمک از دست رفته را جايگزين کنيد.
- گام ۱: کمک نمایيد تا فرد آسيب دیده در مكان سرد در وضعیت دراز کشیده باشد در حالی که پاها از سطح بدن به علت برگشت بيشتر خون به مغز بالاتر است.

بخش دوازدهم: اثرات تغییرات بیش از حد دما بر روی فعالیتهای بدنی / ۲۲۵

گام ۲: در صورت هوشیاری فرد مقداری محلول نمک رقیق ۱۰٪ (۱ قاشق مرباخوری معادل ۱۰ گرم نمک در یک لیتر آب) و یا محلول ORS بدهید.

گام ۳: فرد مصدوم را سریعاً به نزد پزشک ارجاع دهید حتی اگر حال عمومی وی به سرعت بهبود یابد.

گام ۴: اگر فرد آسیب دیده بیهوش شد او را در وضعیت بهبود بخش قرار دهید، نبض و تنفس و سطح جواب به تحریکات را هر ۱۰ دقیقه یک بار کنترل نمایید و در صورت لزوم وسائل احیاء را فراهم نمایید.

افت درجه حرارت مرکزی بدن (hypothermia)

حالتی است که دمای بدن به زیر ۳۵ درجه سانتی گراد می‌رسد. کلیه فعالیتهای بدن کند و حتی متوقف می‌شود. نوزادان و افراد پیر، بیشتر در معرض خطر برای ایجاد این عارضه هستند.

در زمان قرار گرفتن در معرض سرمای شدید بدن حرارت مرکزی خود را به وسیله انقباض عروق سطحی پوست ثابت نگاه می‌دارد. در شرایطی که دمای مرکزی بدن به زیر ۳۵ درجه سانتی گراد می‌رسد هیپوترمی گسترش می‌باید و فعالیتهای بدن آهسته و حتی متوقف می‌شود. هیپو ترمی می‌تواند سریعاً و یا به تدریج بر اساس درجه و میزان سرد شدن بدن و توانایی بدن برای کنترل دما گسترش یابد.

بالغین سالم در شرایط محیط بیرونی سرد و یا کار کردن در محیط‌های خیس و سرد علائم هیپو ترمی را بوسیله لرزیدن نشان می‌دهند. این حالات بوسیله باد و باران تشدید می‌یابد. بر عکس افراد پیر و یا بالغین بیمار تمایل دارند که فعالیت کمتری داشته باشند و گرمای کمتری را تولید نمایند. همچنین نوزادان در معرض خطر قادر به تنظیم درجه حرارت بدنشان نیستند تمام این گروه‌ها اگر در معرض هوای سرد در اتاق سرد قرار بگیرند سریعاً هیپو ترم می‌شوند.

یک فرد پیر ممکن است علائم هیپوترمی را بخصوص اگر هوای اتاق سرد باشد و یا فرد قادر به حرکت نباشد و یا قادر به خوردن نباشد گسترش دهد.

همچنین یک فرد سالم در محیط بیرون ممکن است دچار هیپوترمی شود اگر:

۱- به علت تصادف قادر به حرکت کردن نباشد.

۲- در آب سرد افتاده باشد.(حداقل به مدت نیم ساعت)

۳- خسته، گرسنه و یا کم آب باشد.

یک فرد بالغ که از هیپو ترمی رنج می‌برد می‌تواند علائم زیر را داشته باشد:

۱- لرز

۲- پوست سرد، رنگ پریده و مرطوب

۳- رفتار حاکی از بی‌توجهی نسبت به محیط و اغلب تهاجمی

۴- کاهش سطح هوشیاری و خواب آلودگی

۵- تنفس سطحی و آهسته و نبض ضعیف و آهسته است و در شرایط بسیار وخیم،
فعالیت قلب ممکن است که متوقف شود.

یک نوزاد که در محیط سرد و در معرض هیپو ترمی قرار می‌گیرد:

۱- دارای پوست به ظاهر طبیعی می‌باشد. صورت، دست‌ها و پاها صورتی روشن به نظر می‌رسد.

۲- ممکن است که بیقرار شود و یا به طور غیر طبیعی ساکت شود و یا از مکیدن امتناع کند.

سرمازدگی در سالمندان

بدن اشخاص پیر و رنجور و بیمار از نظر تنظیم حرارت دچار مشکل است و نمی‌تواند به خوبی با سرما مقابله کند. در افراد مسن ممکن است سرمازدگی با سکته و یا حمله قلبی اشتباه شود.

اصول اقدامات اولیه

الف- پیشگیری از دست دادن بیش از حد دما و حرارت بدن

ب- نگهداری دمای مرکزی بدن

ج- گرم نمودن فرد

د- انجام کمک‌ها و امداد اولیه

در بالغین سالم، گرم نمودن بدن می‌تواند بسرعت در حمام با آب ۴۰ درجه سانتی گراد انجام گیرد به شرطی که حال عمومی فرد طوری باشد که قادر به حمام کردن به تنها بای باشد.

نوزادان و یا افراد پیر و یا کسانی که بدون کمک قادر به حمام کردن نیستند لازم است که به تدریج گرم شوند و از گرم کردن سریع در حمام جلوگیری شود.

گام ۱: سر را بپوشانید و پارچه خیس و خنک را با پارچه گرم و خشک تعویض نمایید. در صورت لزوم می‌توانید پوشش بیشتر بدور بدن فرد را با لایه‌های پنبه، لباس و یا روزنامه فراهم نمایید. فرد را به محیط امن منتقل کنید.

گام ۲: فرد آسیب دیده هوشیار را در وضعیت خوابیده نگاه دارید و نوشیدنی‌های گرم، سوپ و مواد پر انرژی مانند شکلات را به او بدهید.

گام ۳: مراقبت‌های اولیه را با جلوگیری از گرم شدن بیش از حد به دقت انجام دهید. به خاطر داشته باشید که اگر فرد پیر و یا نوزاد باشد در اثر گرم شدن بیش از حد ممکن است دچار هیپر ترمی شده و علائم حمله گرمایی را نشان دهد.

گام ۴: اگر فرد هوشیاری خود را از دست داد CAB را کنترل کنید به این ترتیب که راه تنفسی را باز نگاه دارید و تعداد تنفس و نبض را کنترل نمایید. اگر فرد بیهوش تنفس داشت او را در وضعیت بهبود بخش قرار دهید و اگر تنفس نداشت عملیات احیاء را شروع نمایید.

توجه: مصدومی که دچار سرمازدگی شدید است ممکن است به قدری خسربان قلبش آهسته شود که ردیابی آن مشکل شود و به احتمال زیاد تنفسش نیز نامحسوس شود. بنابراین همیشه نبض را به مدت یک دقیقه قبل از این که ماساژ خارجی قلب را شروع کنید کنترل نمایید.

توجه داشته باشید که هرگز برای گرم کردن فرد:

-از نوشیدنی‌های الکلی استفاده نشود.

-مصدوم ضعیف به سرعت در حمام گرم نشود

-حرارت مستقیم نظیر بطری آب گرم و آتش در نزدیک فرد نباشد.

یخ زدگی (frost bite)

حالتی غیر طبیعی است که در سرمای بسیار شدید ایجاد می‌شود. در این شرایط عروق خونی سطحی پوست منقبض می‌شوند تا دمای مرکزی بدن را در حالت تعادل نگاه دارند و با محروم شدن بافت‌های پوستی از گردش خون، و تحت سرمای شدید بافت‌ها شروع به یخ زدن می‌نمایند. این عارضه بیشتر در ناحیه گوش‌ها، بینی، چانه و دست‌ها و پاها پیش می‌آید.

البته لازم به توضیح است که بافت‌هایی که به طور سطحی آسیب می‌بینند احتمال بهبود آن‌ها بسیار است. به هر حال یخ زدگی شدید می‌تواند باعث تغییرات دائمی بافت و حتی از بین رفتن انگشتان دست و پا شود. یخ زدگی ممکن است با سرما زدگی همراه باشد. در این صورت سرما زدگی باید قبل از یخ زدگی درمان شود.

یک فرد با علائم یخ زدگی

۱- دارای حس سوزن سوزن شدن ناحیه درگیر می‌باشد.

۲- ناحیه در گیر رنگ پریده و بدون حس است.

۳- پوست آن ناحیه سفت و سخت به نظر می‌رسد.

۴- تغییرات رنگ پوست ابتدا سفید و سپس آبی و لکه لکه و سرانجام پوست سیاه می‌شود.

۵- دست و پای یخ زده نمی‌تواند درست حرکت کند.

اصول اقدامات اولیه

الف-ناحیه درگیر را به آهستگی گرم نمایید تا از ایجاد هر گونه آسیب بافتی جلو گیری شود.

ب-کمک‌های اولیه را در اسرع وقت ارائه نمایید.

گام ۱: انجام کمک‌های اولیه را بلافصله شروع نمایید و مطمئن شوید هیچ خطری برای بخش زدن مجدد وجود ندارد.(فرد را به محیط امن منتقل کنید)

گام ۲: هر گونه محدودیت‌های مانند دستکش، چکمه و حلقه‌ها را از بدن دور کنید. بدن فرد را بدون مالش دادن گرم نگاه دارید(نقاط بخ زده را بین دست‌های خود و یا زیر بغل فرد آسیب دیده قرار دهید تا به آرامی گرم شوند).

گام ۳: اگر رنگ عضو آسیب دیده به سرعت بر نگشت، عضو را در آب گرم قرار دهید و بعد به آرامی، با دقیق و بدون مالش دادن آن را خشک نمایید.

گام ۴: جهت حفاظت عضو آسیب دیده از یک پانسمان سبک و بدون فشار استفاده نمایید. عضو را بالاتر از سطح بدن برده و اندام را حمایت نمایید تا ورم ایجاد شده کاهش یابد.

گام ۵: اگر بعد از یک ساعت گرم کردن، عوارض بخ زدگی بر طرف شد درمان را قطع کنید. اما نگذارید که مصدوم دوباره در معرض سرما قرار بگیرد زیرا که گردش خون آسیب دیده است.

توجه: ۱- به هنگام بهبود ناحیه گرفتار دردناک، قرمز و حتی تاول دار می‌شود.

۲- هرگز از گرمای مستقیم و به سرعت استفاده نکنید.

۳- هرگز تاول‌ها را نترکنید.

۴- هرگز فشار اضافی و یا مالش را اعمال ننمایید.

۵- هرگز از دارو و یا پماد بر روی ناحیه آسیب دیده استفاده نکنید.

تمرین نظری

- ۱-در چه شرایطی حمله گرمایی رخ می‌دهد؟
- ۲-علائم ناشی از فرسودگی گرمایی را فهرست نمایید.
- ۳-تفاوت سرمازدگی و یخ زدگی در چیست؟
- ۴-اقدامات لازم برای رفع یخ زدگی عضو را توضیح دهید.

بخش سیزدهم

سمومیت‌ها، گزیدگی‌ها

اهداف آموزشی

انتظار است پس از یادگیری محتوای این مبحث فرآگیر بتواند:

- ۱- سم را تعریف نموده و راههای ورود آن به بدن را توضیح دهد.
- ۲- علایم مهم مربوط به مارگزیدگی، عنکبوت گزیدگی، عقرب گزیدگی و زنبور گزیدگی را فهرست نماید.
- ۳- تدابیر مراقبتی در انواع گزیدگی‌ها را توضیح دهد.
- ۴- موارد نیاز به ارجاع فوری و غیرفوری را در انواع گزیدگی‌ها فهرست نماید.
- ۵- علایم و عوارض ناشی از ورود سم به داخل دستگاه گوارش را بیان نماید.

خصوصیات ماده سمی

سم به ماده‌ای گفته می‌شود که از راه بیرون یا درونی وارد بدن شده و با خواص شیمیایی خود سلامت شخص را به خطر می‌اندازد. ماده سمی ممکن است به حالت جامد، مایع و یا گاز باشد. در مسمومیت توجه فوری و سرعت عمل لازم است با هر لحظه تاخیر مقدار بیشتری سم وارد خون شده و خطر مرگ را زیادتر می‌کند.

چگونه سم عمل می‌کند؟

سوم از راه‌های گوناگون در بدن عمل می‌کنند. بعضی وارد جریان خون می‌شوند. بعضی از سمهای روى سلسه مركزي اعصاب تاثير دارند و باعث قطع تنفس، ضربان قلب و سایر فرایندهای حياتی می‌شوند. بعضی از سمهای جايگزین اكسيزن موجود در خون شده و مانع از رسیدن اكسيزن به بافت‌ها می‌شوند. بلعيدن سم مستقيماً روی مجرای گوارشي تاثير می‌گذارد و در نتیجه ايجاد استفراغ، درد و اسهال می‌نماید. هدف از کمک‌های اوليه در مسمومیتها، نجات زندگی مسموم بواسيله از بين بردن عامل مسمومیت و يا رقيق كردن سم و اعزام فوري او به بيمارستان است.

أنواع مسمومياتها

به طور کلی مسمومیتها را به ۴ دسته تقسیم می‌کنند:

الف- مسمومیت از راه دستگاه گوارش بواسيله خوردن و يا نوشیدن مواد سمی
ب- مسمومیت از راه دستگاه تنفس بواسيله استنشاق گازهای خانگی، بخارهای شیمیایی.


ج- مسمومیت از راه پوست مانند تماس پوست با حشره‌کش‌ها، گاز گرفتن بعضی از حيوانات و حشرات.

د - مسمومیت از راه تزریق : ماده سمی به طور مستقیم وارد جریان خون می گردد (مانند سم مار، عقرب ، عنکبوت پشت قرمز، حشرات ، ویای ورود ماده سمی در اثر تزریق توسط سرنگ و سرسوزن (مواد مخدر) یا در اثر زخم های نفوذی

درمان عمومی در مسمومیت‌ها



۱- خیلی سریع از مصدوم بپرسید که چه اتفاقی افتاده است. به خاطر داشته باشد که مصدوم هر آن ممکن است که بیهوش شود. نام، سن و جنس فرد مسموم را بیابید، نوع ماده سمی در تماس و یا بلع شده را پیدا کنید، مقدار مصرف شده را بیابید و زمان اتفاق افتادن مسمومیت را مشخص نمایید.



۲- باز نگاه داشتن راه هوایی
۳- اگر در اطراف لبها و یا دهان نشانه‌هایی از سوختگی مشاهده کردید به مصدوم آب و یا شیر بدهید تا این سوختگی خنک شود.

۴- رقیق کردن سم: می‌توان با رقیق کردن از اثرات سوء بسیاری از سم‌ها پیشگیری کرد. مثلا در مسمومیت با مواد سوزاننده نظیر اسید و یا قلیا، این عمل موجب کاهش سوختگی ناشی از این مواد در لوله گوارشی می گردد.

۵- وادار کردن به استفراغ: باعث کاهش $30\text{--}50$ درصد مواد سمی بلعیده شده داخل معده می گردد. این عمل را می بایست قبل از خارج شدن سم از معده به روده، یعنی در 30 دقیقه اول مصرف سم انجام داد.

توجه:

در شرایط زیر به هیچ عنوان نباید فرد مسموم را وادار به استفراغ نمود:

- ۱- بیمار در حال تشنج
- ۲- فرد بیهوش
- ۳- فرد دارای سابقه بیماری پیشرفته قلبی و یا حملات قلبی
- ۴- فردی که مواد اسیدی و یا قلیایی خورده باشد
- ۵- فردی که مواد نفتی و یا مشتقات آن را باعیده باشد(مانند گازوئیل، بنزین)
- ۶- کودکان زیر شش ماه

توجه:

از دادن آب نمک برای وادار کردن کودکان به استفراغ بپرهیزید زیرا این عمل بسیار خطرناک بوده و باعث مرگ کودک در اثر خفگی ناشی از استفراغ می شود. و اغلب ثمر بخش نیست زیرا در ۱۵ درصد موارد استفراغ تولید می شود.

۷- اگر مصدوم بیهوش بود، علائم حیاتی او را به طور مرتب کنترل نمایید. در صورتی که تنفس او حالت طبیعی داشت او را در وضعیت بهبود بخش قرار دهید.


۸- اگر تنفس و خربان قلب ایستاد عملیات احیاء را شروع کنید.

توجه:

- دقت کنید که خودتان به سمی که ممکن است در اطراف دهان مصدوم وجود داشته باشد آگوذه نشوید.

- مصدوم را بلا فاصله، بعد از اقدامات اولیه ارجاع دهید و به همراه او نمونه ای از جعبه محتوی قرص و یا هر چه که سم در داخل آن بوده، بفرستید.

- در صورتی که فرد مسموم دچار استفراغ گردید حتماً یک نمونه از مواد برگشته (استفراغی) تهیه و به همراه بیمار ارسال نمائید. (قبل از ارسال نمونه باید مشخصات بیمار و تاریخ بر روی ظرف نمونه ثبت شود.)




خصوصیات ظاهری مارهای سمی و غیرسمی

مار گزیدگی

مشخصات مارهای سمی

- ۱- سر مثلثی شکل است.
- ۲- محل گزش مارهای سمی با دو سوراخ اصلی (نیش) مشخص می‌شود.
- ۳- مردمک چشم مارهای سمی معمولاً بیضی شکل می‌باشد.



علائم و نشانه‌ها

تمام اعضاء بدن به جز مغز ممکن است به طور مستقیم تحت تاثیر سم قرار بگیرند. ابتدا قلب و عروق، بعد دستگاه تنفسی و سیستم گردش خون و سپس دستگاه عصبی متاثر می‌شود.

علائم اصلی گزش مارهای افعی، وجود درد، حساسیت، قرمزی و تورم در محل نیش مار است. درد معمولاً شدید و حالت تیز و سوزاننده داشته و در طی ۵-۱۰ دقیقه ظاهر می‌شود. اگر در طی یک ساعت پس از گزش ظاهر نشود یا مار از نوع غیر سمی بوده و یا اینکه مار سمی زهر خود را آزاد نکرده است.

ورم معمولاً در طی ۳۰ دقیقه تا ۴ ساعت بعد از گزش ظاهر می‌شود و کم کم پیشرفت کرده و ممکن است که کل اندام را درگیر کند.

اگر ورم بعد از ۲۴-۱۲ ساعت از گزیدگی ظاهر نشد. می‌توان مسمومیت با مار سمی را رد کرد. در طی ۲۴ ساعت اول بعد از گزیدگی تاولهای کوچک خونریزی دهنده در محل ابتلا ظاهر می‌شود. تهوع و استفراغ شایع بوده و وجود آن در دقایق و ساعات اولیه نشان دهنده شدت مسمومیت خواهد بود. مور کردن اطراف دهان، صورت و پوست سر و سوزن سوزن شدن انگشتان نشانه مسمومیت شدید است.

اختلالات انعقادی به صورت خونریزی از بینی، ادرار و یا استفراغ خونی و یا خونریزی داخل مغزی ممکن است بروز کند.

نارسایی کلیه شایع نبوده و معمولاً بر اثر افت فشار خون است.

حدود ۲۰ درصد موارد گزیدگی مارهای افعی بدون سم است و معمولاً به جز علائم خفیف موضعی، علائم دیگر ندارد.

اقدامات درمانی اولیه

۱. آرام نمودن آسیب دیده و مضطرب و اطمینان دادن به او که مرگ ناشی از مارگزیدگی بسیار نادر و خیلی کمتر از زنبورگزیدگی است

۲. دور نمودن آسیب دیده از محل حادثه (به منظور جلوگیری از گزیدگی مجدد)

۳. قرار دادن بیمار در وضعیت نشسته یا دراز کش، در حالیکه اندام مارگزیده در حالت افقی و یا پائین تر از سطح قلب قرار گیرد.

۴. بی حرکت نمودن اندام مارگزیده بوسیله آتل یا باند پارچه‌ای (هرگونه حرکت یا انقباض عضلانی ممکن است به افزایش ورود سم به جریان خون منجر شود)

۵. خارج ساختن تمام وسایل زینتی مانند ساعت و انگشت‌ر
۶. پرهیز از هرگونه دستکاری زخم ناشی از گزیدگی (ممکن است به عفونت، جذب سم و خون ریزی موضعی منجر شود)
۷. شستشوی محل گزش با آب و صابون و بانداز اندام مارگزیده
۸. استفاده‌های برانکار، در صورت نیاز به حمل مارگزیده
۹. بستن تورنیکه در صورت گزش مار سمی به منظور ایجاد تاخیر در جریان لنفاوی می‌توان از بستن تورنیکه با شرایط زیر استفاده کرد:
 ۱. باند باید در ناحیه پروکسیمال محل گزیدگی بسته شود.
 ۲. باند باید به گونه‌ای بسته شود که یک یا دو انگشت به سهولت از زیر آن عبور نماید. (فشار تورنیکه کمتر از فشار خون وریدی باشد).
 ۳. هر ۱۰ تا ۱۵ دقیقه محل باند عوض و در قسمت پروکسیمال ادم ایجاد شده بسته شود.
 ۴. در صورت مشاهده مار، ممکن است تلاش برای گرفتن و کشتن آن خط‌مناک باشد. با وجود این در صورت کشته شدن مار باید لاشه آن را به بیمارستان یا سایر مراکز درمانی تحويل داد. این امر به تشخیص نوع مار ممکن است کمک کند. در این موارد هرگز نباید مار را با دست حمل و جابجا کرد، زیرا گزیدگی رفلکسی می‌تواند حتی تا یک ساعت پس از مرگ مار اتفاق افتد.
 ۵. ساکشن در مارگزیدگی سمی در دقایق اول توصیه می‌شود. در صورتی که این اقدام طی ۵ تا ۱۰ دقیقه پس از گزیدگی انجام شود به خروج ۲۵٪ تا ۵۰٪ زهر از محل گزیدگی منجر می‌شود.

انتقال آسیب دیده به بیمارستان یا سایر مراکز درمانی

انتقال آسیب دیده هرچه سریع‌تر باید به بیمارستان یا سایر مراکز درمانی صورت گیرد، در حین انتقال باید تا حد امکان از حرکت دادن اندام مارگزیده خودداری شود. زیرا هرگونه افزایش حرکت یا انقباضات عضلانی باعث انتشار سم از محل گزیدگی و

افزایش جذب سیستمیک آن می‌شود. بهتر است در صورت امکان، چنانچه گزش مار سمی قطعی باشد، بیمار با برانکار حمل شود.

اقدامات رایج خطرناک که حذف شده و نباید انجام شود:

- ایجاد برش، خراش یا سوراخ در محل گزیدگی
- تلاش در جهت ساکشن سم از محل گزیدگی ۱۰ دقیقه بعد از گزش
- سفت بستن تورنیکه به دور اندام مارگزیده (این کار بسیار خطرناک و دردناک است زیرا ممکن است به آسیب ناشی از ایسکمی در اندام مارگزیده منجر شود. موارد متعددی از بروز سیاه زخم در نتیجه این عمل گزارش شده است)

عقرب گزیدگی

علائم بالینی :

این علائم بستگی به نوع عقرب، مقدار سم، فصل گزش، موقعیت سنی و وضع جسمانی فرد دارد. در حالت کلی معمولاً بلافصله بعد از گزش، سوزش همراه با درد در محل احساس می‌شود.

قرمز شدن پوست، تورم، خونمردگی، تاول از علائم دیگر است.

تغییرات فشار خون (تأثیر سم بر روی سیستم عصبی)، تغییرات تنفسی (تأثیر سم بر روی مراکز تنفسی)، تنفس دردناک (جمع شدن مایع در ریه‌ها)، تعریق زیاد، ترشح غیر طبیعی بzac، تهوع، استفراغ، سرگیجه، اضطراب، تشنج، گیجی، خونریزی داخلی، سردی پوست (بروز علائم شوک) نیز ممکن است ایجاد شود.

اقدامات اولیه :

نوع درمان بسته به نشانه‌های بالینی فرد، نوع عقرب و آثار ناشی از گزیدگی تغییر می‌کند.

- ۱- استراحت فرد
- ۲- بی حرکت نگاه داشتن عضو مبتلا

۳- کمپرس سرد جهت تسکین درد

۴- کنترل علائم حیاتی

۵- ارجاع فوری به مرکز بهداشتی درمانی

توجه:

درمان اختصاصی در عقرب گزیدگی، استفاده از سرم ضد عقرب گزیدگی است که باید در اسرع وقت انجام گیرد معمولاً نصف سرم در داخل عضله و یا زیر جلد اطراف محل گزش و بقیه در صورتی که نوع سرم اجازه دهد داخل رگ تزریق می‌شود (تحت نظر پزشک) سرم باید قدرت خنثی کنندگی لازم را داشته باشد. بدین ترتیب که اختصاصی و بر ضد سم عقرب‌های خطرناک منطقه باشد.

پیشگیری از عقرب گزیدگی :

در رویارویی با مشکل عقرب گزیدگی، پیشگیری از گزش و مبارزه با عقرب به مراتب اهمیتی بیشتر از درمان دارد. اقدام مناسب در این مورد، تخریب کپرها و بناهای کهنه و ایجاد محیط مسکونی مناسب است. بنا براین باید:

۱- از انباشتن سنگ، چوب، علوفه و سایر اشیاء در اطراف محل مسکونی به مدت طولانی خودداری شود.

۲- سوراخ‌ها و حفرات اطراف ساختمان مسدود گردد.

۳- حد فاصل ساختمان مسکونی و محیط باز حداقل به عرض یک متر سیمان و یا آسفالت شود.

۴- از فرو بردن دست در زیر سنگ‌ها، حفرات و سوراخ‌های فاقد دید کافی خودداری شود.

۵- برای خوابیدن در محیط باز از تخت مناسب استفاده شود.

۶- قبل از پوشیدن کفش و یا لباس و همچنین قبل از ورود به رختخواب از عدم حضور جانور اطمینان حاصل شود.

۷- از پا برنه راه رفتن در محیط باز بخصوص در هنگام شب خودداری شود.

زنبور گزیدگی

زنبور گزیدگی، نوعی تزریق سم به بدن است که از طریق نیش زنبور انتقال می‌یابد. نیش زنبور عسل و نیش زنبور معمولی باعث ایجاد قرمزی و سوراخ در محل گزیدگی، سوزش و درد و گاهی اوقات ورم نیز می‌شود. در صورت متعدد بودن نیش‌ها ممکن است واکنش حساسیتی شدید در فرد بروز کند که نیاز به توجه فوری دارد.

اقدامات اولیه

- ۱- در صورت وجود نیش حشره را به ملایمت خارج کنید.
- ۲- برای کاهش درد و تورم می‌توان از کمپرس سرد استفاده نمود.
- ۳- برای کاهش سوزش موضع گزیدگی، می‌توان از پماد کالامین دی استفاده کرد.
- ۴- در صورتی که حال عمومی مصدوم بد باشد علائم حیاتی را کنترل نموده و در قسمت بالای محل گزش تورنیکت بسته تا باعث انسداد وریدی شود.
- ۵- در صورت ایجاد وقفه قلبی، تنفسی، احیاء قلبی و ریوی انجام گیرد.
- ۶- مصدوم سریعاً به نزدیک‌ترین مرکز درمانی ارجاع داده شود.

گزش عنکبوت و رطیل

عوارض و نشانه‌ها:


- ۱- بروز ضایعات جلدی نظیر بروز سوزش، خارش، قرمزی و ورم در محل نیش
- ۲- علائم عمومی شامل ضعف، بی‌حالی، تب و لرز و درد مفاصل، سردردسرگیجه، تهوع و استفراغ
- ۳- در مراحل شدیدتر بروز تنگ نفس، افت فشار خون، ورم عمومی بدن و بثورات جلدی
- ۴- در موارد نادر ممکن است زردی، نارسایی کلیه، شوک و کما ایجاد شود.

اقدامات اولیه:

- ۱- کمپرس موضعی سرد جهت تسکین درد
- ۲- بی‌حرکت و پایین نگاه داشتن عضو از سطح قلب
- ۳- شستشو و پانسماں محل گزیده شده و تجویز ضد درد
- ۴- ارجاع فوری

مسمومیت با مواد مخدر

این نوع مسمومیت بر اثر استعمال بیش از حد مواد مخدر عارض می‌گردد. کسانی که به طرز غلط دائمًا به خود دارو و یا مواد مخدر تزریق می‌کنند احتمالاً نشانه‌هایی از تزریق زیر پوستی در روی بدنشان دیده می‌شود. رگ‌های ناحیه معمولًا برجسته و عفونی هستند.



این مواد به عنوان داروی کمکی در درمان اسهال و به عنوان ضد سرفه به کار می‌روند. اثرات سمی آن‌ها عمدتاً مربوط به تضعیف مرکز تنفسی می‌باشد. این گروه از داروها عمدتاً در کبد تغییر شکل داده و از راه کلیه دفع می‌گردند.

علائم و نشانه‌ها

۱- خواب آلودگی، ضعف مرکز تنفس (کاهش تعداد تنفس و افزایش عمق تنفس) و در حالات شدید کما، تنگی مردمک چشم‌ها از علائم اصلی و اولیه مسمومیت با این مواد هستند. در مواردی ممکن است تحریک پذیری و تشنج نیز عارض شود که این حالت در اطفال اتفاق می‌افتد. تهوع، استفراغ، کاهش حرکات روده (بیوست) و احتباس ادرار از دیگر علائم است. ضعف و وقفه تنفسی شایع ترین علت مرگ می‌باشد.

اقدامات اولیه:

- ۱- از ایجاد استفراغ بهتر است که خودداری شود.
- ۲- اکسیژن درمانی انجام شود.
- ۳-در صورت لزوم احیاء قلبی، تنفسی انجام شود.
- ۴-در صورت پایین بودن فشار خون، پاهای بیمار بالاتر از سطح بدن قرار بگیرد
- ۵-ارجاع فوری به مرکز درمانی داده شود.

سمومیت با مواد اسیدی و قلیایی :

ترکیبات حاوی اسید و قلیا که مصارف عمومی دارند عبارتند از پاک کننده و سفید کننده‌ها(آب ژاول، وایتكس)، صابون، آب باطری ماشین، ضایعات حاصل از این سمومیت‌ها عمدتا در معده ایجاد می‌شود. بافت پوششی مری نسبت به اسید نسبتا مقاوم است.

علائم و عوارض :

اولین تظاهر اصلی، درد در دهان و حلق و مری و ایجاد اشکال و سختی و درد در بلع می‌باشد که در موارد شدید منجر به ایجاد شوک می‌گردد. اگر تشنجی شدید وجود داشت می‌تواند ناشی از شوک باشد.
علت اصلی مرگ، شوک، خفگی، پارگی معده یا مری و عفونتهای همزمان است.

اقدامات اولیه :

- ۱- فرد را وادار به استفراغ نمی‌کنیم.
- ۲- در ساعت اول، تجویز مقادیر زیاد شیر، هر بار ۱۵۰-۲۰۰ سی سی و زرده تخم مرغ (چند عدد) و آب ساده، تا حد زیادی کمک کننده است.

- ۳- در صورت تماس جلدی با ماده، محل بایستی با آب معمولی و یا نرمال سالین حد اقل به مدت یک ساعت تا رفع هر نوع احساس خاصی در روی پوست محل تماس، شستشو انجام گیرد.
- ۴- اکسیژن درمانی انجام شود.
- ۵- در صورت لزوم احیاء قلبی، تنفسی انجام شود.
- ۶- در صورت تماس با چشم، چشم صدمه دیده زیر شیر آب حد اقل به مدت ۰/۵ ساعت شستشو داده شود
- ۷- ارجاع فوری.

مسمومیت با نفت و ترکیبات آن

این مسمومیت در کودکان بیشتر دیده می‌شود

علائم و نشانه‌ها:

- ۱- استشمام بوی نفت از دهان
- ۲- احساس سوزش در دهان و گلو
- ۳- تهوع و استفراغ، بیقراری
- ۴- اسهال
- ۵- اشکال در تنفس به علت تورم ریه‌ها

اقدامات اولیه:

- ۱- مصدوم را وادر به استفراغ نکنید
- ۲- مصدوم را گرم نگاه دارید
- ۳- کنترل علائم حیاتی
- ۴- اکسیژن درمانی
- ۵- ارجاع فوری به مرکز درمانی

سمومیت با داروها

خوردن بیش از حد داروهای مانند خواب آورها (فنو باربیتال، دیازپام و آلپرازولام ...) و غیر خواب آور (آسپرین ، استامینوفن ، آهن و) موجب مسمومیت و در نهایت مرگ می شود.

عوارض و نشانه ها:

- ۱- نفس در ابتدا تندر و سپس کند و ضعیف می شود.
- ۲- پوست سرد و مرطوب و کبود می شود.
- ۳- نبض تندر و فشارخون پائین می آید.
- ۴- اختلال سطح هوشیاری و خواب آلودگی عارض می گردد.
- ۵- تهوع و استفراغ و درد شکم ایجاد می گردد.

اقدامات اولیه:

- ۱- اگر مصدوم بیهوش نیست و بیش از نیم ساعت از زمان مصرف دارو نگذشته باشد مقداری آب گرم خورانده تا فرد وادار به استفراغ شود.
- ۲- اگر مصدوم بیهوش است به پهلوی چپ خوابانده تا سرعت جذب دارو کمتر شود.
- ۳- راههای تنفسی را باز نموده و او را با پتو گرم نگاه دارید.
- ۴- علائم حیاتی را کنترل کنید.
- ۵- اکسیژن درمانی انجام شود.
- ۶- فرد را ارجاع فوری به نزدیک ترین مرکز درمانی دهید.

تمرین نظری

- ۱- علائم ناشی از مسمومیت با نفت را لیست نمایید
- ۲- در هنگام بروز مسمومیت دارویی چه اقداماتی را باید انجام داد؟
- ۳- در چه مواردی وادر نمودن به استفراغ در مسمومیت‌ها ممنوع می‌باشد؟
- ۴- اقدامات لازم در مارگزیدگی را لیست نمائید؟

بخش چهاردهم

انواع روش‌های حمل مصدوم

هدفهای آموزشی

انتظار است پس از یادگیری محتوای این مبحث فراگیر بتواند:

- ۱- حمل را تعریف نموده و انواع حمل را لیست نماید.
- ۲- نکات لازم که در هنگام حمل هر مصدوم باید موردنوجه قرار گیرد افهرست نماید.
- ۳- مراحل انجام حمل و انتقال مصدوم را در حمل یکنفره، دونفره و بیشتر را توضیح دهد.
- ۴- نحوه حمل مصدوم در مواردی که آسیب جدی دارد را توضیح دهید.
- ۵- روش تهیه برانکارد با پتو و چوب را توضیح دهد.

طریقه صحیح حمل بیمار و یا مصدوم و نحوه انتقال او به مرکز درمانی و بیمارستان

انتقال مصدوم را به طریقه صحیح از محل حادثه به نقطه امن، جهت اجرای کمک‌های اولیه و یا انتقال مصدوم را به مرکز درمانی، بدون اینکه کمترین صدمه‌ای به مصدوم وارد آمده و یا باعث تشدید صدمات او شود، حمل می‌گویند.

به طور کلی نحوه حمل مصدوم بستگی به عوامل ذیل دارد:

۱- حال عمومی و وضعیت مصدوم

۲- وزن مصدوم

۳- مسافتی که برای رساندن مصدوم به محل مناسب باید طی شود.

۴- وسایل و امکانات موجود

به طور کلی تا انتقال مصدوم واقعاً واجب و حیاتی نشده است نباید اورا حرکت داد مگر آنکه از هرجهت درمعرض خطراتی مانند خطرریزش کوه، انفجار اتوموبیل، آتش سوزی و... باشد و یا اطمینان حاصل شده باشد که حمل وی مشکلات اضافی به ارنمی آورد. برای شروع کار باید موقعیت محل حادثه و وسایلی که در دسترس هست در نظر گرفت و در موقع حمل بیماری که نوع عارضه وی معلوم نیست باید فکر کرد که مصدوم شکستگی ستون فقرات دارد.

توجه: حمل غیر صحیح و کوچکترین بی‌دقیقی، ممکن است باعث ازدیاد صدمه و درد بیمار و شدت یافتن صدمات و عوارض سخت‌تری گردد.

انواع حمل‌ها

۱- حمل‌های یک نفره مانند آغوشی، سینه خیز، کششی، عصایی، آتش نشانی


۲- حمل‌های دونفره مانند زبانه‌ای، صندلی، دو مج، سه مج و چهار مج

۳- حمل‌های سه نفره و بیشتر (گروهی) مانند آغوشی، برانکارد، زیگزاکی


حملهای یک نفره

حملهای یک نفره مخصوص مصدومینی که آسیب جدی (آسیب به ستون فقرات) ندیده باشند و همچنین برای اطفال و افراد سبک وزن است. انواع آن مانند :


- حمل آغوشی
- حمل آتش نشانی
- حمل عصایی (در مخصوص مینی که از ناحیه پا آسیب دیده باشند)
- حمل سینه خیز (در آتش سوزی که اتاق پر دود باشد و یا در جبهه های جنگ)
- حمل کششی (وقتی مخصوص سنگین وزن باشد)



بخش چهاردهم: انواع روشهای حمل مصدوم / ۲۴۹



حمل سینه خیز



حمل عصایی



حمل کششی


حمل های دونفره :

برای مصدومینی استفاده می شود که آسیب جدی ندیده باشند. انواع آن مانند :

- زنبه ای



- با صندلی

- دو مج، سه مج و چهار مج




حمل با صندلی

حمل زنبه ای



حمل سه مج


حمل دو مج



حمل چهار مج

حمل های سه نفره و بیشتر (گروهی)

برای انتقال مصدوم از محیط خطر ، به خصوص اگر مصدوم بی هوش و آسیب جدی دیده باشد به کار می رود .



حمل آغوشی سه نفره



حمل زیگزاگی

حمل با برانکارد :

بهترین حالت برای حمل مصدوم استفاده از برانکارد است . به خصوص در مصدومی که آسیب جدی دیده و یا سنگین وزن است و مسافت راه طولانی باشد کاربرد دارد.






حمل با برانکارد

طرز تهییه برانکارد :

برای حمل مصدوم در مسافت های زیاد باید از برانکار استفاده کرد. چنانچه برانکارد در دسترس نبود برای ساختن آن می توان به کمک یک تخته پتو و دو عدد چوب دستی مطابق زیر رفتار کرد:

دو قطعه چوب بلند تهییه نموده، پتو و یا چادر شبی را بر روی زمین گسترده آن را از عرض به سه قسمت تقسیم کرد. یک چوب را بین تای ثلث دوم گذاشته و چوب دیگر را روی تای پتو که در فاصله ثلث دوم و سوم است قرار داده، سپس ثلث سوم را روی چوب دوم انداده و بیمار را روی آن قرار دهید.



تمرین نظری

- ۱- درهنگام حمل مصدوم جهت اینمی هرچه بیشتر و جلوگیری از صدمات اضافی چه نکاتی را باید رعایت کرد؟
- ۲- حمل سینه خیز، عصایی و کششی در چه موقعی به کار می‌روند؟

تمرین عملی

- ۱- مراحل آماده کردن برانکارد را جهت حمل مصدوم با کمک دوستان خود تمرین نمایید.
- ۲- طریقه حمل به روش آتشنشان را جهت حمل اطفال تمرین نمایید.
- ۳- طریقه انجام حمل به روش آغوشی دونفره را با کمک دوست خود تمرین نمایید.
- ۴- طریقه انجام حمل به روش زیگزاکی را با کمک دوستان خود تمرین نمایید.
- ۵- طریقه حمل مصدوم را با برانکارد با کمک دوستان خود تمرین نمایید.

بخش پانزدهم؛ تصادفات جاده ای

بخش پانزدهم

تصادفات جاده ای

اهداف آموزشی

پس از مطالعه این فصل انتظار است بتوانید :

- ۱ - اقدامات اساسی که در هنگام مواجهه با سوانح عمدۀ باید انجام گیرد را شرح دهید.
- ۲ - اقداماتی که باید در تصادفهای جاده ای انجام گیرد را شرح داده و در صورت مواجهه با چنین حوادثی بطور عملی این فعالیتها رو انجام دهید .
- ۳ - نحوه حرکت دادن مصدوم در تصادفات جاده ای را شرح داده و بطور عملی تمرین کنید .
- ۴ - اقداماتی که باید در هنگام مواجهه با سوانحی که در آنها مواد خطر آفرین در کار است را شرح داده و در صورت نیاز انجام دهید .
- ۵ - کمکهای اولیه به مصدومینی که دچار صدمه به سر شده اند را شرح داده و بطور عملی تمرین کنید

روش کار در سوانح عمدہ :

سوانح عمدہ آنهایی هستند که بیش از یک یا دو مجروح بر جای می گذارند . این سوانح ممکن است طبیعی باشند . مثل زمین لرزه یا احتمالاً بر اثر خطای انسان بوجود می آیند مانند تصادف وسیله نقلیه ، تعداد مجروحین بسته به نوع حادثه و درجه نیاز آنها به درمان بسته به نوع جراحت و زخم فرق می کند . مصدوم ممکن است در جایی گیر افتاده یا ممکن است در مسافتی دورتر از محل حادثه پرت شده باشد . یا ممکن است آنها را در محل وقوع حادثه در حالی که مات و مبهوت هستند پیدا کرد . در هر سانحه ای نحوه برخورد با مصدوم بسیار مهم است . چنانچه گفته شد کار اساسی این است که ابتدا یک شناسایی مقدماتی از صحنه حادثه بعمل آورید . شما باید به این نکته ها را دریابید .

- دقیقاً چه اتفاقی افتاده است ؟ آیا هنوز خطر وجود دارد ؟ چه تعداد مصدوم وجود دارد و حال آنها چگونه است ؟

در صورتی که خطر بعدی برای مصدوم وجود ندارد بایستی به ارائه کمکهای اولیه مصدوم بر حسب اولویتهای تنفس ، خونریزی و بیهوشی بپردازید . بهر حال باید خطر را از مصدوم دور کنید و اگر امکان نداشت مصدوم را از خطر برهانید .

تصادفهای جاده ای :

بطور کلی اصول عمومی رفتار در هر سانحه عمدہ را می توان به بهترین نحو یا مثالی در مورد برخورد با مصدوم های تصادفات روشن نمود . مهمترین نکته ای که باید بخاطر داشته باشید این است که مصدوم را مطلقاً حرکت ندهید مگر آنکه واقعاً لازم باشد .

تصمیم در مورد این کار بویژه اگر مصدوم بیهوش باشد به علت آنکه ممکن است خطر آسیب ستون فقرات یا خونریزی شدید داخلی وجود داشته باشد بایستی کاملاً با دقت اتخاذ شود.

اگر مصدوم را خطرهایی مانند آتش گرفتن یا قطع تنفس و ضربان قلب تهدید نمی کند اول باید یک معاینه کامل از او بعمل آورید تا قبل از حرکت دادن وی شدت صدمات واردہ را دریابید. سپس اقدامات ذیل را دنبال نمائید:

- ببینید آیا اطراف وسیله نقلیه علائم هشدار دهنده مانند علامت خطر شیمیایی وجود دارد یا خیر؟ (عموماً کامیون ها یا تریلرهایی که مواد خطرناک حمل می کنند دارای چنین علائمی هستند)
- به کسی سفارش کنید بلافاصله با اورژانس منطقه یا پزشک مرکز بهداشتی درمانی تماس تلفنی گرفته و تقاضای کمک از سوی شما بنماید.
- مصدوم را از درون وسیله نقلیه به بیرون نکشید. زیرا این کار ممکن است باعث آسیب بیشتر مصدوم شود.
- برای به حداقل رسانیدن خطر آتش سوزی موتور روشن را خاموش کنید و اگر می توانید باطری را قطع کنید، چون اغلب آتش سوزیها از سیم پیچ های کاپوت یا زیر داشبورد بوجود می آید اجازه ندهید افرادی که در آن نزدیکی هستند سیگار بکشند، اگر وسیله نقلیه از نوع دیزلی است سوئیچ باک را قطع کنید. عموماً برای اینکار یک سوئیچ اضطراری بیرون وسیله نقلیه وجود دارد.
- از کسی بخواهید که ۲۰۰ متر آنطرف تر بایستد و وسائل نقلیه را راهنمایی کند.

۶- ماشین را از جای خود حرکت ندهید . اگر ماشین روی چهار چرخ خود قرار دارد ترمز دستی را بکشید ماشین را در دنده بگذارید و یا یک تکه آجر یا سنگ زیر چرخ قرار دهید . اگر ماشین چپ شده به پهلو قرار گرفته و افرادی در آن هستند ، سعی نکنید ماشین را برگردانید . فقط کاری کنید که ماشین نغلند .

۷- درون وسیله نقلیه را خوب ببینید احتمالاً ممکن است بچه کوچک در زیر پتو یا وسایل پنهان شده باشد . اطراف را خوب ببینید تاکسی از ماشین پرت نشده باشد و دور از چشم شما باشد ، اگر مصدوم بپوش است از او بپرسید که چند نفر درون ماشین بوده اند .

حرکت دادن مصدوم :

اگر شرایط به گونه ای است که باید مصدوم را حرکت داد . اینکار را خیلی با دقت انجام دهید . مصدوم باید تا آنجا که ممکن است ثابت و بی حرکت انتقال داده شود و شما باید اول مطمئن شوید که به اندازه کافی نفرات در اختیار دارید تا هر کدام قسمتی از بدن مصدوم را بگیرند . در صورتی که تعدادی افراد در محل حضور دارند دقیقاً آنها را در مورد اینکه چگونه بایستی مصدوم را انتقال دهنند توجیه کنید . هر فرد باید دقیقاً از کاری که انجام می دهد آگاهی داشته باشد . حتی الامکان باید انتقال مصدوم با یک حرکت یکنواخت انجام گیرد . اگر مصدومی زیر وسیله نقلیه گیر کرده باشد او را قبل از رسیدن پزشک یا کارکنان اورژانش از آنجا بیرون بیاورید ، اگر اینکار امکان پذیر نبود وسیله نقلیه را همانطور که گفته شد ثابت نگهدارید و مصدوم را با ملایمت هر چه تمامتر از زیر وسیله نقلیه بیرون بکشید .

وضعیت دقیق مصدوم یا وسیله نقلیه را قبل از انتقال دادن هر کدام کاملاً به خاطر بسپارید چون احتمال دارد بعد پلیس به این اطلاعات نیاز داشته باشد .

در تمام سوانح فقط به دو علت باید تصمیم بگیرید این که آیا مصدوم را حرکت بدھیم؟ یا حال مصدوم دارد بدتر می شود و خطر جدی او را تهدید میکند کمکهای اولیه را به او ارائه دهیم. قربانیان حادثه ممکن است در وسیله نقلیه بر اثر ضربه فرمان گیر افتاده باشند. در چنین موقعی مصدوم را باید به دقت تحت نظر قرار داد. چون اگر بیهوش باشد زبان ممکن است به عقب گلو بیفتد و راه تنفس را مسدود کند. برای مقابله با چنین احتمالی باید سر مصدوم را طوری قرار دهید که راه تنفس او باز بماند. مصدومی که گیر افتاده است باید تا رسیدن پزشک یا کارکنان اورژانس به دقت تحت مراقبت باشد.

سوانحی که در آنها مواد خطر آفرین در کار است:

در بعضی از سوانح ممکن است بر اثر نشت مایعات خطرناک یا متصاعد شدن گاز یا دود سمی شرایط بالقوه خطرناکی ایجاد شود. برخورد با اینگونه حوادث باید کاملاً با دقت انجام گیرد. هیچگاه اقدام به نجات افراد نکنید مگر آنکه مطمئن شوید که ایمنی کافی وجود دارد. خودتان را با نزدیکی به مواد خطرناک به خطر نیندازید. بسیاری از وسائل نقلیه که مواد خطرناک با خود حمل می کنند دارای علامت های هشداردهنده ای هستند که نشان می دهد دقیقاً چه ماده ای حمل می کنند. حتی زمانی که در مورد معنی علامت تردید دارید به اندازه کافی فاصله خود را از وسیله نقلیه حفظ کنید. حتی زمانی که در مورد معنی علامت تردید دارید به اندازه کافی فاصله خود را از وسیله نقلیه حفظ کنید. (بویژه اگر نشت مواد را مشاهده کردید حاضران را از محل حادثه دور کنید. چون این احتمال وجود دارد که هر آن بخارهای سمی به بیرون راه پیدا کند. اگر این اتفاق روی داد در خلاف جهت حرکت باد بایستید بطوریکه بخارهای سمی از شما دور شوند).

کمکهای اولیه در مصدوم غیر هوشیار :

ابتدا هر خطری که شما و مصدوم را تهدید می کند ارزیابی کنید.

توجه : اگر مجبورید مصدوم را حرکت دهید ، او را بکشید ولی بلند نکنید . سر و گردن وی را حمایت کنید .

- سطح هوشیاری مصدوم را کنترل نمایید (سطح هوشیاری او را با کنترل واکنش نسبت به فریاد زدن / تکان دادن ارزیابی کنید . می توانید ابتدا دستور ساده ای را با فریاد بیان کنید مثلاً دست من را فشار بده یا چشم هایت را باز کن توجه داشته باشید که همیشه سوالی را بپرسید که خودتان جوابش را می دانید سپس بیمار را با گرفتن شانه هایش به آرامی تکان دهید و سوالات را تکرار کنید .)

- علائم حیاتی را کنترل نموده و در صورت لزوم عملیات احیاء را برای مصدوم انجام دهید . هر نوع اطلاعات آگاه کننده پزشکی را مانند مج بند یا برچسب پزشکی بررسی کنید .

توجه : شما باید به مصدوم غیر هوشیار اطمینان خاطر بدهید و با وی صحبت کنید زیرا شنوازی آخرین حسی است که از دست می رود و اولین حسی است که باز می گردد . در باره آنچه به یک فرد غیر هوشیار می گوئید دقت کنید زیرا وی ممکن است بعداً گفته های شما را به خاطر بیاورد .

- مصدوم را در وضعیت پایدار خواهید به پهلو قرار بدهید و اگر مشکوک به آسیب ستون فقرات هستید ، مصدوم باید همچنان متمایل به یک سمت بماند تا از راه هوایی وی محافظت شود . ستون فقرات را صاف نگه داشته و از سر و گردن در هنگام چرخاندن

مصدوم به پهلو محافظت کنید . زبان یک فرد بیهوش می تواند راه هوایی را مسدود کند . به خصوص وقتی او را در حالت خوابیده به پشت رها کنید .

- خونریزی را در مصدوم کنترل نمائید . هر زخمی را بپوشانید و شکستگی ها را بی حرکت کنید .

- لباسهای تنگ مصدوم را شل کنید و وی را از دمای بیش از حد محافظت کرده و پوشش سیکی روی او بکشید .

- به پزشک مرکز بهداشتی درمانی یا اورژانس منطقه تماس گرفته و در خواست کمک بنمایید . تا رسیدن نیروی کمکی کنترل علائم حیاتی و سطح هوشیاری مصدوم را ادامه دهید .

توجه : اگر مصدوم دوباره هوشیاری خود را بدست آورد به وی بگوئید که نیروی کمکی در خواست شده و از وی بخواهید که بی حرکت و آرام بماند . همچنین مصدق و می که دوباره هوشیاری خود را بازیافته است کماکان باید به وسیله یک پزشک معاینه شود .

- برای کمک به فرد بیهوشی که چیزی در دهان او گیر کرده است نیز باید ابتدا راه هوایی را پاک کرده و هر نوع انسدادی را برطرف نمائید . برای انجام اینکار می توانید بدین شرح اقدام کنید . سر مصدوم را با ملایمت نگه دارید . گردن را عمودی نگه دارید . با ملایمت سر را به عقب خم کنید . فک را با فشار باز کنید و یک راه هوایی باز برقرار کنید .

- علائم حیاتی را کنترل کرده و در صورت لزوم عملیات احیاء را انجام دهید .

صدمات سر :

در صورتی که مصدومی دچار صدمه به سر (در اثر تصادفات و یا به هر علت دیگر) شده باشد به علائم عدم هوشیاری ، خواب آلودگی نسبی یا کوتاه مدت ، سردرد ، تهوع و

استفراغ ، تاری دید ، کاهش حافظه ، کاهش تعادل ، تحریک پذیری و گیجی ، احساس مور مور شدن ، بی حسی و ضعف اندامها ، خونریزی از بینی – گوشها یا داخل چشم ها ، نابرابری اندازه مردمک ها یا اتساع آنها ، تنفس پر سر و صدا ، پرشهای عضلانی و تشنج را مورد توجه قرار داده و سپس اقدامات ذیل را انجام دهید:

اگر مصدوم هوشیار نیست علائم حیاتی او را کنترل نماید و در صورت لزوم عملیات احیاء را برای او انجام دهید . او را در وضعیت پایدار خوابیده به پهلو بخوابانید . به صورتی که سمت آسیب دیده رو به پائین قرار گیرد و به کنترل علائم حیاتی ادامه دهید .

توجه : از چرخاندن سر به تنها ی بپرهیزید . زیرا خطر آسیب نخاع وجود دارد . هنگام هر حرکتی سر و گردن را محافظت کنید .

- اگر مصدوم هوشیار است ابتدا سطح هوشیاری او را کنترل کرده و سپس علائم حیاتی او را کنترل نماید . او را به یک سمت بخوابانید تا خون یا ترشح خارج شود . این کار به باز نگه داشتن راه هوایی کمک می کند .

- اگر مصدوم در حال خونریزی است خونریزی خارجی را کنترل نماید و مصدوم را به پهلو بخوابانید به طوری که سمت آسیب دیده در قسمت پائین قرار بگیرد .

- کمکهای اولیه در هنگام بروز شوک را برای مصدوم به اجرا درآورید و به پزشک مرکز بهداشتی درمانی یا اورژانس منطقه تماس گرفته و درخواست کمک بنمایید سپس تا رسیدن نیروی کمکی به کنترل و ثبت علائم حیاتی مصدوم بپردازید و مصدوم را تنها نگذارید .

توجه : در تمامی حالات فوق مصدوم باید توسط پزشک معاینه شود .

تمرین نظری

- ۱- چه اقداماتی در هنگام مواجهه با سوانح عمدۀ باید انجام گیرد؟
- ۲- چه اقداماتی باید در تصادفهای جاده‌ای انجام گیرد؟
- ۳- نحوه حرکت دادن مصدوم در تصادفات جاده‌ای چگونه است؟
- ۴- چه اقداماتی در هنگام مواجهه با سوانحی که در آنها مواد خطر آفرین در کار است باید انجام گیرد؟
- ۵- علل بروز صدمه به سر چیست؟

تمرین عملی

- ۱- اقداماتی که هنگام مواجهه با تصادفات جاده‌ای باید انجام گیرد.
- ۲- اقداماتی که هنگام حرکت دادن مصدوم در تصادفات جاده‌ای باید انجام گیرد.
- ۳- اقداماتی که هنگام مواجهه با سوانحی که در آنها مواد خطر آفرین در کار است
- ۴- اقداماتی که هنگام مواجهه با مصدوم دچار صدمه به سر باید انجام گیرد

منابع فارسی:

- ۱-ایلان یاورا،(فوریت‌های پزشکی، خودآموز احیاء قلبی، ریوی)، مترجم: مهری عباسی - چاپ اول، بهار ۱۳۷۸
- ۲-برونر- سودارت،(اصول پرستاری داخلی و جراحی)، مترجم: دکتر سوسن کلاهی و همکاران تحت ویرایش و نظارت دکتر بهرام قاضی جهانی - دکتر تبریزی، چاپ اول - ۱۳۷۹
- ۳-پروفسور ای کنلاین و همکاران،(اطلاعات عمومی امداد و کمک‌های اولیه) - مترجم: یعقوب دلگسار ماهر، تبریز، چاپ اول - تابستان ۱۳۷۹
- ۴-دکتر ساداتیان و همکاران، (تظاهرات اصلی و اقدامات درمانی در اورژانس‌های طب داخلی) انتشارات سماط، چاپ ششم - ۱۳۷۹
- ۵-دکتر فرشید توفیقی،(کمک‌های اولیه و امداد) - زیر نظر دکتر محمد گل افshan، فاصل قم، چاپ اول - ۱۳۸۰
- ۶-دکتر کرامت الله ایماندل،(گندزداها و ضد عفونی کننده‌ها و کاربرد آن‌ها در بهداشت محیط زیست) - تهران، انتشارات آینه کتاب، چاپ اول - ۱۳۷۴
- ۷-دکتر کتلين، اهنل،(کمک‌های اولیه و اصول ایمنی) - ترجمه دکتر شریفی - چاپ اول - ۱۳۷۸
- دکتر نادر زرین فر، دکتر سید امیر مهاجرانی،(درس‌نامه جامع آموزش امداد) انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران
- ۸-روش‌های پرستاری بالینی - ترجمه و تالیف: ملیحه السادات موسوی و فروغ رفیعی - چاپ ششم - ۱۳۷۳
- ۹-رحمانی، فاطمه - (تزریقات ایمن) - فصل نامه بهورز سرمستان ۱۳۸۲
- ۱۰-روبین رایس، (راهنمای مراقبت‌های بهداشتی درق منزل) - مترجمین: اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری، مامایی و کارشناسان ارشد پرستاری در خدمات پرستاری (نورالدین محمدی، شیده گنجه‌ای، خدیجه سپهری) تهران، چاپ اول، ۱۳۸۱

- ۱۱-لورن ولف لویس، (مهارت‌های اساسی در مراقبت‌های پرستاری) - ترجمه هیئت مترجمان، مرکز نشر دانشگاهی تهران، چاپ اول - ۱۳۷۶
- ۱۲-منیژه امیری، (کمک‌های نخستین در سطح پیشرفته) چاپ نهم تیرماه ۱۳۶۶
- ۱۳-معاهیم پرستاری، اصول پرستاری تیلور- ترجمه گروه مدرسین دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (مرضیه مالکی و همکاران)، چاپ اول - ۱۳۷۵
- ۱۴-مهارت‌های بالینی پرستاری (اصول پرستاری تیلور) - ترجمه: زهرا مهدوی، هاجر خاتون شکری پور، فاطمه احمد لاریجانی - نشر و تبلیغ بشری، تهران، چاپ سوم، ۱۳۸۰
- ۱۵-مریم ارشد و زیلاهادیان ندوشن، (پرستار و اورژانس) - زیر نظر صدیقه سالمی - چاپ سوم، ۱۳۷۹
- ۱۶-مهرانگیر چهل امیرانی، علویه رضوی، (اندازه‌گیری علائم حیاتی) - زیر نظر دکتر ابوالفتح لامعی - انتشارات مرکز توسعه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، آموزشی، پژوهشی
- ۱۷-راهنمای کمک‌های اولیه - صلیب سرخ بریتانیا و دو مجتمع اورژانس انگلستان - ترجمه هوشنگ صمیمی‌زاد - چاپخانه فرهنگ، چاپ هشتم - ۱۳۸۰

ENGLISH REFFRENCES

- ۱-fundations of nursing, christensen-kockrow-Mosby-third edition-
۱۹۹۹
- ۲-Instructional first Aid CD