



بخشی از ترجمه مقاله

عنوان فارسی مقاله :

همه گیرشناسی آسیب سر کودک در گیلان

عنوان انگلیسی مقاله :

Epidemiology of Pediatric Head Trauma in Guilan



توجه !

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.



بخشی از ترجمه مقاله

5. Discussi

On the basis of the mean GCS score and normal CT scans, the majority of the patients included in this study sustained only mild HI. The prevalence of HI is relatively stable throughout childhood, although an increase in the incidence of head injury was identified in 2 age groups. Around the age of 15 years old, a dramatic increase in HI occurs, primarily in boys. Infants under the age of 1 year have also been identified by several studies (9-12) as having an elevated incidence of HI, which is attributed to falls and child abuse. Fernandez et al. found that the most common etiology of head injury in children younger than 2 years old was a fall at home. In that study, child abuse accounted for 7% of HI (11). In this study, the main cause of HI in infants under the age of 1 year was also falling (Table 1). Child abuse was not reported as the cause of HI in this age group, which could be due to lack of disclosure. Stairs was the most common cause of falling in children aged 0-9 years old. Our data show that HI in younger children happens more frequently at home, whereas in older children it occurs more frequently on the road.

بحث و نتیجه گیری

براساس نمره ی GCS متوسط و اسکن های CT نرمال، اکثریت بیماران در این مطالعه تنها HI متوسط داشتند. شیوع HI در کل کودکی نسبتاً پایدار است اگرچه افزایش در این رخداد به سر در 2 گروه سنی مشاهده شد. در حدود سن 15 سال، یک افزایش شدید در HI ایجاد می شود که عمدتاً در پسران است. نوزادان زیر 1 سال نیز توسط چندین مطالعه دارای افزایش رخداد HI می باشند که به سقوط و سوءاستفاده از بچه ارتباط دارد. فرناندز و همکاران دریافتند که سبب اصلی آسیب سر در کودکان جوانتر از 2 سال سقوط در خانه است. در آن مطالعه، سوء استفاده از کودک تنها 7% از HI را به خود اختصاص می دهد. در این مطالعه، علت اصلی HI در کودکان زیر 1 سال نیز سقوط می باشد (جدول 1). سوءاستفاده از کودک در این گروه سنی به عنوان علت HI نام برده نشده است که می تواند ناشی از فقدان حضوربچه در ملاء عام باشد. پله ها علت اصلی سقوط کودکان در سن بین 0 تا 9 هستند. داده های ما نشان می دهند که HI در کودکان جوانتر بیشتر در خانه رخ می دهد در حالی که در بزرگترها این آسیب بیشتر در جاده و خیابان است.



توجه !

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

برای جستجوی جدیدترین مقالات ترجمه شده، [اینجا](#) کلیک نمایید.