



بخشی از ترجمه مقاله

عنوان فارسی مقاله :

درمان هورمون تیروئید برای افراد مسن مبتلا به کم کاری
تیروئید تحت بالینی

عنوان انگلیسی مقاله :

Thyroid Hormone Therapy for Older Adults with
Subclinical Hypothyroidism



توجه !

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل
با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.



بخشی از ترجمه مقاله

DISCUSSION

In this multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled, parallel-group trial involving older participants with subclinical hypothyroidism, treatment with levothyroxine was associated with a persistently lower serum thyrotropin level than was placebo (between-group difference, approximately 2 mIU per liter), with the maximum effects seen at time of first review (6 to 8 weeks). We found that levothyroxine had no consistent beneficial effect on thyroid-related symptoms. This finding was true in both older men and older women and for different thyrotropin levels at baseline. Our trial had good statistical power to detect a clinically meaningful effect on thyroid-related quality of life, with 95% confidence intervals that excluded a beneficial effect greater than 2.1 points (on a scale from 0 to 100) in either of the two primary outcomes. If a symptom benefit was to have occurred, it would have been expected to be seen at 12 months.

بحث

در این آزمایش گروه موازی چند مرکزی، دوسوکرو، تصادفی، کنترل شده با پلاسب، که شامل شرکت کنندگان مسن مبتلا به هیپوتیروئیدیسم تحت بالینی بودند، درمان با لووتیروکسین، با یک سطح تیروتروپین سرمی مداوم کمتر مرتبط بود، اما در درمان با پلاسب، حداکثر تاثیرات در زمان اولین بررسی (6 تا 8 هفته) دیده شد (اختلاف بین گروهی، تقریباً 2 mIU در هر لیتر). یافتیم که لووتیروکسین، هیچ اثر مفید سازگاری در علائم مرتبط با تیروئید ندارد. این یافته ها در هر دو زنان و مردان مسن و برای سطوح تیروتروپین مختلف در پایه، درست بودند و صدق می کردند. آزمایش ما، قدرت آماری خوبی به منظور تشخیص اثر معنادار بالینی در کیفیت زندگی مربوط به تیروئید دارد، همراه با فاصله اطمینان 95% که یک اثر مفید بزرگتر از 2.1 نقطه را (روی مقیاس صفر تا صد) در هر دو نتایج اولیه حذف می کند. اگر یک نشانه مفید اتفاق بیفتد، انتظار می رود که تا 12 ماه دیده شود.



توجه!

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

برای جستجوی جدیدترین مقالات ترجمه شده، [اینجا](#) کلیک نمایید.