



## بخشی از ترجمه مقاله

عنوان فارسی مقاله :

نقص توجه/اختلال بیش فعالی در بالغین مبتلا به  
مولتیپل اسکلروزیس (ام اس)

عنوان انگلیسی مقاله :

Attention Deficit/Hyperactivity Disorder in Adults  
with Multiple Sclerosis



توجه !

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل  
با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.



## بخشی از ترجمه مقاله

بحث

### Discussion

Our study was conducted as it was hypothesized that an association between ADHD symptoms and disability in MS could be found in adult patients and this is the first study which assessed the relationship between attention deficit and disability in MS.

Our study showed that MS patients had significantly higher rate of mean ADHD scores than controls. Especially, rates of ADHD symptoms were similar between genders in MS patients. Attention has been noticed to be impaired in MS patients [10]. As reported, compared with controls, patients with RRMS showed lengthened reaction times for simple and focused attention [11]. According to our data, compared with controls, patients with MS showed higher attention deficit scores. In this investigation, we focused on symptoms and not DSM-based diagnoses of ADHD. Nevertheless, these findings were in accordance with previous studies.

In our study, we also investigated the relationship with EDSS scores and ADHD scores in MS patients but we did not find any significant correlations between them. Despite that, we showed correlations between ADHD scores and anxiety, depression scores in MS patients.

مطالعه ما با این فرضیه صورت گرفت که می تواند بین نشانه های ADHD و ناتوانی در بالغین مبتلا به ام اس همبستگی یافت شود و این اولین مطالعه ای است که ارتباط بین نقص توجه و ناتوانی را در ام اس مورد بررسی قرار می دهد.

مطالعه ما نشان داد که بیماران مبتلا به ام اس به طور معنی داری میزان بالاتری از نمره میانگین ADHD را نسبت به گروه کنترل دارا بودند. به طور ویژه میزان نشانه های ADHD بین دو جنس در بیماران ام اس مشابه بود. دیده شد که در بیماران ام اس توجه مختل و آسیب دیده می باشد (10). همچنان که گزارش شد، در مقایسه با گروه کنترل، بیماران RRMS (ام اس عود کننده خاموش شونده) زمان واکنش طولانی شده ای برای توجه ساده و متمرکز شده نشان دادند (11). بر طبق داده های ما، بیماران مبتلا به ام اس در مقایسه با گروه کنترل، نمرات نقص توجه بالاتری را نشان دادند. در این تحقیق، ما بر نشانه ها متمرکز شدیم و نه بر تشخیص ADHD بر اساس DSM. با اینحال، این یافته ها با مطالعات قبلی تطابق دارد. همچنین ما در مطالعه خود، ارتباط بین نمرات EDSS و ADHD را در بیماران مبتلا به ام اس مورد جستجو قرار دادیم اما هیچ رابطه آماری معنی داری بین آنها نیافتیم. علی رقم آن، ما نشان دادیم که بین نمرات ADHD و نمرات اضطراب، افسردگی در بیماران ام اس همبستگی وجود دارد.



توجه!

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

برای جستجوی جدیدترین مقالات ترجمه شده، [اینجا](#) کلیک نمایید.