



بخشی از ترجمه مقاله

عنوان فارسی مقاله :

نحوه ی درمان انسداد وریدی (ترومبولیسم) بازگشتی،
در بیمارانی که درمان ضد انعقاد خونی دریافت می کنند

عنوان انگلیسی مقاله :

How I treat recurrent venous thromboembolism in
patients receiving anticoagulant therapy



توجه !

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل
با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.



بخشی از ترجمه مقاله

Conclusion

Recurrent VTE for patients who are receiving anticoagulation therapy is not very common, and new symptoms from the leg could be a manifestation of postthrombotic syndrome. There are several differential diagnoses for chest pain or shortness of breath. When a recurrence is confirmed by differences in VTE extent compared with the diagnostic imaging before anticoagulation therapy was started, the cause should be carefully investigated, because the management differs. The first step is to identify inappropriate anticoagulation therapy (ie, incorrect dose, poor adherence, or drug interactions that may reduce the anticoagulant effect). Once any of these have been excluded, the investigation should be focused on diseases or conditions with hypercoagulability, of which cancer is the most common. The recommendations regarding continued management are usually weak because of the low-quality level of evidence.

جمع بندی

VTE بازگشتی برای بیمارانی که از دارو های ضد انعقاد استفاده می کنند موضوع خیلی رایجی نیست، و نشانه های جدید از پا می تواند نشانه ی سندرم های پسا انسدادی باشد. تشخیص های مختلفی برای درد سینه و یا تنگی نفس وجود دارد. زمانی که بازگشت بیماری بر اساس تفاوت های موجود در سطح VTE در مقایسه با تصویر برداری های تشخیصی قبل از درمان با استفاده از دارو های ضد انعقاد تایید می شود، علت این بازگشت بیماری باید به دقت ارزیابی شود، زیرا مدیریت این مشکل بر اساس علل مختلف، متفاوت است. گام اول در روند درمانی، شناسایی کردن درمان نامناسب داروهای ضد انعقاد (یعنی، دوز نامناسب، انسجام نامناسب، و یا تداخل های دارویی که ممکن است تاثیر مواد ضد انعقاد را کاهش دهد) می باشد. زمانی که هیچ کدام از این موارد شناسایی نشد، این ارزیابی باید متمرکز بر روی بیماری ها یا شرایط مرتبط با انعقاد بیش از حد قرار بگیرد که سرطان، از میان دیگر بیماری ها، رایج ترین علت می باشد. پیشنهادات در رابطه با مدیریت مداوم معمولا در این زمینه ضعیف هستند زیرا سطح شواهد کمی در این رابطه وجود دارد.



توجه!

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت

ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

برای جستجوی جدیدترین مقالات ترجمه شده، [اینجا](#) کلیک نمایید.